

Université Pierre et Marie Curie - Université Paris Diderot
Master EF 1^{ère} année - CAPES
2014 - 2015

Fondements de l'analyse

Raphaël Roux ^{*}, David Hermann ^{**}

*. raphael.roux@upmc.fr
**. david.hermann@imj-prg.fr

Table des matières

1	Nombres réels	7
1.1	L'ensemble \mathbb{N} des entiers naturels	7
1.1.1	Les axiomes de Peano	7
1.1.2	Addition et multiplication	9
1.1.3	Bon ordre sur \mathbb{N}	11
1.1.4	Quelques autres types de récurrence	13
1.2	L'anneau \mathbb{Z} des entiers relatifs	14
1.3	Le corps \mathbb{Q} des rationnels	15
1.4	Le corps \mathbb{R} des réels	17
1.4.1	Définition axiomatique de \mathbb{R}	17
1.4.2	Une construction de \mathbb{R}	17
1.4.3	Unicité du corps des réels	19
1.4.4	Quelques propriétés en vrac	21
1.5	Exercices	22
2	Suites numériques	25
2.1	Un peu de vocabulaire	25
2.2	Convergence des suites	26
2.3	Quelques critères de convergence	30
2.3.1	Suites monotones	30
2.3.2	Suites adjacentes	31
2.3.3	Le théorème “des gendarmes”	32
2.3.4	Suites de Cauchy	32
2.3.5	Valeurs d'adhérences, limites inférieures et supérieures	33
2.4	Relations de comparaison	36
2.5	Suites récurrentes	39
2.6	Exercices	42
3	Séries numériques	45
3.1	Premières définitions	45
3.2	Séries à termes positifs	47
3.3	Séries à termes complexes	56
3.4	Séries doubles	58
3.5	Exercices	61

4	Fonctions de la variable réelle	65
4.1	Étude locale des fonctions	65
4.2	Fonctions continues sur un intervalle	68
4.3	Dérivation	70
4.4	Comportement asymptotique des fonctions	77
4.4.1	Relations de comparaison	77
4.4.2	Développements limités	79
4.5	Développement de Taylor	81
4.6	Exercices	84
5	Intégration	89
5.1	Intégration sur un segment	89
5.2	Lien entre intégrale et primitive	96
5.3	Intégration approchée	98
5.3.1	La méthode des rectangles à gauche	98
5.3.2	La méthode du point milieu	100
5.4	Intégration sur un intervalle quelconque	101
5.5	Théorèmes de convergence	105
5.6	Intégrales dépendant d'un paramètre	106
5.7	Exercices	108
6	Suites et séries de fonctions	111
6.1	Convergence d'une suite de fonctions	111
6.1.1	Approximation de fonctions	114
6.2	Séries entières	117
6.2.1	Rayon de convergence	117
6.2.2	Quelles fonctions peuvent se représenter comme des séries entières?	121
6.3	Séries de Fourier	122
6.3.1	Le cas des séries réelles	123
6.3.2	Séries de Fourier et dérivabilité	124
6.3.3	Structure Hilbertienne	125
6.3.4	Convergence normale	127
6.3.5	Convergence simple	128
7	Fonctions usuelles	135
7.1	Définitions	135
7.1.1	Les polynômes	135
7.1.2	L'exponentielle	136
7.1.3	Le logarithme	138
7.1.4	Les puissances	139
7.1.5	Les fonctions trigonométriques	140
7.1.6	Les fonctions trigonométriques réciproques	142
7.2	Développements en série entière et développements limités	144
7.2.1	Développement en série entière	144
7.3	Exercices	145

8	Équations différentielles	147
8.1	Existence et unicité des solutions	147
8.2	Quelques exemples	152
8.2.1	L'équation $y' = y^2$	152
8.2.2	L'équation $y' = \sqrt{ y }$	152
8.3	Le cas des équations d'ordre supérieur	153
8.4	Le cas linéaire	155

Chapitre 1

Nombres réels

L'ensemble \mathbb{R} des nombres réels est le cadre naturel de l'analyse. Dans ce chapitre, nous allons construire cet ensemble en partant de l'ensemble \mathbb{N} des entiers naturels dont nous poserons l'existence comme axiome.

À partir de \mathbb{N} , nous pourrons construire l'ensemble \mathbb{Z} des entiers relatifs et l'ensemble \mathbb{Q} des nombres rationnels. L'ensemble \mathbb{Q} est le plus petit corps qui contienne \mathbb{N} , c'est à dire l'ensemble le plus simple dans lequel on puisse définir une addition, une soustraction, une multiplication et une division en se basant sur les nombres entiers.

L'ensemble \mathbb{Q} est également muni d'une structure d'ordre. Toutefois, il manque à \mathbb{Q} une certaine propriété relative à cette structure d'ordre, la *complétude*, ce qui fait que certains nombres qui “devraient” exister ne sont pas dans \mathbb{Q} . L'ensemble \mathbb{R} est construit à partir de \mathbb{Q} en rajoutant ces éléments. On obtient alors un corps, contenant strictement \mathbb{Q} , mais qui vérifie maintenant la propriété de complétude.

1.1 L'ensemble \mathbb{N} des entiers naturels

1.1.1 Les axiomes de Peano

L'ensemble \mathbb{N} est défini de manière axiomatique : on considère certaines propriétés de \mathbb{N} comme “évidentes”, et on les suppose vraies. Le but va être de construire successivement \mathbb{Z} , \mathbb{Q} et \mathbb{R} , à partir de ces quelques axiomes.

Définition 1.1.1. *On suppose qu'il existe un ensemble \mathbb{N} , un élément $0 \in \mathbb{N}$ et une fonction injective $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$, appelée fonction successeur satisfaisant la propriété suivante, appelée propriété de récurrence :*

Si un sous-ensemble de \mathbb{N} contient 0 et est stable par s , alors il s'agit de \mathbb{N} tout entier.

Dans cette définition, “ A est stable par s ” signifie que si n est dans A , alors $s(n)$ est également dans A . Le caractère injectif de s entre \mathbb{N} et $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ signifie que tout élément de \mathbb{N} a un successeur, que 0 n'est successeur d'aucun élément, et que deux éléments ayant le même successeur sont égaux.

Ces suppositions sont appelées *axiomes de Peano*. Un élément de \mathbb{N} est appelé *entier*, ou *entier naturel*.

Une première conséquence de cette définition est que l'on peut énumérer des éléments tous distincts de \mathbb{N} en considérant $0, s(0), s(s(0)), s(s(s(0)))$, etc. D'après l'axiome de récurrence, on obtient ainsi *tous* les entiers.

On note $s(0) = 1, s(1) = 2, s(2) = 3$, etc. L'élément $s(n)$ aura vocation à représenter $n + 1$.

Propriété 1.1.2. *La fonction s est en fait une bijection entre \mathbb{N} et $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.*

Démonstration. On sait déjà que s est une injection de \mathbb{N} dans $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. Il reste à montrer qu'elle est surjective.

Pour cela, il suffit de remarquer que l'ensemble $\{0\} \cup s(\mathbb{N})$ contient 0 ainsi que le successeur de chacun de ses éléments (puisqu'il contient les successeurs de tous les entiers). L'axiome de récurrence montre donc $\{0\} \cup s(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$. \square

L'axiome de récurrence est très utile pour montrer des propriétés sur l'ensemble \mathbb{N} en l'utilisant de la manière suivante. On considère une propriété $\mathcal{P}(n)$ dont on veut prouver qu'elle est vérifiée par tout entier naturel n . On considère alors l'ensemble

$$A = \{n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n) \text{ est vraie}\}.$$

Notre objectif est de montrer que $A = \mathbb{N}$. On prouve alors les deux propositions $\mathcal{P}(0)$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(s(n)). \quad (1.1)$$

Comme $\mathcal{P}(0)$ est vraie, 0 est dans A , et comme (1.1) est vraie, l'ensemble A est stable par s . L'axiome de récurrence permet de conclure que $A = \mathbb{N}$; autrement dit, la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie quel que soit n . Une démonstration suivant ce schéma est appelée *démonstration par récurrence*.

L'axiome de récurrence permet de définir des fonctions φ sur \mathbb{N} à partir de relations de la forme

$$\varphi(s(n)) = f(\varphi(n)).$$

Propriété 1.1.3. *Soit E un ensemble, α un élément de E et f une fonction de E dans E . Il existe une unique fonction φ de \mathbb{N} dans E telle que :*

$$\varphi(0) = \alpha, \forall n \in \mathbb{N}, \varphi(s(n)) = f(\varphi(n)). \quad (1.2)$$

Quand on aura défini l'addition, l'égalité (1.2) prendra la forme plus habituelle (1.6)

Démonstration. — Pour l'unicité, on considère deux éventuelles fonctions φ et ψ vérifiant les conditions de l'énoncé. Il suffit de montrer que l'ensemble

$$A = \{n \in \mathbb{N}, \varphi(n) = \psi(n)\}$$

est égal à \mathbb{N} tout entier. On va procéder par récurrence : on a $\varphi(0) = \alpha = \psi(0)$, donc $0 \in A$. De plus, si $n \in A$, on a

$$\varphi(s(n)) = f(\varphi(n)) = f(\psi(n)) = \psi(s(n)).$$

On a donc $s(n) \in A$. L'ensemble A est donc stable par s , et donc $A = \mathbb{N}$.

— (Cette preuve peut être sautée en première lecture) Passons maintenant à l'existence. On va construire le graphe d'une fonction vérifiant les conditions de l'énoncé. C'est à dire qu'on va construire un sous-ensemble \mathcal{G} de $\mathbb{N} \times E$ vérifiant la propriété^(note 1)

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists! x \in E, (n, x) \in \mathcal{G}, \quad (1.3)$$

c'est à dire que \mathcal{G} est le graphe d'une fonction. L'unique élément x de E tel que $(n, x) \in \mathcal{G}$ est à comprendre comme $\varphi(n)$. On voudra aussi que \mathcal{G} vérifie

$$(0, \alpha) \in \mathcal{G} \quad (1.4)$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n, x) \in \mathcal{G} \Rightarrow (s(n), f(x)) \in \mathcal{G}, \quad (1.5)$$

ce qui signifie que la fonction dont \mathcal{G} est le graphe vérifie bien les conditions de l'énoncé. On considère l'ensemble

$$\mathcal{E} = \{A \subset \mathbb{N} \times E, (0, \alpha) \in A \text{ et } ((n, x) \in A) \Rightarrow (s(n), f(x)) \in A\},$$

c'est-à-dire l'ensembles des sous-ensembles de $\mathbb{N} \times E$ vérifiant (1.4) et (1.5). On va montrer que l'ensemble

$$\mathcal{G} = \bigcap_{A \in \mathcal{E}} A$$

vérifie aussi les conditions (1.4) et (1.5), mais également la condition (1.3), ce qui conclura la preuve.

1. Tout d'abord, chacun des éléments A de \mathcal{E} contient $(0, \alpha)$. Donc, $(0, \alpha) \in \bigcap_{A \in \mathcal{E}} A = \mathcal{G}$ et \mathcal{G} vérifie (1.4).
2. Ensuite, si (n, x) est dans \mathcal{G} , alors pour tout A de \mathcal{E} , (n, x) est dans A . Par définition de l'ensemble \mathcal{E} , on a donc $(s(n), f(x)) \in A$ pour tout A de \mathcal{E} . En conséquence, $(s(n), f(x)) \in \bigcap_{A \in \mathcal{E}} A = \mathcal{G}$. Donc \mathcal{G} vérifie bien (1.5).
3. Pour montrer que \mathcal{G} vérifie (1.3), on prouve par récurrence la propriété $\mathcal{P}(n)$ suivante :

$$\mathcal{P}(n) : \text{“}\exists! x \in E, (n, x) \in \mathcal{G}\text{”}.$$

L'ensemble \mathcal{G} contient nécessairement l'élément $(0, \alpha)$. Ensuite, pour un x de E avec $x \neq \alpha$, et pour un ensemble $A \in \mathcal{E}$, l'ensemble $A \setminus \{(0, x)\}$ est également élément de \mathcal{E} , de sorte que $(0, x) \notin \bigcap_{A \in \mathcal{E}} A = \mathcal{G}$. La propriété $\mathcal{P}(0)$ est donc vérifiée.

Supposons maintenant la propriété $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Il existe donc un unique x tel que $(n, x) \in \mathcal{G}$. Par (1.5), on a $(s(n), f(x)) \in \mathcal{G}$. De plus, pour $y \in E$ avec $y \neq f(x)$, si $A \in \mathcal{E}$, alors $A \setminus \{(s(n), y)\}$ est également dans \mathcal{E} , puisque $(s(n), y)$ n'est pas de la forme $(s(n), f(z))$, où (n, z) est un élément de \mathcal{G} . Par conséquent, $(s(n), y) \notin \bigcap_{A \in \mathcal{E}} A = \mathcal{G}$, ce qui montre $\mathcal{P}(s(n))$ et achève donc la démonstration de l'existence de φ . □

1.1.2 Addition et multiplication

La propriété 1.1.3 nous permet de définir par récurrence la somme et le produit de deux entiers naturels.

Définition 1.1.4. Soit m un élément de \mathbb{N} . On définit l'addition par les relations :

$$m + 0 = m \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, m + s(n) = s(m + n).$$

On peut également définir la multiplication de la manière suivante.

Définition 1.1.5. Soit m un élément de \mathbb{N} . On pose $m \times 0 = 0$ et pour tout n dans \mathbb{N} ,

$$m \times s(n) = m \times n + m.$$

L'addition et la multiplication vérifient les propriétés classiques suivantes :

(note 1). On rappelle que $\exists! x$ signifie “il existe un unique x tel que...”

Propriété 1.1.6. *L'addition et la multiplication sont associatives et commutatives. L'addition et la multiplication admettent respectivement 0 et 1 comme élément neutre. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. Pour tous entiers n , m et p , si $n + m = n + p$, alors $m = p$. De même, si $nm = np$ pour $n \neq 0$, alors $m = p$.*

Démonstration. Toutes les preuves se font par des récurrences bien choisies. On ne rédigera que la preuve de la commutativité, les autres preuves étant laissées en exercice.

Considérons la proposition $\mathcal{P}(n)$ définie par :

$$\mathcal{P}(n) : \text{“}\forall m \in \mathbb{N}, n + m = m + n\text{”}.$$

On va montrer par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vrai pour tout n .

— La proposition $\mathcal{P}(0)$ va elle-même être montrée par récurrence. Nous considérons la proposition $\mathcal{Q}(m)$ définie par :

$$\mathcal{Q}(m) : \text{“}0 + m = m + 0 = m\text{”}.$$

La proposition $\mathcal{Q}(0)$ est vraie par définition de l'addition. Supposons maintenant que $\mathcal{Q}(m)$ soit vraie pour un certain m . On a alors

$$0 + s(m) = s(0 + m) = s(m),$$

par définition de l'addition et l'hypothèse de récurrence. De plus, on a toujours, $s(m) + 0 = s(m)$. La propriété $\mathcal{Q}(s(m))$ est donc vraie, et on a montré par récurrence la propriété $\mathcal{P}(0)$.

— Passons maintenant à l'itération de la récurrence. Pour cela, on va démontrer le résultat suivant : **Lemme 1.1.7.** *Pour tous entiers n et m , on a $s(m) + n = m + s(n)$.*

Démonstration. Encore une récurrence. On considère la propriété

$$\mathcal{R}(n) : \text{“}\forall m \in \mathbb{N}, s(m) + n = m + s(n)\text{”}.$$

Soit m un entier, on a $s(m) + 0 = s(m) = s(m + 0) = m + s(0)$ (par la définition de $+$), donc $\mathcal{R}(0)$ est vraie. Si on suppose $\mathcal{R}(n)$ vraie pour un certain entier n , alors en utilisant successivement la définition de $+$, l'hypothèse de récurrence et encore la définition de $+$, on a

$$s(m) + s(n) = s(s(m) + n) = s(m + s(n)) = m + s(s(n)),$$

ce qui montre $\mathcal{R}(s(n))$. Finalement, $\mathcal{R}(n)$ est vrai pour tout n , et le lemme 1.1.7 est démontré. \square

Revenons à la preuve de $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(s(n))$. Soit n un entier naturel, et supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Considérons un entier m . On a, en utilisant tour à tour le lemme 1.1.7, la définition de $+$, l'hypothèse de récurrence et la définition de $+$:

$$s(n) + m = n + s(m) = s(n + m) = s(m + n) = m + s(n).$$

Cela montre $\mathcal{P}(s(n))$, et la preuve est achevée. \square

La propriété 1.1.3 prend une apparence plus habituelle en remplaçant $s(n)$ par $n + 1$ et en notant les fonctions de \mathbb{N} dans E sous forme de suites :

Propriété 1.1.8. Soit E un ensemble, α un élément de E et f une fonction de E dans E . Il existe une unique suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E telle que :

$$u_0 = \alpha, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n). \quad (1.6)$$

De même, on peut construire des suites par des relations de récurrence double : si α et β sont deux éléments de E et f est une application de $E \times E$ dans E , alors il existe une unique suite d'éléments de E vérifiant

$$u_0 = \alpha, \quad u_1 = \beta, \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \quad u_{n+2} = f(u_n, u_{n+1}).$$

En effet, pour construire cette suite, il suffit d'appliquer la propriété 1.1.8 à la fonction F de $E \times E$ dans lui-même définie par $F(x, y) = (y, f(x, y))$ et à $(\alpha, \beta) \in E \times E$.

La définition 1.1.1 revient à supposer l'existence d'un ensemble \mathbb{N} possédant certaines propriétés. On peut montrer que si un autre ensemble possède les mêmes propriétés, il est isomorphe à \mathbb{N} en un certain sens. Cela signifie que l'ensemble \mathbb{N} est défini sans ambiguïtés par les axiomes de Peano.

Propriété 1.1.9. Si deux triplets $(\mathbb{N}, 0, s)$ et $(\tilde{\mathbb{N}}, \tilde{0}, \tilde{s})$ vérifient les axiomes de Peano, alors il existe une unique bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow \tilde{\mathbb{N}}$ telle que $f(0) = \tilde{0}$ et telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $f(s(n)) = \tilde{s}(f(n))$.

Démonstration. La propriété 1.1.3 donne directement l'existence et l'unicité de f (avec $E = \tilde{\mathbb{N}}$, $\alpha = \tilde{0}$ et $f = \tilde{s}$). \square

1.1.3 Bon ordre sur \mathbb{N}

Dans la partie 1.1.2, on a muni \mathbb{N} d'une multiplication et d'une addition. Une autre structure importante dont dispose \mathbb{N} est une structure d'ordre. On rappelle quelques définitions :

Définition 1.1.10. Un ensemble (totalement) ordonné est un ensemble E muni d'une relation (c'est à dire d'une application de $E \times E$ dans $\{\text{vrai, faux}\}$), notée \leq vérifiant les propriétés

- pour tout x , on a $x \leq x$;
- pour tous x et y , si $x \leq y$ et $y \leq x$ alors $x = y$;
- pour tous x, y et z , si $x \leq y$ et $y \leq z$ alors $x \leq z$;
- pour tous x et y , on a soit $x \leq y$, soit $y \leq x$ (c'est la propriété d'ordre total).

Définition 1.1.11. Soit E un ensemble totalement ordonné, et soit A un sous-ensemble de E .

- un majorant (resp. un minorant) de A est un élément m de E tel que pour tout a de A , on ait $a \leq m$ (resp. $m \leq a$);
- Un plus grand élément (resp. un plus petit élément) est un majorant (resp. un minorant) de A qui appartient à A ;
- une borne supérieure (resp. une borne inférieure) de A est un plus petit élément de l'ensemble des majorants de A (resp. un plus grand élément de l'ensemble des minorants de A).

Propriété 1.1.12. Dans un ensemble ordonné E , si un sous-ensemble A de E admet un plus petit élément, celui-ci est unique. On le note alors $\min A$. Par ailleurs, la borne supérieure étant définie comme le plus petit élément d'un certain ensemble, celle-ci est également unique (si elle existe). On la note $\sup A$.

Démonstration. Supposons qu'un ensemble A admette deux plus petits éléments x et y . Comme x est un plus petit élément de A et que $y \in A$, on a $x \leq y$. De même, $y \leq x$. On en conclut donc que $x = y$. \square

La propriété suivante montre que bien qu'il soit possible que la borne supérieure d'un ensemble A ne soit pas dans A , il existe des éléments de A qui s'en approchent autant que l'on souhaite.

Propriété 1.1.13. *Soit E un ensemble ordonné et A un ensemble admettant une borne supérieure. Pour tout x de E avec $x < \sup A$, il existe y dans A tel que $x < y \leq \sup A$.*

Démonstration. Soit x un élément de E vérifiant $x < \sup A$. Comme $\sup A$ est le plus petit des majorants de A , x n'est pas un majorant de A . Il existe donc $y \in A$ tel que $x < y$. De plus, comme $\sup A$ est un majorant de A , on a $y \leq \sup A$. \square

On définit une relation d'ordre sur \mathbb{N} de la façon suivante :

Définition 1.1.14. *Étant donnés deux éléments n et m de \mathbb{N} , on dit que n est inférieur ou égal à m et on note $n \leq m$ si il existe un entier k tel que $n + k = m$.*

Propriété 1.1.15. *La relation \leq est une relation d'ordre totale sur \mathbb{N} .*

Démonstration. Les quatre propriétés définissant une relation d'ordre total sont montrées respectivement en utilisant :

- l'égalité $n + 0 = n$;
- la propriété 1.1.6 ;
- l'associativité de $+$;
- une récurrence sur n pour montrer que $\{m \in \mathbb{N}, n \leq m \text{ ou } m \leq n\} = \mathbb{N}$.

\square

La relation d'ordre a un bon comportement vis à vis de l'addition et de la multiplication :

Propriété 1.1.16. *Pour tous entiers naturels n , m et k , tels que $n \leq m$ on a*

$$n + k \leq m + k \quad \text{et} \quad nk \leq mk.$$

Démonstration. Par définition, si $n \leq m$, il existe q tel que $n + q = m$. On a donc $n + k + q = m + k$, donc $n + k \leq m + k$. De plus $mk = (n + q)k = nk + qk$, donc $nk \leq mk$. \square

Propriété 1.1.17. *Tout sous-ensemble non-vide de \mathbb{N} admet un plus petit élément^(note 2).*

Démonstration. Soit A un sous-ensemble de \mathbb{N} , et supposons que A n'admette pas de plus petit élément. On va montrer que A est l'ensemble vide. Pour cela on va montrer par récurrence que la propriété $\mathcal{P}(n)$ définie par

$$\mathcal{P}(n) = \text{“}\{0, \dots, n\} \cap A = \emptyset\text{”},$$

est vraie pour tout n entier^(note 3). Tout d'abord, on remarque que $0 \notin A$, sinon il serait son plus petit élément, ce qui montre $\mathcal{P}(0)$. Soit n un entier, et supposons que $\mathcal{P}(n)$ soit vrai. Si $n + 1$ était élément de A , par l'hypothèse de récurrence il serait son plus petit élément. Par conséquent, on a $n + 1 \notin A$, ce qui montre $\mathcal{P}(n + 1)$. On en déduit donc que

$$A = A \cap \mathbb{N} = A \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{0, \dots, n\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap \{0, \dots, n\}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \emptyset = \emptyset.$$

L'égalité $\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{0, \dots, n\}$ découle du fait que pour tout entier n , on a $n \in \{0, \dots, n\}$ \square

(note 2). On dit aussi que \mathbb{N} est *bien ordonné*.

(note 3). Bien entendu, $\{0, \dots, n\}$ désigne l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}, k \leq n\}$.

Propriété 1.1.18. \mathbb{N} n'admet pas de plus grand élément. En revanche, toute partie non-vide majorée de \mathbb{N} admet un plus grand élément.

Démonstration. — Supposons que \mathbb{N} admette un plus grand élément M . On aurait alors $M+1 \leq M$, ce qui est contradictoire.

— On va montrer par récurrence la propriété suivante, ce qui conclura la preuve :

$\mathcal{P}(n)$ = “Tout sous-ensemble non-vide de \mathbb{N} majoré par n admet un plus grand élément.”

Cette propriété est bien vraie au rang 0. En effet, le seul ensemble non-vide majoré par 0 est $\{0\}$ qui admet 0 comme plus grand élément.

Considérons $n \in \mathbb{N}$, et supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Soit A un sous-ensemble non-vide de \mathbb{N} majoré par $n+1$. On a deux cas possibles : soit $n+1 \in A$, auquel cas $n+1$ est le plus grand élément de A ; soit $n+1 \notin A$, auquel cas A est majoré par n et on applique $\mathcal{P}(n)$. Dans les deux cas $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. □

On a présenté ici une construction de \mathbb{N} basée sur le principe de récurrence. On aurait aussi pu *poser comme axiome* les propriétés 1.1.17 et 1.1.18, et *retourer* les axiomes de Peano (qui seraient cette fois-ci des théorèmes) à partir de ces deux axiomes. En effet, si on part des propriétés 1.1.17 et 1.1.18, on peut définir 0 comme étant le plus petit élément de \mathbb{N} , et on définit $s(n)$ par

$$s(n) = \min\{k \in \mathbb{N}, k > n\}.$$

Cette expression a bien un sens : en effet, comme \mathbb{N} n'a pas de plus grand élément, l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}, k > n\}$ est non-vide, et admet donc un plus petit élément. On peut alors vérifier que s est une bijection de \mathbb{N} dans $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ (il suffit de montrer que sa réciproque est $s^{-1}(n) = \max\{k \in \mathbb{N}, k < n\}$), et que $(\mathbb{N}, 0, s)$ vérifie l'axiome de récurrence (pour un ensemble A contenant 0 et stable par s , considérer le plus petit élément de $\mathbb{N} \setminus A$; on arrive à une contradiction, ce qui montre que $A = \mathbb{N}$).

1.1.4 Quelques autres types de récurrence

En plus du raisonnement par récurrence simple présenté dans la partie 1.1.1, il existe d'autres types de récurrence.

La récurrence double (triple, etc)

Pour montrer une proposition $\mathcal{P}(n)$ pour tout entier n , on peut également montrer les propositions suivantes :

- $\mathcal{P}(0)$;
- $\mathcal{P}(1)$;
- $\forall n \in \mathbb{N}, (\mathcal{P}(n) \text{ et } \mathcal{P}(n+1)) \Rightarrow \mathcal{P}(n+2)$.

En effet, une récurrence simple permet alors de montrer la proposition

$$\mathcal{Q}(n) = “\mathcal{P}(n) \text{ et } \mathcal{P}(n+1)”$$

pour tout entier n .

On peut également parler de récurrence triple, quadruple, etc. À ce moment-là il faut initialiser la récurrence par $\mathcal{P}(0)$, $\mathcal{P}(1)$ et $\mathcal{P}(2)$ et montrer “ $\forall n \in \mathbb{N}, (\mathcal{P}(n) \text{ et } \mathcal{P}(n+1) \text{ et } \mathcal{P}(n+2)) \Rightarrow \mathcal{P}(n+3)$ ” (pour une récurrence triple).

La récurrence forte

Pour montrer une proposition $\mathcal{P}(n)$ pour tout entier n , on peut également montrer les deux propositions suivantes :

- $\mathcal{P}(0)$;
- $\forall n \in \mathbb{N}, (\forall k \in \{0, \dots, n\}, \mathcal{P}(k)) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$.

En effet, par une récurrence simple, les hypothèses précédentes permettent alors de montrer la proposition

$$\mathcal{R}(n) = \text{“}\forall k \in \{0, \dots, n\}, \mathcal{P}(k)\text{”}$$

pour tout entier n .

1.2 L’anneau \mathbb{Z} des entiers relatifs

On ne peut pas définir une soustraction pour tout couple d’éléments de \mathbb{N} , mais on a tout de même la propriété suivante :

Propriété 1.2.1. *Si $n \leq m$ il existe un unique entier k tel que $n + k = m$. On le note $k = m - n$.*

Démonstration. L’existence vient de la définition de la relation d’ordre. Pour l’unicité on suppose $n+k = m = n+q$. La propriété 1.1.6 permet de conclure que $k = q$. \square

On va alors construire l’ensemble des entiers relatifs en rajoutant “à la main” les éléments $n - m$ pour $n < m$.

Définition 1.2.2. *On pose (note 4) $\mathbb{Z} = \{0\} \cup (\{+, -\} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\}))$. Les éléments de la forme $(+, n)$ et $(-, n)$ seront respectivement notés n et $-n$.*

On définit alors l’addition et la multiplication sur \mathbb{Z} à partir de l’addition et la multiplication sur \mathbb{N} en utilisant les règles habituelles pour les signes.

Propriété 1.2.3. *Muni de $+$ et \times , \mathbb{Z} est un anneau commutatif.*

Démonstration. Laissé en exercice. \square

La structure d’anneau est la structure naturelle pour effectuer des additions, soustractions et multiplications. Ceci est formalisé dans la définition suivante :

Définition 1.2.4. *Un anneau A est un ensemble muni de deux loi de composition internes (c’est-à-dire deux fonctions de $A \times A$ dans A), notées $+$ et \times , vérifiant les propriétés “naturelles” suivantes.*

- *l’addition est commutative, associative, possède un élément neutre 0_A et tout élément admet un opposé ;*
- *la multiplication est commutative, associative et possède un élément neutre 1_A ;*
- *la multiplication est distributive par rapport à l’addition.*

Un autre définition de \mathbb{Z} , plus artificielle, mais facilitant les preuves des propriétés classiques de l’addition et de la multiplication se fait en utilisant un quotient de \mathbb{N} .

(note 4). La notation \mathbb{Z} vient du mot allemand “Zahl”, qui signifie “nombre”.

Définition 1.2.5. On définit une relation d'équivalence \sim sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ par $(n, m) \sim (n', m')$ si $n + m' = n' + m$. On appelle \mathbb{Z} l'ensemble des classes d'équivalences de \sim .

On définit la somme de deux éléments de \mathbb{Z} par $(n, m) + (n', m') = (n + n', m + m')$. De même on définit la multiplication par la formule

$$(n, m) \times (n', m') = (nn' + mm', nm' + mn').$$

Cette définition se comprend si l'on voit \mathbb{Z} comme l'ensemble des différences entre deux éléments de \mathbb{N} : la classe d'équivalence de (n, m) est à comprendre comme $n - m$.

1.3 Le corps \mathbb{Q} des rationnels

Un corps est un cas particulier d'anneau dans lequel on peut effectuer des divisions. Plus précisément, on définit :

Définition 1.3.1. Un corps est un anneau dans lequel tout élément non nul est inversible (pour la multiplication).

Les opérations usuelles sont définies de la manière suivante :

Définition 1.3.2. On définit une relation d'équivalence \sim sur $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ par $(n, m) \sim (n', m')$ si $nm' = n'm$. On appelle^(note 5) \mathbb{Q} l'ensemble des classes d'équivalence de \sim . La classe de (n, m) est notée $\frac{n}{m}$. Les éléments de \mathbb{Q} sont appelés nombres rationnels.

Définition 1.3.3. On définit une addition et une multiplication sur \mathbb{Q} par les formules

$$\frac{n}{m} + \frac{n'}{m'} = \frac{nm' + n'm}{mm'} \quad \text{et} \quad \frac{n}{m} \times \frac{n'}{m'} = \frac{nn'}{mm'}.$$

On définit aussi une relation d'ordre sur \mathbb{Q} par

$$\frac{n}{m} \leq \frac{n'}{m'} \Leftrightarrow nm' \leq n'm \quad \text{si } m > 0 \text{ et } m' > 0.$$

La condition $m > 0$ dans la définition de l'ordre n'est pas restrictive puisque tout rationnel à une représentation dont le dénominateur est positif (puisque $\frac{n}{m} = \frac{-n}{-m}$).

L'ensemble \mathbb{Q} est donc muni de deux structures : d'une part d'une structure d'anneau, avec les lois $+$ et \times , d'autre part, d'une structure d'ordre. Dans le cas de \mathbb{Q} ces deux structures sont compatibles au sens suivant.

Définition 1.3.4. Un corps \mathbb{K} est dit ordonné si il est muni d'une relation d'ordre \leq compatible avec la structure de corps, au sens où :

- si x, y et z sont trois éléments de \mathbb{K} avec $x \leq y$, alors $x + z \leq y + z$;
- si x, y et z sont trois éléments de \mathbb{K} avec $0 < z$ et $x < y$ alors, $zx < zy$.

On peut remarque que la multiplication par un élément négatif renverse les inégalités :

Propriété 1.3.5. Dans un corps ordonné, si $z < 0$, et si $x < y$ alors $zy < zx$.

(note 5). La notation \mathbb{Q} vient du mot "quotient".

Démonstration. En ajoutant $-x - y$ à l'inégalité $x < y$, on obtient $-y < -x$, de sorte que la multiplication par -1 renverse les inégalité. Par conséquent, on a $0 < -z$, de sorte que $(-z)x < (-z)y$. En multipliant une deuxième fois par -1 on obtient $zy < zx$. \square

Propriété 1.3.6. *Muni de $+$, \times et \leq , \mathbb{Q} est un corps ordonné.*

Démonstration. Laissez en exercice. \square

Propriété 1.3.7. *Tout corps ordonné contient un unique sous-corps isomorphe à \mathbb{Q} . L'isomorphisme en question est unique.*

Avant de prouver la propriété 1.3.7, on va montrer un lemme.

Lemme 1.3.8. *Dans un corps ordonné \mathbb{K} , on a, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $0_{\mathbb{K}} < n1_{\mathbb{K}}$.*

Démonstration. On procède par récurrence. Tout d'abord, on montre par l'absurde que $0_{\mathbb{K}} < 1_{\mathbb{K}}$. En effet, si $1_{\mathbb{K}} < 0_{\mathbb{K}}$, la multiplication par $1_{\mathbb{K}}$ changerait le signe de l'égalité, et on aurait $1_{\mathbb{K}} > 0_{\mathbb{K}}$, ce qui est contradictoire. On a donc montré la propriété au rang 0. Supposons vraie l'inégalité au rang n : $0_{\mathbb{K}} < n1_{\mathbb{K}}$. Alors, en ajoutant $1_{\mathbb{K}}$ on obtient $1_{\mathbb{K}} < (n+1)1_{\mathbb{K}}$, or $0_{\mathbb{K}} < 1_{\mathbb{K}}$, d'où $0_{\mathbb{K}} < (n+1)1_{\mathbb{K}}$. \square

Démonstration de la propriété 1.3.7. Le lemme 1.3.8 montre que dans un corps ordonné, l'égalité $n1_{\mathbb{K}} = 0$ implique que $n = 0$. On peut donc diviser par tout entier $n \neq 0$. L'ensemble

$$\left\{ \frac{n1_{\mathbb{K}}}{m1_{\mathbb{K}}}, (n, m) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \right\}$$

est donc un sous-corps de \mathbb{K} isomorphe à \mathbb{Q} . L'unicité du morphisme vient du fait que l'image d'un entier n ne peut être que $n1_{\mathbb{K}}$ et donc que l'image du rationnel $\frac{n}{m}$ ne peut être que $\frac{n1_{\mathbb{K}}}{m1_{\mathbb{K}}}$. \square

On fini ce paragraphe par remarquer qu'il y a "autant" de rationnels que d'entiers.

Propriété 1.3.9. *\mathbb{Q} est dénombrable, c'est à dire qu'il existe une bijection de \mathbb{N} sur \mathbb{Q} .*

Démonstration. On va faire cette preuve en admettant le résultat assez intuitif suivant, mais dont la preuve n'est pas si facile, appelé *théorème de Cantor-Bernstein* :

Théorème 1.3.10. *Étant donnés deux ensembles E et F , si il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E , alors il existe une bijection de E dans F .*

Comme l'application identité de \mathbb{N} dans \mathbb{Q} est clairement une injection, le théorème 1.3.10 fait qu'il nous suffit d'exhiber une injection de \mathbb{Q} dans \mathbb{N} pour démontrer la propriété 1.3.9. On définit par exemple l'injection de \mathbb{Q} dans \mathbb{Z} définie par $\frac{n}{m} \mapsto 2^m(2n+1)$, où la fraction $\frac{n}{m}$ aura été choisie telle que m soit positif et le plus petit possible. Ensuite, on exhibe une bijection entre \mathbb{N} et \mathbb{Z} par exemple, l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par

$$f : \begin{cases} 2n+1 & \mapsto n \\ 2n & \mapsto -n \end{cases}$$

convient. \square

1.4 Le corps \mathbb{R} des réels

Dans cette partie, nous allons construire et caractériser le corps des réels.

1.4.1 Définition axiomatique de \mathbb{R}

Nous commençons par une définition axiomatique de \mathbb{R} . Plus précisément, nous allons définir \mathbb{R} comme étant le seul corps vérifiant une certaine propriété. Il restera alors, pour que la définition ait un sens, à montrer qu'il existe effectivement un corps vérifiant cette propriété, et que ce corps est unique.

Commençons par une définition.

Définition 1.4.1. *Un corps ordonné \mathbb{K} est dit Archimédien si quels que soient deux éléments x et y de \mathbb{K} avec $0 < x$ et $0 < y$, il existe un entier positif n tel que $x < ny$.*

Un corps ordonné \mathbb{K} vérifie la propriété de la borne supérieure si tout sous-ensemble non-vide majoré admet une borne supérieure.

On remarquera que \mathbb{Q} est un corps ordonné Archimédien, mais qu'il ne vérifie pas la propriété de la borne supérieure.

Théorème 1.4.2. *Il existe un unique corps ordonné vérifiant la propriété de la borne supérieure, à unique isomorphisme près. On le note \mathbb{R} . Les éléments de \mathbb{R} sont appelés "nombres réels".*

Dans le théorème 1.4.2 on entend par "isomorphisme" un isomorphisme de corps qui soit également une fonction croissante.

Le corps des réels est Archimédien d'après la propriété suivante.

Propriété 1.4.3. *Un corps ordonné vérifiant la propriété de la borne supérieure est nécessairement Archimédien.*

Démonstration. On va raisonner par la contraposée, en montrant qu'un corps non-Archimédien ne vérifie pas la propriété de la borne supérieure.

Par définition, dans un corps ordonné non-Archimédien, il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tels que $n\alpha < \beta$ pour tout n . Par conséquent, $n \leq \frac{\beta}{\alpha}$, ce qui fait que l'ensemble \mathbb{N} est majoré.

Si ω est un majorant de \mathbb{N} , alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n+1 \leq \omega$, d'où $n \leq \omega-1$. Par conséquent, $\omega-1$ est un majorant de \mathbb{N} , et \mathbb{N} n'a donc pas de plus petit majorant, c'est-à-dire pas de borne supérieure.

\mathbb{N} étant une partie majorée n'admettant pas de borne supérieure, le corps considéré ne vérifie pas la propriété de la borne supérieure. \square

Nous allons montrer le théorème 1.4.2 dans les deux parties suivantes : nous allons montrer dans la partie 1.4.2 l'existence d'un corps ordonné vérifiant la propriété de la borne supérieure, puis, dans la partie 1.4.3, que deux tels corps sont isomorphes .

1.4.2 Une construction de \mathbb{R}

Dans cette partie, on va montrer qu'il existe un corps vérifiant les conditions du théorème 1.4.2 en définissant un ensemble que l'on munira d'une addition et d'une multiplication.

L'idée de cette construction est que l'ensemble $\{q \in \mathbb{Q}, q < \alpha\}$ caractérise entièrement le réel α . Comme pour l'instant on n'a défini que l'ensemble \mathbb{Q} , on va chercher à caractériser les ensembles de cette forme sans faire mention des réels. C'est ce qui est fait dans la définition suivante.

Définition 1.4.4. On dit qu'un ensemble $A \subset \mathbb{Q}$ est une coupure (ou coupure de Dedekind) de \mathbb{Q} si :

- il est différent de \mathbb{Q} et \emptyset ;
- pour tout élément q de A , on a $\{r \in \mathbb{Q}, r \leq q\} \subset A$;
- pour tout q de A , il existe $r > q$ avec $r \in A$.




FIGURE 1.1 – La coupure de \mathbb{Q} correspondant au réel $\sqrt{2}$.

L'existence d'un élément $r > q$ dans A permet d'éviter que les deux ensembles $\{q \in \mathbb{Q}, q \leq q_0\}$ et $A_{q_0} = \{q \in \mathbb{Q}, q < q_0\}$ ne soient tous les deux des coupures.

Définition 1.4.5. On note \mathcal{R} l'ensemble des coupures de \mathbb{Q} .

On notera que \mathbb{Q} peut être vu comme un sous-ensemble de \mathcal{R} par l'identification $q \simeq \{r \in \mathbb{Q}, r < q\}$. Toutefois, certaines coupures ne s'identifient à aucun rationnel, comme par exemple $\{q \in \mathbb{Q}, q \leq 0$ ou $q^2 < 2\}$, qui correspondra au réel $\sqrt{2}$. Cette dernière coupure est représentée sur la figure 1.1

Quand on aura construit l'ensemble des réels, on verra que les coupures sont exactement les ensembles de la forme $\{q \in \mathbb{Q}, q < \alpha\}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

Nous allons définir sur \mathcal{R} une structure de corps ordonné, puis nous montrerons que ce corps vérifie la propriété de la borne supérieure.

Définition 1.4.6. — L'ensemble \mathcal{R} est muni de la relation d'ordre \subset .

- \mathcal{R} est muni de la loi de composition interne $+$ définie par

$$A + B = \{q \in \mathbb{Q}, \exists a \in A, \exists b \in B, q = a + b\} = \bigcup_{b \in B} A + b.$$

Propriété 1.4.7. L'ensemble \mathcal{R} muni de $+$ est un groupe commutatif dont l'élément neutre est $\mathcal{O} = \{q \in \mathbb{Q}, q < 0\}$ et l'opposé d'un élément A de \mathcal{R} est donné par

$$-A = \{q \in \mathbb{Q}, \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A, q < -r\}$$

Démonstration. La loi $+$ est commutative et associative. On va montrer que \mathcal{O} est son élément neutre.

- Soit A une coupure. On a

$$A + \mathcal{O} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q < 0} A + q.$$

Or, pour $q < 0$ rationnel, on a $A + q \subset A$, donc $A + \mathcal{O} \subset A$. De plus, si $q \in A$, il existe $r \in A$ avec $q < r$. On a alors

$$q = r + (q - r) \in A + (q - r) \subset A + \mathcal{O},$$

d'où $A \subset A + \mathcal{O}$.

— Soit $q \in -A$. Il existe $r \notin A$ avec $q < -r$. Par conséquent, $A + q \subset A - r$. Or, $r \notin A$, de sorte que $A - r \subset \mathcal{O}$, ce qui montre que $A + (-A) \subset \mathcal{O}$. De même, soit $q < 0$. On va montrer que $q \in A + (-A)$. Soit $r \in A$ tel que $r - \frac{q}{2} \notin A$. Un tel rationnel existe : si ce n'était pas le cas, pour tout $r < q$, l'ensemble $\{r - n\frac{q}{2}, n \in \mathbb{N}\}$ serait inclus dans A , et on aurait $A = \mathbb{Q}$. Le rationnel $-(r - q)$ est alors dans $-A$ (puisque $r - q < r - \frac{q}{2} \notin A$), ce qui montre que $q = r + (q - r)$ est dans $A + (-A)$. On a donc $\mathcal{O} \subset A + (-A)$. \square

On peut également définir une multiplication sur \mathcal{R} :

Définition 1.4.8. Si A et B sont positifs (c'est-à-dire si $\mathcal{O} \subset A$ et $\mathcal{O} \subset B$), on pose :

$$A \times B = \{q \in \mathbb{Q}, \exists \alpha \in A, \exists \beta \in B, a > 0, b > 0, q < ab\}.$$

Pour A et B quelconques, on définit $A \times B$ grâce à la règle des signes.

Propriété 1.4.9. Muni de $+$, \times et \leq , \mathcal{R} est un corps ordonné dont l'élément neutre est $\mathcal{O} = \{q \in \mathbb{Q}, q < 0\}$ et l'élément unité $\mathcal{I} = \{q \in \mathbb{Q}, q < 1\}$.

Démonstration. Laissez en exercice. \square

Propriété 1.4.10. \mathcal{R} vérifie la propriété de la borne supérieure.

Démonstration. Soit \mathcal{X} un sous-ensemble non-vide majoré de \mathcal{R} . On va montrer qu'il admet une borne supérieure. On note $S = \bigcup_{A \in \mathcal{X}} A$ (ne pas oublier que les éléments de \mathcal{R} ont été définis comme des sous-ensembles de \mathbb{Q}). On va en fait montrer que S est la borne supérieure de l'ensemble \mathcal{X} . Montrons tout d'abord que S est une coupure de \mathbb{Q} . Comme \mathcal{X} est non-vide il contient un élément B (et B , qui est une coupure, est non-vide), et $B \subset \bigcup_{A \in \mathcal{X}} A = S$, par conséquent S est non-vide. De plus \mathcal{X} est majoré, donc il existe un élément M (qui, en tant que coupure, est différent de \mathbb{Q}) tel que tout élément B de \mathcal{X} vérifie $B \subset M$. On a alors $S \subset M$ et S est donc différent de \mathbb{Q} . Soit x un élément de S . Comme $S = \bigcup_{A \in \mathcal{X}} A$ il existe un A de \mathcal{X} tel que $x \in A$. Comme A est une coupure, $\{y \in \mathbb{Q}, y \leq x\} \subset A \subset S$ et il existe $z \in A \subset S$ avec $x < z$. L'ensemble S est donc bien une coupure.

Montrons maintenant que S est bien une borne supérieure de \mathcal{X} . Il faut pour cela montrer que S est un majorant de \mathcal{X} , puis que tout majorant de \mathcal{X} est supérieur à S .

Soit B un élément de \mathcal{X} . On a $S = \bigcup_{A \in \mathcal{X}} A$, donc $B \subset S$. S est donc bien un majorant de \mathcal{X} .

Soit maintenant M un majorant de \mathcal{X} . On a donc, pour tout B de \mathcal{X} , l'inclusion $B \subset M$. Par conséquent $S = \bigcup_{A \in \mathcal{X}} A \subset M$. S est donc le plus petit des majorants de \mathcal{X} . \square

1.4.3 Unicité du corps des réels

On va considérer deux corps vérifiant les conditions du théorème 1.4.2 et montrer qu'il existe un unique isomorphisme entre ces deux corps.

On savait déjà par la propriété 1.3.7 qu'un corps ordonné contenait un unique sous-corps isomorphe à \mathbb{Q} (également noté \mathbb{Q} , par abus de notation). On montre maintenant que le fait que \mathbb{K} soit Archimédien revient à dire que ce sous-corps est dense dans \mathbb{K} .

Propriété 1.4.11. Dans un corps ordonné \mathbb{K} Archimédien, on peut encadrer tout élément x par des éléments de \mathbb{Q} arbitrairement proches, au sens où pour tout entier m strictement positif, il existe un encadrement $\frac{n-1}{m} \leq x < \frac{n}{m}$, avec n entier relatif.

De plus, si $x < y$ sont deux éléments de \mathbb{K} on peut trouver un élément q de \mathbb{Q} tel que $x < q < y$.

Démonstration. Quitte à remplacer x par $-x$, on peut supposer que $x > 0$. Soit m un entier naturel. Comme \mathbb{K} est Archimédien, l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}, x < \frac{k}{m}\}$ est non-vide. On note n son plus petit élément. On a donc $\frac{n-1}{m} \leq x < \frac{n}{m}$.

Ensuite, si $x < y$, comme \mathbb{K} est Archimédien, on peut trouver m tel que $m > \frac{1}{y-x}$, de sorte que $\frac{1}{m} < y - x$. Il existe alors, par la première partie de la proposition, un entier n tel que $\frac{n-1}{m} \leq x < \frac{n}{m}$. On a alors, $\frac{n}{m} = \frac{n-1}{m} + \frac{1}{m} < x + (y - x) = y$. Le rationnel $\frac{n}{m}$ vérifie bien $x < \frac{n}{m} < y$. \square

Nous allons maintenant faire la démonstration de l'unicité de \mathbb{R} . Soient \mathbb{R} et \mathbb{R}' deux corps satisfaisant les conditions du théorème 1.4.2. Nous allons construire un isomorphisme entre \mathbb{R} et \mathbb{R}' . Par la propriété 1.3.7, les deux corps \mathbb{R} et \mathbb{R}' contiennent respectivement deux corps \mathbb{Q} et \mathbb{Q}' isomorphes au corps des nombres rationnels. On notera $q \mapsto q'$ l'isomorphisme entre \mathbb{Q} et \mathbb{Q}' . Soit x un élément de \mathbb{R} . On considère le sous-ensemble A_x de \mathbb{Q} défini par

$$A_x = \{q \in \mathbb{Q}, q < x\}.$$

Lemme 1.4.12. *Pour tout x de \mathbb{R} , A_x est majoré et $\sup A_x = x$. Notamment, l'application $x \mapsto A_x$ est une bijection de \mathbb{R} dans l'ensemble des coupures de \mathbb{Q} . De plus, A_x admet également un majorant dans \mathbb{Q} .*

Démonstration. Tout d'abord, A est majoré par x , et la propriété 1.4.11 donne l'existence d'un majorant rationnel de x . Il admet donc une borne supérieure dans \mathbb{R} , notée s . La définition de A montre que $s \leq x$, car x est un majorant de A . Mais si $s < x$, la propriété 1.4.11 donne un rationnel q tel que $s < q < x$. Le rationnel q est alors un élément de A strictement supérieur à $s = \sup A$, ce qui est une contradiction. Par conséquent $x = s$. \square

On note

$$A'_x = \{q' \in \mathbb{Q}', q \in A_x\}.$$

La fin de la preuve va consister à montrer que l'application de \mathbb{R} dans \mathbb{R}' définie par

$$x \mapsto A_x \mapsto A'_x \mapsto x'$$

est l'isomorphisme de corps recherché.

L'ensemble A'_x est un sous-ensemble de \mathbb{R}' majoré par q'_0 , où q_0 est un majorant rationnel de A_x , et admet donc une borne supérieure dans \mathbb{R}' . On définit donc une application φ de \mathbb{R} dans \mathbb{R}' par

$$\varphi : x \mapsto \sup A'_x.$$

On va montrer que φ est un isomorphisme de corps croissant, ce qui achèvera la démonstration.

Tout d'abord, on remarque que si $x \leq y$, on a $A_x \subset A_y$, de sorte que $A'_x \subset A'_y$, ce qui montre que φ est croissant. Ensuite, on remarque que si x et y sont deux éléments de \mathbb{K} , on a $A_x + A_y = A_{x+y}$, ce qui fait que

$$\sup A'_x + \sup A'_y = \sup A'_{x+y}.$$

Des arguments similaires (en séparant les cas suivant le signe de x et y) montrent que

$$\sup A'_x \times \sup A'_y = \sup A'_{xy}.$$

On a donc bien affaire à un morphisme de corps. On peut de même construire un morphisme de corps de \mathbb{R}' vers \mathbb{R} , et l'on montre que ces deux morphismes sont réciproques l'un de l'autre, ce qui montre que l'on a affaire à des isomorphismes.

1.4.4 Quelques propriétés en vrac

Approximation décimale

La propriété 1.4.11 montre que pour tout réel x et tout entier naturel n on peut trouver un encadrement de la forme

$$\frac{k}{10^n} \leq x < \frac{k+1}{10^n}.$$

Les nombres $\frac{k}{10^n}$ et $\frac{k+1}{10^n}$ sont respectivement appelés des approximations décimales de x par défaut et par excès.

Par des divisions Euclidiennes successives, on peut écrire $k = a_0 + 10a_1 + \dots + 10^q a_q$, de sorte que le rationnel $\frac{k}{10^n}$ peut être exprimé sous forme d'un développement décimal *fini*.

On verra plus loin (dans le chapitre sur les séries), comment tout réel s'exprime à l'aide d'un développement décimal, éventuellement infini.

Partie entière

La propriété 1.4.11 montre que pour tout réel x , il existe un unique entier relatif n tel que $n \leq x < n+1$. On appelle n la partie entière de x et on le note généralement $E(x)$.

Valeur absolue

Définition 1.4.13. *Étant donné un réel x , on pose $|x| = \max(-x, x)$. De manière équivalente, si $x \geq 0$ on a $|x| = x$ et si $x < 0$ on a $|x| = -x$.*

Propriété 1.4.14 (Inégalité triangulaire). *Si x et y sont deux réels, on a les inégalités*

$$||x| - |y|| \leq |x - y| \leq |x| + |y|.$$

Démonstration. On a $x \leq |x|$ et $-y \leq |y|$, de sorte que, par addition, $x - y \leq |x| + |y|$. De même, on a $y - x \leq |x| + |y|$. Comme $|x - y| = \max(x - y, y - x)$, on a prouvé l'inégalité de droite.

Pour la première inégalité, on écrit, en utilisant la deuxième,

$$|x| = |y + (x - y)| \leq |y| + |x - y|,$$

ce qui donne $|x| - |y| \leq |x - y|$. De même, on a $|y| - |x| \leq |x - y|$. On a alors $||x| - |y|| = \max(|x| - |y|, |y| - |x|) \leq |x - y|$. \square

Approximation rationnelle quadratique

On va ici préciser la propriété 1.4.11. En effet, étant donné un réel x et un entier m , il existe un encadrement

$$\frac{n}{m} \leq x < \frac{n+1}{m}. \tag{1.7}$$

Une majoration de l'erreur dans cette approximation est alors donnée par $|x - \frac{n}{m}| \leq \frac{1}{m}$. On va montrer que si m est bien choisi, on peut avoir une approximation bien plus précise.

Propriété 1.4.15. Soit x un nombre réel et soit N un entier naturel. Il existe n et m deux entiers avec $n \leq N$ et $m \leq N$ tels que

$$\left| \frac{n}{m} - x \right| \leq \frac{1}{mN}. \quad (1.8)$$

On peut remarquer que $\frac{1}{mN}$ est inférieur à $\frac{1}{m^2}$ qui est très inférieur à $\frac{1}{m}$, de sorte que l'approximation (1.8) est bien meilleure que l'approximation (1.7).

Démonstration. Pour tout $m \in \{0, \dots, N\}$, il existe un entier n_m tel que

$$n_m \leq mx < n_m + 1.$$

On considère alors l'ensemble

$$A = \{mx - n_m, m \in \{0, \dots, N\}\} \subset [0, 1[.$$

L'ensemble A a $N + 1$ éléments, donc si on écrit $[0, 1]$ comme une union de N intervalles :

$$[0, 1] = \bigcup_{k=1}^N \left[\frac{k-1}{N}, \frac{k}{N} \right],$$

il existe un entier k tel que $\left[\frac{k-1}{N}, \frac{k}{N} \right] \cap A$ ait deux éléments ^(note 6) $px - n_p$ et $qx - n_q$, avec $p \neq q$. On a donc

$$|(q-p)x - (n_q - n_p)| \leq \frac{1}{N}.$$

On en déduit que

$$\left| x - \frac{n_q - n_p}{q-p} \right| \leq \frac{1}{(q-p)N}.$$

Il suffit de poser $n = n_q - n_p$ et $m = q - p$ pour conclure. □

1.5 Exercices

Exercice 1.1.

Montrer les propriétés suivantes :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \sum_{k=1}^n k^3.$$

Exercice 1.2.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, montrer l'égalité

$$\sum_{k=1}^n C_k^p = C_{n+1}^{p+1}.$$

Exercice 1.3.

Que pensez-vous du raisonnement suivant ?

(note 6). On met $N + 1$ objets dans N ensembles. Par conséquent, les $N + 1$ objets ne peuvent pas tous se retrouver dans des ensembles distincts. Ce principe s'appelle le *principe des tiroirs*.

- On veut montrer par récurrence la propriété suivante : un groupe de n personnes étant donné, ces personnes sont toutes de même sexe.
- La propriété est vraie au rang 1 : un groupe d'une personne est composé soit d'un homme, soit d'une femme.
- On suppose la propriété vraie au rang n . On considère alors un groupe de $n + 1$ personnes dont on distingue deux personnes a et b . En écartant a , on obtient un groupe de n personnes qui sont donc (hypothèse de récurrence) toutes de même sexe. b est donc de même sexe que les $n - 1$ autres personnes. De même, en écartant b , on montre que a est de même sexe que les $n - 1$ autres. La propriété est démontrée au rang $n + 1$.

Exercice 1.4.

Soit x un réel tel que pour tout entier naturel n , on ait $|x| \leq \frac{1}{n}$. Montrer que $x = 0$.

Exercice 1.5.

Déterminer les bornes supérieures (resp. inférieures) des ensembles suivants si elles existent, et dire si ce sont des plus grands (resp. plus petits) éléments :

$$\left\{ \frac{n+1}{n^2+1}, n \in \mathbb{N} \right\} ; \left\{ \sqrt{\frac{2n^2}{(n+2)(n+1)}}, n \in \mathbb{N} \right\} ; \left\{ \frac{n}{nm+1}, (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N} \right\}.$$

Exercice 1.6.

Soient A et B deux sous-ensembles non-vides de \mathbb{R} satisfaisant la propriété :

$$\forall a \in A, \forall b \in B, a \leq b.$$

Montrer que $\sup A \leq \inf B$.

Exercice 1.7.

Soient A et B deux sous-ensembles non-vides bornés de \mathbb{R} . Montrer les relations :

$$\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B) ; \sup(A \cap B) \leq \min(\sup A, \sup B) ; A \subset B \Rightarrow \sup A \leq \sup B.$$

Exercice 1.8.

Soit A un sous-ensemble borné non-vide de \mathbb{R} . On pose $-A = \{x \in \mathbb{R}, -x \in A\}$. Montrer que $\sup(-A) = -\inf A$ et $\inf(-A) = -\sup A$.

Exercice 1.9.

Soit A une partie non vide majorée de \mathbb{R} . Montrer la proposition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, \sup A - \varepsilon \leq x.$$

Exercice 1.10.

Soit A une partie non vide majorée de \mathbb{R} . On suppose que $\sup A \notin A$. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$ l'ensemble $A \cap]\sup A - \varepsilon, \sup A[$ contient une infinité d'éléments.

Exercice 1.11.

Soit A une partie de \mathbb{R} . On désigne par $\mathcal{B}(A, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions bornées de A dans \mathbb{R} . Montrer que pour f et g dans $\mathcal{B}(A, \mathbb{R})$, on a

$$\sup_A (f + g) \leq \sup_A f + \sup_A g \quad \text{et} \quad \inf_A (f + g) \geq \inf_A f + \inf_A g.$$

Donner un cas où les inégalités ci-dessus sont strictes. On fera attention de vérifier que toutes les quantités écrites ont un sens. Pour $f, g \in \mathcal{B}(A, \mathbb{R})$, on pose

$$d(f, g) = \sup_{x \in A} |f(x) - g(x)|.$$

Pourquoi la quantité $d(f, g)$ est-elle bien définie ? Montrer que si f, g et h sont trois fonctions de $\mathcal{B}(A, \mathbb{R})$, alors

$$d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h).$$

Exercice 1.12.

On va chercher à classer les sous-groupes de \mathbb{R} . On considère donc G un sous-groupe de \mathbb{R} , et on va différencier selon deux cas. On suppose que $G \neq \{0\}$.

1. Montrer que le réel $\alpha = \inf G \cap]0, \infty[$ est bien défini.
2. On suppose $\alpha > 0$. Montrer que $G = \alpha\mathbb{Z}$.
3. On suppose $\alpha = 0$. Montrer que pour tout réel x et tout réel $\varepsilon > 0$, l'ensemble $G \cap [x, x + \varepsilon]$ est non vide. On dit que G est *dense* dans \mathbb{R} .
4. On s'intéresse à l'ensemble $G_\lambda = \{n + k\lambda, (n, k) \in \mathbb{Z}^2\}$. Que peut on dire de G_λ en fonction de λ , au vu des questions précédentes ?

Exercice 1.13.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ croissante. Montrer que l'ensemble $E = \{x \in [0, 1], x \leq f(x)\}$ admet une borne supérieure α . Montrer que $f(\alpha) = \alpha$.

Chapitre 2

Suites numériques

2.1 Un peu de vocabulaire

Définition 2.1.1. Une suite réelle est une fonction de \mathbb{N} dans \mathbb{R} .

On utilisera la notation $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour désigner les suites de réels, où u_n est l'image de n par la suite. L'ensemble des suites réelles (parfois noté $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$) peut être muni d'une structure d'espace vectoriel sur \mathbb{R} en définissant, pour deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et un réel λ

$$\lambda \cdot (u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

et

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Définition 2.1.2. On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si elle vérifie la proposition

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n.$$

Si l'inégalité est stricte, on dit que la suite est strictement croissante. De même on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si elle vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n,$$

et qu'elle est strictement décroissante si l'inégalité est stricte. Une suite croissante ou décroissante est dite monotone.

Définition 2.1.3. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite majorée si elle vérifie

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M.$$

De même, on définit une suite minorée. Une suite majorée et minorée est dite bornée.

2.2 Convergence des suites

Définition 2.2.1. On dit qu'une suite de réels converge vers un réel l si elle satisfait la proposition suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N) \Rightarrow (|u_n - l| < \varepsilon).$$

Autrement dit, si on se fixe *a priori* un seuil d'erreur ε , il suffira d'aller assez loin dans la suite (au-delà de N) pour que tous les termes de la suite valent l , avec une erreur inférieure au seuil ε . Cette définition est illustrée sur la figure 2.1.




FIGURE 2.1 – Convergence d'une suite. À partir d'un certain rang n , tous les termes de la suite se trouvent dans l'intervalle $[l - \varepsilon, l + \varepsilon]$.

Si une suite ne converge pas, on dit qu'elle *diverge*.

Propriété 2.2.2. Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l , alors ce réel est unique, on l'appelle la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on le note $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. On utilisera également la notation $u_n \rightarrow_n l$.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente, et soient deux réels l et l' , avec $l < l'$. Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers l , et montrons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers l' . On pose $\varepsilon = \frac{l' - l}{2}$. Par définition de la convergence d'une suite, il existe un entier N tel que si $n \geq N$, on a $|u_n - l| < \varepsilon$. L'inégalité triangulaire donne alors que pour $n \geq N$,

$$2\varepsilon = l' - l \leq |u_n - l'| + |u_n - l| < \varepsilon + |u_n - l'|.$$

Autrement dit, $|u_n - l'| > \varepsilon$ pour n assez grand, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne peut pas converger vers l' . \square

En revanche, certaines suites ne convergent vers aucun réel. Par exemple, la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas. On prendra donc garde à ne pas utiliser la quantité $\lim_n u_n$ avant d'avoir montré que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Notamment, on se souviendra que la notation $u_n \rightarrow_n l$ signifie : “la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et sa limite vaut $\lim_n u_n = l$ ”.

Par exemple, si on définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1 - u_n$, on pourrait être tenté de passer à la limite dans la relation de récurrence et obtenir $\lim_n u_n = 1 - \lim_n u_n$, ce qui se résout en $\lim_n u_n = 1/2$. Or, ici on n'a pas vérifié que la suite admettait une limite. Effectivement, on vérifie sans peine qu'en fait $u_n = \frac{1}{2}(1 + (-1)^n)$, ce qui fait que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas de limite.

Propriété 2.2.3. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l si et seulement si la suite $(u_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Démonstration. Il suffit de récrire la définition. □

Propriété 2.2.4. Si deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent, alors leur somme converge et vérifie

$$\lim_n (u_n + v_n) = \lim_n u_n + \lim_n v_n.$$

De même si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et si λ est un réel, alors $\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et sa limite vaut :

$$\lim_n \lambda u_n = \lambda \lim_n u_n.$$

Autrement dit, l'ensemble des suites convergentes est un espace vectoriel et l'application $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_n u_n$ est linéaire.

Démonstration. — Pour la suite $\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$ on ait $|u_n - \lim_n u_n| \leq \frac{\varepsilon}{\lambda}$. On a alors pour $n \geq N$,

$$\left| \lambda u_n - \lambda \lim_n u_n \right| \leq \varepsilon.$$

— Pour la somme de deux suites :

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait ^(note 1)

$$\left| u_n - \lim_n u_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad \left| v_n - \lim_n v_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

On a alors pour $n \geq N$

$$\left| (u_n + v_n) - (\lim_n u_n + \lim_n v_n) \right| \leq \left| u_n - \lim_n u_n \right| + \left| v_n - \lim_n v_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Propriété 2.2.5. Une suite convergente est bornée.

(note 1). La convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donne un entier N_1 à partir duquel $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à moins de $\varepsilon/2$ de sa limite. De même, on a un entier N_2 à partir duquel $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à moins de $\varepsilon/2$ de sa limite. On prend alors $N = \max(N_1, N_2)$.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergeant vers une limite l . Par définition de la convergence d'une suite (avec $\varepsilon = 1$), il existe un entier N tel que si $n \geq N$, alors

$$|u_n - l| \leq 1, \quad \text{ou encore} \quad l - 1 \leq u_n \leq l + 1.$$

On a donc, pour tout n , l'encadrement

$$\min(u_0, \dots, u_N, l - 1) \leq u_n \leq \max(u_0, \dots, u_N, l + 1).$$

□

La réciproque est bien entendu fausse, la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant bornée sans être convergente (pour montrer que cette suite n'est pas convergente, on peut par remarquer qu'elle n'est pas de Cauchy, puisque $|u_n - u_{n+1}| = 2$, voir propriété 2.3.8).

La propriété 2.2.5 nous permet de montrer que la convergence est aussi stable par produit :

Propriété 2.2.6. *Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites convergentes, alors la suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et vérifie*

$$\lim_n u_n v_n = \left(\lim_n u_n \right) \left(\lim_n v_n \right).$$

De plus, si $\lim_n v_n \neq 0$, alors à partir d'un certain rang, on a $v_n \neq 0$, de sorte que l'on peut parler de la convergence de la suite $\left(\frac{u_n}{v_n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$. Cette suite converge et on a

$$\lim_n \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim_n u_n}{\lim_n v_n}.$$

Démonstration. Les suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes donc bornées. Soit donc M tel que $|u_n| \leq M$ et $|v_n| \leq M$ quel que soit n . Soit $\varepsilon > 0$ un réel. Comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait ^(note 2)

$$\left| u_n - \lim_n u_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{2M} \quad \text{et} \quad \left| v_n - \lim_n v_n \right| \leq \frac{\varepsilon}{2M}.$$

On a alors, pour $n \geq M$

$$\begin{aligned} \left| u_n v_n - \lim_n u_n \lim_n v_n \right| &\leq \left| u_n v_n - u_n \lim_n v_n \right| + \left| u_n \lim_n v_n - \lim_n u_n \lim_n v_n \right| \\ &= |u_n| \left| v_n - \lim_n v_n \right| + \left| u_n - \lim_n u_n \right| \left| \lim_n v_n \right| \\ &\leq M \frac{\varepsilon}{2M} + \frac{\varepsilon}{2M} M = \varepsilon. \end{aligned}$$

On a bien la convergence de $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers le produit des limites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour la deuxième partie de la propriété, en prenant $\varepsilon = \frac{|\lim_n v_n|}{2} > 0$ dans la définition de la convergence de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on trouve un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait $|v_n - \lim_n v_n| \leq \frac{|\lim_n v_n|}{2}$, ce qui implique

$$|v_n| \geq \left| \lim_n v_n \right| - \left| v_n - \lim_n v_n \right| \geq \left| \lim_n v_n \right| - \frac{|\lim_n v_n|}{2} = \frac{|\lim_n v_n|}{2}.$$

(note 2). Voir (note 1).

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend donc bien des valeurs non-nulles pour $n \geq N$. Il suffit maintenant de montrer que $\left(\frac{1}{v_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\frac{1}{\lim_n v_n}$. Remarquons que

$$\frac{1}{v_n} - \frac{1}{\lim_n v_n} = \frac{\lim_n v_n - v_n}{v_n \lim_n v_n}.$$

On a vu précédemment qu'il existe un entier N pour lequel, si $n \geq N$, on a $|v_n| \geq \frac{|\lim_n v_n|}{2}$. On a donc, pour $n \geq N$

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{\lim_n v_n} \right| = \frac{|\lim_n v_n - v_n|}{|v_n \lim_n v_n|} \leq 2 \frac{|\lim_n v_n - v_n|}{|\lim_n v_n|^2}.$$

Soit $\varepsilon > 0$ un réel. Il existe un entier \tilde{N} tel que si $n \geq \tilde{N}$, on a $|v_n - \lim_n v_n| \leq \frac{|\lim_n v_n|^2 \varepsilon}{2}$. Par conséquent, si $n \geq \max(N, \tilde{N})$, on a

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{\lim_n v_n} \right| \leq 2 \frac{|\lim_n v_n - v_n|}{|\lim_n v_n|^2} \leq \varepsilon,$$

ce qui achève la preuve. □

Définition 2.2.7. On dit qu'une suite réelle diverge vers ∞ si elle vérifie la proposition

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq M.$$

On notera alors $\lim_n u_n = \infty$ ou $u_n \rightarrow_n \infty$. De même, on dit qu'une suite réelle diverge vers $-\infty$ si elle vérifie la proposition

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq M.$$

On utilisera alors la notation $\lim_n u_n = -\infty$ ou $u_n \rightarrow_n -\infty$.

En réalité, certaines propriétés des suites convergentes se généralisent aux suites divergentes vers ∞ ou $-\infty$. Notamment, les propriétés 2.2.4 et 2.2.6 restent vraies pour des suites qui divergent vers $\pm\infty$, si l'on suit les règles d'addition et de multiplication pour les infinis (avec $x \in \mathbb{R}$) :

$$\infty + x = \infty ; \quad \infty + \infty = \infty ; \quad \infty \times \infty = \infty ; \quad \frac{x}{\infty} = 0.$$

On peut également ajouter les règles

$$x \times \infty = \text{signe}(x)\infty ; \quad \frac{x}{0^+} = \text{signe}(x)\infty,$$

où x est dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et où 0^+ désigne la limite d'une suite convergeant vers 0 par valeurs positives. On fera en revanche attention aux formes indéterminées

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0} \quad \text{et} \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

Par conséquent, on s'autorisera également à dire qu'une suite "converge vers ∞ " (ou vers $-\infty$). Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente (vers un réel) ou diverge vers $\pm\infty$, on dira que la $\lim_n u_n$ existe dans $[-\infty, \infty]$. Pour éviter les confusions, on précisera à chaque fois si la suite converge vers un réel fini ou converge dans $[-\infty, \infty]$.

On a une propriété de préservation de l'ordre par passage à la limite.

Propriété 2.2.8. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles. On suppose que $\lim_n u_n$ et $\lim_n v_n$ existent dans $[-\infty, \infty]$. Si pour tout entier n on a l'inégalité $u_n \leq v_n$, alors les limites vérifient

$$\lim_n u_n \leq \lim_n v_n.$$

Démonstration. On ne traite que le cas où les limites sont finies, les cas où au moins une des limites est infinie se traitant de manière similaire. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergentes telles que

$$\lim_n u_n > \lim_n v_n.$$

On va exhiber un entier N tel que $u_N > v_N$, ce qui achèvera la preuve. Soit $\varepsilon = \frac{\lim_n u_n - \lim_n v_n}{2}$. Il existe un entier N tel que la proposition suivante soit vérifiée :

$$\forall m \geq N, |u_m - \lim_n u_n| < \varepsilon \text{ et } |v_m - \lim_n v_n| < \varepsilon.$$

On en déduit alors, par l'inégalité triangulaire,

$$v_N < \lim_n v_n + \varepsilon = \frac{\lim_n u_n + \lim_n v_n}{2} = \lim_n u_n - \varepsilon < u_N,$$

ce qui montre que $v_{n_0} < u_{n_0}$. □

Il est important de remarquer que l'inégalité $u_n < v_n$ ne donne pas une inégalité stricte à la limite : par exemple, on a $0 < \frac{1}{n}$, mais $\lim_n 0 = 0 = \lim_n \frac{1}{n}$.

2.3 Quelques critères de convergence

2.3.1 Suites monotones

Propriété 2.3.1. Une suite croissante et majorée est convergente (vers une limite finie). De même, une suite décroissante et minorée converge.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante et majorée. On va montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\sup_n u_n$ (qui est bien défini et appartient à \mathbb{R} , la suite étant majorée).

Soit ε un réel positif. Par définition de la borne supérieure, il existe un entier N tel que $u_N \geq \sup_n u_n - \varepsilon$. Comme la suite est croissante, on a donc, pour tout $n \geq N$, l'inégalité

$$\sup_n u_n - \varepsilon \leq u_N \leq u_n \leq \sup_n u_n.$$

Par conséquent, on a pour tout $n \geq N$, $|u_n - \sup_n u_n| \leq \varepsilon$. Ce qui achève la preuve. □

La propriété 2.3.1 dit en substance qu'une suite croissante ne peut avoir que deux comportements : ou bien elle est bornée, auquel cas elle converge vers un réel fini, ou bien elle n'est pas bornée, auquel cas elle tend vers ∞ . Cette propriété peut sembler évidente à première vue, mais elle repose en fait fortement sur la *complétude* de \mathbb{R} . Notamment, pour exhiber une limite à la suite, on a dû utiliser la

propriété de la borne supérieure. La propriété 2.3.1 n'est notamment pas vraie dans \mathbb{Q} . Par exemple, la suite

$$3 ; 3.1 ; 3.14 ; 3.141 ; 3.1415 ; 3.14159 ; 3.141592 ; \dots, \quad (2.1)$$

où l'on rajoute à chaque itération une décimale de π est bien croissante mais ne converge pas dans \mathbb{Q} , puisque sa limite vaut π , qui n'est pas dans \mathbb{Q} .

2.3.2 Suites adjacentes

La définition suivante permet de donner un critère efficace de convergence des suites.

Définition 2.3.2. On dit que deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes si elles vérifient les propriétés suivantes :

- Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont respectivement croissante et décroissante ;
- on a la convergence $v_n - u_n \rightarrow_n 0$.

On peut remarquer que deux suites adjacentes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifient nécessairement $u_n \leq v_n$, pour tout entier n . En effet, la suite $(v_n - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant décroissante et convergeant vers 0, elle est à termes positifs ou nuls.

La notion de suites adjacentes tire son intérêt du théorème suivant.

Théorème 2.3.3. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites adjacentes, alors elles convergent (dans \mathbb{R}) et leur limites sont égales. De plus on a, pour tout n entier, l'inégalité

$$u_n \leq \lim_n u_n = \lim_n v_n \leq v_n.$$

Démonstration. Par définition de suites adjacentes, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0.$$

Par conséquent, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée (par v_0), et la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée (par u_0). Par la propriété 2.3.1, ces suites sont donc convergentes vers des limites finies. De plus, on a

$$\lim_n u_n - \lim_n v_n = \lim_n u_n - v_n = 0,$$

les limites sont donc égales. □

Une autre forme de ce théorème est la suivante.

Propriété 2.3.4 (Théorème des segments emboîtés). Si $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de segments de \mathbb{R} qui est décroissante, au sens où

$$I_{n+1} \subset I_n$$

et si la taille des I_n tend vers 0 au sens où

$$|\sup I_n - \inf I_n| \rightarrow 0.$$

Alors, l'ensemble $\bigcap_n I_n$ contient un unique élément.

Démonstration. Il suffit de remarquer que les suite $(\inf I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\sup I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes qui convergent donc vers une limite commune l . On montre alors que $\bigcap_n I_n = \{l\}$. En effet $\inf I_n \leq l \leq \sup I_n$ pour tout n puisque les suites sont adjacentes, donc $l \in \bigcap_n I_n$. De plus, si $x \neq l$, disons pour fixer les idées $l < x$, alors $\sup I_n < x$ à partir d'un certain rang n_0 et donc $x \notin I_{n_0}$. □

2.3.3 Le théorème “des gendarmes”

Propriété 2.3.5 (Théorème des gendarmes). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites telles que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite finie l . On suppose que pour tout n , on ait l'inégalité

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Alors $\lim_n v_n$ existe et vaut l .

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la convergence des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$, il existe un entier N tel si $n \geq N$, on a $|u_n - l| \leq \varepsilon$ et $|w_n - l| \leq \varepsilon$. Or, on a $u_n - l \leq v_n - l \leq w_n - l$, ce qui implique que $|v_n - l| \leq \max(|u_n - l|, |w_n - l|)$. Par conséquent, si $n \geq N$, on a $|v_n - l| \leq \max(|u_n - l|, |w_n - l|) \leq \varepsilon$. \square

Propriété 2.3.6. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites vérifiant pour tout n l'inégalité $u_n \leq v_n$ et supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers ∞ . Alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers ∞ .

De même si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $-\infty$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $-\infty$.

Démonstration. On ne fait la preuve que dans le cas où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers ∞ , l'autre cas étant totalement similaire. Soit M un réel. Par définition, il existe N tel que si $n \geq N$, on a $M \leq u_n \leq v_n$, ce qui achève la preuve. \square

2.3.4 Suites de Cauchy

Un critère puissant et général pour caractériser les suites convergentes est le suivant.

Définition 2.3.7. On dit qu'une suite de réels est de Cauchy si elle vérifie la propriété suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \in \mathbb{N}, (n \geq N \text{ et } m \geq N) \Rightarrow (|u_n - u_m| \leq \varepsilon).$$

Cette proposition peut se comprendre comme

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} |u_n - u_m| = 0.$$

La propriété importante des suites de Cauchy est la suivante :

Propriété 2.3.8. Une suite réelle converge dans \mathbb{R} si et seulement si elle est de Cauchy.

Le fait qu'une suite convergente soit de Cauchy est un fait général, mais la réciproque est directement liée à la propriété de la borne supérieure. Par exemple la suite définie en (2.1) est une suite de Cauchy de \mathbb{Q} mais ne converge pas dans \mathbb{Q} (sa limite est dans $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$). Pour démontrer la propriété 2.3.8, on va donc devoir utiliser une propriété vérifiée par \mathbb{R} mais pas par \mathbb{Q} , par exemple la propriété 2.3.1.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit convergente (vers une limite $l \in \mathbb{R}$) et soit ε un réel positif. Il existe un entier N tel que si $n \geq N$, $|u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Par conséquent, si $n, m \geq N$, on a

$$|u_n - u_m| \leq |u_n - l| + |u_m - l| \leq \varepsilon.$$

La suite est donc bien de Cauchy.

Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit de Cauchy. On remarquera, en prenant par exemple $\varepsilon = 1$ dans la définition d'une suite de Cauchy, que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. La propriété de la borne supérieure permet donc de définir $l_n = \sup_{k \geq n} u_k$, qui est également une suite bornée (car $l_n \in [\inf_n u_n, \sup_n u_n]$). La suite $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de plus décroissante (en effet $\{u_k, k \geq n+1\} \subset \{u_k, k \geq n\}$, de sorte que $\inf_{k \geq n+1} u_k \leq \inf_{k \geq n} u_k$). Elle est donc convergente vers une limite l , par la propriété 2.3.1. Montrons maintenant que l est la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$ et $m \geq N$, on a $|u_n - u_m| \leq \varepsilon$. On a donc

$$u_n - \varepsilon \leq u_m \leq u_n + \varepsilon.$$

Soit $k \geq N$. En prenant la borne supérieure sur $m \geq k$, on trouve

$$u_n - \varepsilon \leq l_k \leq u_n + \varepsilon,$$

et en prenant la limite en $k \rightarrow \infty$, on obtient

$$u_n - \varepsilon \leq l \leq u_n + \varepsilon.$$

On a donc montré $|u_n - l| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$, et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l . \square

On remarquera qu'on a effectivement eu besoin d'utiliser la complétude de \mathbb{R} pour montrer que les suites de Cauchy convergent, à travers la propriété 2.3.1.

2.3.5 Valeurs d'adhérences, limites inférieures et supérieures

En fait, dans la preuve de la propriété 2.3.8, on a utilisé sans en parler la notion suivante.

Définition 2.3.9. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On appelle limite supérieure de la suite la quantité (appartenant à $[-\infty, \infty]$) définie par ^(note 3)

$$\limsup_n u_n = \lim_N \sup_{n \geq N} u_n = \inf_N \sup_{n \geq N} u_n.$$

De même, on appelle limite inférieure la quantité (appartenant à $[-\infty, \infty]$) définie par

$$\liminf_n u_n = \lim_N \inf_{n \geq N} u_n = \sup_N \inf_{n \geq N} u_n.$$

On a toujours l'inégalité

$$\liminf_n u_n \leq \limsup_n u_n.$$

Cette définition est illustrée sur la figure 2.2.

Démonstration de l'inégalité. On a $\inf_{k \geq n} u_k \leq u_n \leq \sup_{k \geq n} u_k$. On conclut en passant à la limite que $\liminf_n u_n \leq \limsup_n u_n$. \square

(note 3). Comme la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\sup_{n \geq N} u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, elle converge vers sa borne inférieure, quitte à considérer une borne inférieure infinie : si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée, alors elle converge vers sa borne inférieure par la propriété 2.3.1, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas minorée, elle tend vers $-\infty$ (puisque'elle est décroissante), qui est bien sa borne inférieure.




FIGURE 2.2 – Limites supérieure et inférieure d'une suite.

L'intérêt de cette notion est que *toute* suite réelle admet une limite supérieure et une limite inférieure (éventuellement infinies). On peut donc toujours passer à la limite inférieure ou supérieure, sans avoir à tout d'abord vérifier une quelconque convergence, contrairement aux limites classiques.

Le lien entre la notion de limite supérieure/inférieure et la notion de limite est donné par la propriété suivante.

Propriété 2.3.10. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si $\limsup_n u_n$ et $\liminf_n u_n$ sont égales, et sa limite est alors donnée par

$$\lim_n u_n = \liminf_n u_n = \limsup_n u_n.$$

Démonstration. On ne fait que la preuve dans le cas où les limites sont finies. Le cas des limites infinies est similaire.

Supposons que $\limsup_n u_n = \limsup_n v_n = l$, et soit ε un réel strictement positif. Comme les suites $(\inf_{n \geq N} u_n)_{N \in \mathbb{N}}$ et $(\sup_{n \geq N} u_n)_{N \in \mathbb{N}}$ convergent vers l respectivement en croissant et en décroissant, il existe un entier N tel que pour $n \geq N$, on ait

$$l \leq \sup_{n \geq N} u_n \leq l + \varepsilon \quad \text{et} \quad l - \varepsilon \leq \inf_{n \geq N} u_n \leq l.$$

On a alors, pour $n \geq N$,

$$l - \varepsilon \leq \inf_{n \geq N} u_n \leq u_n \leq \sup_{n \geq N} u_n \leq l + \varepsilon,$$

et $|u_n - l| \leq \varepsilon$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc bien vers l .

Inversement, si u_n converge, pour $\varepsilon > 0$ fixé, il existe un entier N tel que $|u_n - \lim_n u_n| \leq \varepsilon$. Par conséquent, $u_n \in [\lim_n u_n - \varepsilon, \lim_n u_n + \varepsilon]$. En passant à la borne inférieure, on trouve, pour $n \geq N$

$$\inf_{k \geq n} u_k \in [\lim_n u_n - \varepsilon, \lim_n u_n + \varepsilon] \quad \text{d'où} \quad \liminf_n u_n \in [\lim_n u_n - \varepsilon, \lim_n u_n + \varepsilon]$$

et de même pour la limite supérieure. Cette inclusion étant vraie pour tout $\varepsilon > 0$, on a bien $\limsup_n u_n = \liminf_n u_n = \lim_n u_n$. \square

Définition 2.3.11. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On appelle sous-suite, ou suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, où φ est une fonction strictement croissante de \mathbb{N} dans \mathbb{N} .

Remarquer que si l'on considère la sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et que l'on en extrait à nouveau une sous-suite, le résultat est de la forme $(u_{\varphi(\psi(n))})_{n \in \mathbb{N}}$.

Par exemple, $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites extraites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. De plus, $(u_{2(2n+1)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, mais pas de $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 2.3.12. On dit que $l \in [-\infty, \infty]$ est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si il existe une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers l . Par extension, on dit que ∞ (ou $-\infty$) est valeur d'adhérence si il existe une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui diverge vers ∞ (ou $-\infty$).

On peut redéfinir les notions de limites supérieures et inférieures à partir de la notion de sous-suites.

Propriété 2.3.13. La limite supérieure (resp. inférieure) d'une suite est la plus grande (resp. petite) de ses valeurs d'adhérence.

Démonstration. Soit $\lambda \in [-\infty, \infty]$ une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Il existe une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers λ . Or, on a

$$\inf_{k \geq \varphi(n)} u_k \leq u_{\varphi(n)} \leq \sup_{k \geq \varphi(n)} u_k.$$

En passant à la limite $n \rightarrow \infty$, on trouve

$$\liminf_n u_n \leq \lambda \leq \limsup_n u_n.$$

Par conséquent, $\limsup_n u_n$ est plus grand que toute valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Pour montrer que la limite supérieure est la plus grande valeur d'adhérence, il ne reste plus qu'à montrer que c'est effectivement une valeur d'adhérence. Pour cela on construit par récurrence une sous-suite qui converge vers la limite supérieure. On pose $\varphi(0) = 0$. Soit n un entier. On suppose φ défini jusqu'au rang n . On pose alors

$$\varphi(n+1) = \min A_n, \quad \text{avec} \quad A_n = \left\{ k \in \mathbb{N}, k > \varphi(n) \text{ et } u_k \geq \left(\sup_{q > \varphi(n)} u_q - \frac{1}{n+1} \right) \right\}.$$

Par la propriété 1.1.13, l'ensemble A_n est un sous-ensemble non-vidé de \mathbb{N} . Par conséquent, il admet un plus petit élément, et la définition de φ a bien un sens, et par définition, $\varphi(n+1) > \varphi(n)$. La fonction φ définit donc bien une sous-suite. On a alors, pour $n \geq 1$,

$$\sup_{q > \varphi(n-1)} u_q - \frac{1}{n} \leq u_{\varphi(n)} \leq \sup_{q > \varphi(n-1)} u_q.$$

En appliquant le théorème des gendarmes, on trouve que $u_{\varphi(n)} \rightarrow \limsup_n u_n$. Une construction symétrique convient pour la limite inférieure. \square

On en déduit le résultat suivant.

Propriété 2.3.14. *Une suite converge (dans $[-\infty, \infty]$) ssi elle a une unique valeur d'adhérence.*

Démonstration. C'est une conséquence immédiate des propriétés 2.3.10 et 2.3.13. \square

Théorème 2.3.15 (Bolzano-Weierstrass). *Toute suite bornée admet une sous-suite convergente (vers un réel fini).*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée : pour tout n , on a $-M \leq u_n \leq M$ pour un certain réel M . Par conséquent, $-M \leq \limsup_n u_n \leq M$, et la limite supérieure de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un réel fini. Par la propriété 2.3.13 ; il existe une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\limsup_n u_n$, ce qui montre le résultat. \square

2.4 Relations de comparaison

On utilise les notations suivantes pour comparer les croissances de deux suites.

Définition 2.4.1 (Notations de Landau). *Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles.*

— *On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est négligeable devant $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on note $u_n = o(v_n)$ (ou parfois $u_n \ll v_n$) si on peut écrire*

$$u_n = \varepsilon_n v_n, \text{ avec } \varepsilon_n \rightarrow_n 0.$$

Si $v_n \neq 0$, cette définition revient à

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0 ;$$

— *on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dominée par $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on note $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ si il existe $M > 0$ tel que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M|v_n|.$$

Si $v_n \neq 0$, cette définition revient à

$$\left(\frac{u_n}{v_n} \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée ;}$$

— *on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est équivalente à $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on note $u_n \sim v_n$ si*

$$u_n - v_n = o(v_n)$$

Si $v_n \neq 0$, cette définition revient à

$$\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1.$$

On remarquera que les notations $u_n = o(1)$, $u_n = \mathcal{O}(1)$ et $u_n \sim \lambda$ signifient respectivement “ $u_n \rightarrow 0$ ”, “ u_n est bornée” et “ $u_n \rightarrow \lambda$ ”. Si de plus on a $u_n \geq 0$, alors $1 = o(u_n)$ signifie “ $u_n \rightarrow \infty$ ”,

Les relations o , \mathcal{O} “ressemblent” à des relations d'ordre, et la relation \sim est une relation d'équivalence, au vu de la propriété suivante :

Propriété 2.4.2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles. Alors :

- si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$;
- si $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $v_n = \mathcal{O}(w_n)$, alors $u_n = \mathcal{O}(w_n)$;
- si $u_n \sim v_n$ et $v_n \sim w_n$, alors $u_n \sim w_n$;
- si $u_n \sim v_n$ alors $v_n \sim u_n$.

Toutefois les relations o et \mathcal{O} ne sont pas de vraies relation d'ordre, par exemple car on peut avoir $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ et $v_n = \mathcal{O}(u_n)$ sans avoir $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Démonstration. Toutes ces preuves sont très similaires, on ne fait que la première. On suppose que $u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$. Par définition, cela signifie qu'il existe deux suite tendant vers 0, notées $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\eta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $u_n = \varepsilon_n v_n$ et $v_n = \eta_n w_n$. On peut donc écrire, $u_n = \varepsilon_n v_n = \varepsilon_n \eta_n w_n$. La suite $(\varepsilon_n \eta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend bien vers 0, ce qui montre que $u_n = o(w_n)$. \square

On utilisera souvent l'écriture très commode $u_n = v_n + o(w_n)$ pour signifier $u_n - v_n = o(w_n)$ (et de même pour les \mathcal{O}).

On fera attention au fait que la relation notée $u_n = o(v_n)$ est plus une relation d'appartenance qu'une relation d'égalité. En effet, $u_n = o(v_n)$ est à comprendre comme

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \left\{ (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est négligeable devant } (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \right\}.$$

Notamment, la relation $\mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(n)$ est vraie, alors que $\mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(1)$ est fausse. En fait ces relations sont des *inclusions* : l'ensemble des suites dominées par 1 est inclus dans l'ensemble des suites dominées par n ($\mathcal{O}(1) \subset \mathcal{O}(n)$), mais la réciproque n'est pas vraie ($\mathcal{O}(n) \not\subset \mathcal{O}(1)$).

On peut effectuer les opérations suivantes sur les relations de comparaison.

Propriété 2.4.3. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$, des suites réelles et λ un réel.

- Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n = \mathcal{O}(v_n)$;
- si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n + v_n = o(w_n)$ et $\lambda u_n = o(u_n)$;
- si $u_n = \mathcal{O}(w_n)$ et $v_n = \mathcal{O}(w_n)$, alors $u_n + v_n = \mathcal{O}(w_n)$;
- $\lambda u_n = \mathcal{O}(u_n)$;
- on suppose que $u_n \sim \tilde{u}_n$ et $v_n \sim \tilde{v}_n$. Alors $u_n v_n \sim \tilde{u}_n \tilde{v}_n$.

En toute généralité, on ne peut pas sommer des équivalents^(note 4), la notion d'équivalence étant plutôt basée sur la multiplication. Par exemple, $1 + \frac{1}{n} \sim 1$, mais

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) + (-1) = \frac{1}{n} \text{ n'est pas équivalent à } 1 + (-1) = 0. \quad (2.2)$$

De manière générale, on rencontre très rarement la relation $u_n \sim 0$ qui signifie que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est nulle à partir d'un certain rang.

Toutefois, si l'on connaît des équivalences $u_n \sim \tilde{u}_n$ et $v_n \sim \tilde{v}_n$, et que l'on veut dire quelque chose sur $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on peut écrire

$$u_n + v_n = (\tilde{u}_n + o(\tilde{u}_n)) + (\tilde{v}_n + o(\tilde{v}_n)) = \tilde{u}_n + \tilde{v}_n + o(\tilde{u}_n) + o(\tilde{v}_n).$$

(note 4). Toutefois, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(\tilde{u}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\tilde{v}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites *positives*, avec $u_n \sim \tilde{u}_n$ et $v_n \sim \tilde{v}_n$, alors $u_n + v_n \sim \tilde{u}_n + \tilde{v}_n$.

La question qui se pose alors est de comparer les suites $(\tilde{u}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\tilde{v}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. L'exemple (2.2) devient alors

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) + (-1) = 1 + o(1) + (-1 + o(1)) = o(1).$$

(car $o(1) = o(-1)$).

Le théorème suivant permet de décrire les vitesses relatives de quelques suites courantes.

Théorème 2.4.4. Soient $\alpha > 1$, $\beta > 0$ et $\gamma > 0$ trois réels. On a ^(note 5)

$$\alpha^{-n} \ll n^{-\beta} \ll \ln^{-\gamma}(n) \ll 1 \ll \ln^{\gamma}(n) \ll n^{\beta} \ll \alpha^n.$$

Ce théorème est illustré sur la figure 2.3 sur quelques exemples de suites.




FIGURE 2.3 – Croissances comparées des suites. À gauche les suites 2^{-n} , n^{-1} et $\ln(n)^{-1}$. À droite les suites $\ln(n)$, n et 2^n .

Avant de commencer la preuve, on énonce un lemme préliminaire :

Lemme 2.4.5. Si $\alpha > 1$, alors $\alpha^n \rightarrow \infty$. Notamment, si $0 < \alpha < \alpha'$, alors $\alpha^n = o(\alpha'^n)$.

Démonstration. Comme $\alpha > 1$, la suite $(\alpha^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (avec $\alpha^0 = 1$). Par conséquent elle converge (dans $[1, \infty]$). On a alors

$$\lim_n \alpha^n = \lim_n \alpha^{n+1} = \lim_n \alpha \alpha^n = \alpha \lim_n \alpha^n.$$

Comme $\alpha > 1$, cette relation implique $\lim_n \alpha^n = \infty$. Si $0 < \alpha < \alpha'$, on voit que

$$\frac{\alpha'^n}{\alpha^n} = \left(\frac{\alpha'}{\alpha}\right)^n \rightarrow \infty, \quad \text{d'où} \quad \frac{\alpha^n}{\alpha'^n} \rightarrow 0$$

puisque $\frac{\alpha'}{\alpha} > 1$. On a donc bien $\alpha^n = o(\alpha'^n)$. □

(note 5). En toute rigueur, les expressions $\ln(n)$ et n^β pour $\beta \notin \mathbb{Z}$ n'ont pas encore été définies. On pourra pour l'instant se limiter aux cas $\beta \in \mathbb{Z}$ et $\gamma \in \mathbb{Z}$, et définir $\ln(n)$ comme étant le nombre de chiffre de n dans une base donnée.

Preuve du théorème. En vertu de la propriété 2.2.6, il suffit de montrer

$$1 \ll \ln^\gamma(n) \ll n^\beta \ll \alpha^n$$

pour $\alpha > 1$, $\beta > 0$ et $\gamma > 0$.

Par définition, il existe une constante C telle que si $n \in [10^k, 10^{k+1}[$, on ait $\ln(n) \in [Ck, C(k+1)[$. Par conséquent, $\ln(n)$ tend vers l'infini : en effet, pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $n \geq 10^k$, $\ln(n)/C \geq k$. Cela montre la première relation $1 \ll \ln^\gamma(n)$.

La relation $n^\beta \ll \alpha^n$ se montre en remarquant que $\frac{(n+1)^\beta}{n^\beta} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\beta$ qui tend vers 1 (puisque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$). Par conséquent, il existe un rang N tel que pour $n \geq N$, $\frac{(n+1)^\beta}{n^\beta} \leq \frac{1+\alpha}{2} \in]1, \alpha[$. On a donc, pour $n \geq N$,

$$n^\beta = N^\beta \prod_{k=N}^{n-1} \frac{(k+1)^\beta}{k^\beta} \leq N^\beta \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^{n-N} = 2^{N+1} N^\beta (1+\alpha)^{-N} \left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n.$$

Le lemme 2.4.5 montre que $\left(\frac{1+\alpha}{2}\right)^n = o(\alpha^n)$.

Pour la relation $\ln^\gamma(n) \ll n^\beta$, on considère k un entier naturel. Pour $n \in [10^{k-1}, 10^k[$, on a $\ln(n) < Ck$ et $10^{(k-1)\beta} \leq n^\beta$. On a donc $\frac{\ln^\gamma(n)}{n^\beta} \leq 10^\beta (C^\gamma (10^\beta)^k k^\gamma)^{-1}$. En faisant tendre k vers ∞ , les relations déjà montrées donnent $((10^\beta)^k k^\gamma)^{-1} \rightarrow 0$, ce qui achève la preuve. \square

On en déduit les comparaisons suivantes :

Corollaire 2.4.6. Soient α , β et γ trois réels avec $\alpha > 0$. On définit la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ par

$$u_n = \alpha^n n^\beta \ln^\gamma(n).$$

Si $\alpha < 1$, ou bien si $\alpha = 1$ et $\beta < 0$, ou encore si $\alpha = 1$, $\beta = 0$ et $\gamma < 0$ ^(note 6), alors la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ converge vers 0. En revanche, si $\alpha > 1$, ou bien si $\alpha = 1$ et $\beta > 0$, ou encore si $\alpha = 1$, $\beta = 0$ et $\gamma > 0$ ^(note 7), alors la suite tend vers ∞ .

Corollaire 2.4.7. Soient (α, β, γ) et (a, b, c) des triplets de réels avec $\alpha > 0$ et $a > 0$. Si $\alpha < a$, ou bien si $\alpha = a$ et $\beta < b$, ou bien si $\alpha = a$, $\beta = b$ et $\gamma < c$ ^(note 8), alors on a

$$\alpha^n n^\beta \ln^\gamma(n) \ll a^n n^b \ln^c(n).$$

2.5 Suites récurrentes

Définition 2.5.1. On appelle suite récurrente (d'ordre 1) une suite réelle définie par une relation de récurrence de la forme

$$u_0 \in I, \quad u_{n+1} = f(u_n), \tag{2.3}$$

où I est un intervalle de \mathbb{R} et f une fonction de I dans I .

Graphiquement, on peut tracer la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à partir du graphe de la fonction f et de la droite d'équation $y = x$, comme sur la figure 2.4.

On a un critère simple pour prouver la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(note 6). Autrement dit, si $(\alpha, \beta, \gamma) < (1, 0, 0)$ pour l'ordre lexicographique. Cela revient à dire que l'on compare d'abord α avec 1, puis β avec 0, puis γ avec 0.

(note 7). Cela revient à $(\alpha, \beta, \gamma) > (1, 0, 0)$ pour l'ordre lexicographique. Noter que si $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 0, 0)$, on a affaire à la suite constante $u_n = 1$.

(note 8). Cela revient à $(\alpha, \beta, \gamma) < (a, b, c)$ pour l'ordre lexicographique.




FIGURE 2.4 – À gauche, deux trajectoires de la suite $u_{n+1} = \frac{1 - \cos(\pi u_n)}{2}$, avec les conditions initiales $u_0 = 0.3$ et $u_0 = 0.6$. À droite, la suite $u_{n+1} = e^{-u_n}$ partant de la condition initiale $u_0 = 0.1$.

Propriété 2.5.2. *Si f est croissante, alors la suite définie par la relation de récurrence (2.3) est monotone.*

Démonstration. Supposons $u_0 \leq u_1$. Nous allons montrer par récurrence que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. En effet, on pose $\mathcal{P}(n) = "u_n \leq u_{n+1}"$. Par hypothèse, $\mathcal{P}(0)$ est vraie. On suppose donc $\mathcal{P}(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1}$. Par croissance de f , on obtient donc $f(u_n) \leq f(u_{n+1})$, c'est-à-dire $u_{n+1} \leq u_{n+2}$. On a donc montré $\mathcal{P}(n+1)$.

Le cas $u_0 \geq u_1$ se traite de la même manière. \square

Ce résultat est illustré sur la figure 2.4, sur le graphique de gauche. En effet, la fonction $f : x \mapsto (1 - \cos(\pi x))/2$ est croissante de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$, et on voit que la trajectoire de la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ partant de 0.3 décroît et que la trajectoire partant de 0.6 croît.

Le cas f décroissante est un peu plus complexe.

Propriété 2.5.3. *Si f est décroissante, alors les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones.*

De plus si $u_0 \leq u_1$, alors $u_{2n} \leq u_{2n+1}$ pour tout n , alors que si $u_0 \geq u_1$, on a $u_{2n} \geq u_{2n+1}$ pour tout n .

Démonstration. On remarque que si f est décroissante, alors $f \circ f$ est croissante (puisque si $x \leq y$, alors $f(x) \geq f(y)$ d'où $f(f(x)) \leq f(f(y))$). Mais les deux suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ peuvent être définies par les relations de récurrence

$$u_{2(n+1)} = (f \circ f)(u_{2n}) \quad \text{et} \quad u_{2(n+1)+1} = (f \circ f)(u_{2n+1}).$$

Par la propriété 2.5.2 appliquée à la fonction croissante $f \circ f$, les deux suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont donc monotones.

Enfin, si $u_0 \leq u_1$, on montre par récurrence que $u_{2n} \leq u_{2n+1}$ pour tout n en appliquant deux fois la fonction f (et de même si $u_0 \geq u_1$). \square

Ce résultat est illustré sur le graphe de droite de la figure 2.4. En effet, fonction $x \mapsto e^{-x}$ est décroissante, et on voit que la suite $u_n = e^{-u_n}$ prend successivement ses valeurs de part et d'autre de la solution de l'équation $x = e^{-x}$ (correspondant à 0.567...).

Si l'on sait que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, on a un moyen d'identifier les limites possibles.

Propriété 2.5.4. *Si la fonction f est continue, et si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (2.3) converge vers une limite $l \in I$, alors $l = f(l)$ (note 9).*

Démonstration. Il suffit de passer à la limite dans l'égalité $u_{n+1} = f(u_n)$, en utilisant la continuité de f sur I . \square

Théorème 2.5.5 (Théorème du point fixe de Picard). *Si la fonction f vérifie la proposition*

$$\exists k < 1, \forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| < k|x - y|,$$

et si I est un intervalle fermé, alors la fonction f a un unique point fixe vers lequel converge la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (2.3).

Démonstration. Nous allons montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. En effet, on montre par récurrence que $|u_{n+1} - u_n| \leq k^n |u_1 - u_0|$. On en déduit que pour $N \leq p \leq q$, on a

$$\begin{aligned} |u_p - u_q| &\leq |u_p - u_{p+1}| + |u_{p+1} - u_{p+2}| + \dots + |u_{q-1} - u_q| \\ &\leq \sum_{n=p}^{q-1} k^n |u_1 - u_0| \\ &= \frac{k^p - k^q}{1 - k} |u_1 - u_0| \\ &\leq \frac{k^N}{1 - k} |u_1 - u_0| \\ &\rightarrow_N 0, \end{aligned}$$

ce qui montre que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. Comme l'intervalle I est fermé, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, et sa limite l est dans I et vérifie

$$\begin{aligned} |f(l) - l| &\leq |f(l) - f(u_n)| + |f(u_n) - u_n| + |u_n - l| \\ &\leq k|l - u_n| + |u_{n+1} - u_n| + |u_n - l| \\ &\rightarrow_n 0. \end{aligned}$$

La limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc un point fixe de f .

Enfin, si x et y sont deux points fixes de f , on a $|x - y| = |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$. Si $x \neq y$, on aurait donc $1 = \frac{|x - y|}{|x - y|} \leq k$, ce qui contredit l'hypothèse $k < 1$. La fonction f a donc un unique point fixe. \square

(note 9). On dit que l est un *point fixe* de f .

2.6 Exercices

Exercice 2.1.

Montrer que de toute suite non majorée on peut extraire une sous-suite qui diverge vers $+\infty$.

Exercice 2.2.

Montrer qu'une suite convergente à valeurs entières est stationnaire à partir d'un certain rang.

Exercice 2.3.

Étudier la convergence des suites de terme général

$$\frac{\sin(n^2) + n^2}{(1 + n + e^{-\sqrt{n}})^3} ; \quad \frac{(1 + n)^4 - (1 - n)^4}{\sqrt{15 + n^2 + n^5}} ; \quad \frac{n^2 + n \log^3(n)}{ne^{-\sqrt{n}} - n(2n + 1)}$$

$$\frac{(n - \sin(n))(2n + 1)}{\sqrt{n^4 + e^{-n}}} ; \quad \frac{\sqrt{(n - 1)(n + 1)(n - 2)}}{\log(n) + 2e^{-\frac{1}{n}}} - \frac{n \log(n^2) + \sqrt{n}}{\sqrt{1 + n^{-n}}}$$

Exercice 2.4.

Étudier le comportement asymptotique de la suite de terme général

$$\frac{E(nx) + E((n + 1)x) + \dots + E(2nx)}{n^\alpha},$$

en fonction de α .

Exercice 2.5.

Montrer que les suites définies par les relations de récurrence suivantes sont bien définies, et étudier leur comportement asymptotique.

$$u_0 = 1, u_{n+1} = \frac{\sin(u_n)}{2 + u_n + 2u_n^2} ; \quad u_0 = 1, u_{n+1} = \sin\left(\frac{u_n}{2u_n + n}\right) ; \quad u_0 = 1, u_{n+1} = u_n + \frac{u_n^2}{1 + u_n^2}.$$

Exercice 2.6.

Étudier le comportement asymptotique de la suite définie par une relation de récurrence affine de la forme

$$u_0 \in \mathbb{R}, u_{n+1} = au_n + b.$$

On pourra discuter selon la valeur de a .

Exercice 2.7.

Étudier la convergence des suites de terme général

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^{3/2}} \quad \text{et} \quad \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k!.$$

Exercice 2.8.

Soit α un réel strictement plus grand que 1. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{1}{(2n)^\alpha} + \frac{1}{(2n+1)^\alpha} \leq \frac{1}{2^{\alpha-1}n^\alpha}.$$

Montrer que la suite de terme général $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ vérifie :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n \leq v_{2n+1} \leq \frac{1}{2^{\alpha-1}} v_n + 1,$$

et en déduire que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice 2.9.

Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n!n}.$$

sont adjacentes. En déduire une approximation de e à 10^{-4} près.

Exercice 2.10.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que les deux suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent. Peut-on en déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge ? Quelle hypothèse supplémentaire permettrait de conclure ?

Exercice 2.11.

Soit $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de rationnels convergeant vers un irrationnel (avec $p_n \in \mathbb{Z}$ et $q_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$).

Montrer que les suites $(|p_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(|q_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers ∞ .

Exercice 2.12.

[Lemme de Cesàro]

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Montrer que la suite de terme général $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ est convergente et que

$$\lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k = \lim_n u_n.$$

Donner un exemple de suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non convergente telle que la suite $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice 2.13.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite vérifiant la relation, dite de *sous-additivité*,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{N}, u_{p+q} \leq u_p + u_q$$

1. Montrer que pour tous entiers n et p , on a

$$\frac{u_n}{n} \leq \frac{u_p}{p} + \frac{\max(u_0, \dots, u_{p-1})}{n}$$

(on pourra faire la division euclidienne de n par p).

2. En déduire que la suite $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\inf_n \frac{u_n}{n} \in [-\infty, \infty[$ (on pourra considérer un entier p bien choisi).
3. En déduire un résultat analogue pour les suites à valeurs dans $]0, \infty[$ vérifiant

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, u_{p+q} \leq u_p u_q.$$

Exercice 2.14.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que $u_{n+1} - u_n \rightarrow_n 0$. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un intervalle.

Chapitre 3

Séries numériques

3.1 Premières définitions

Une série (réelle ou complexe) est une suite dont les termes sont écrits sous la forme $\sum_{n=0}^N u_n$, où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite (réelle ou complexe). La série $\left(\sum_{n=0}^N u_n\right)_{N \in \mathbb{N}}$ sera notée de manière plus concise $\sum u_n$. Dans cette écriture, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est appelée *terme général* de la série $\sum u_n$, et les sommes $\sum_{n=0}^N u_n$ sont appelées *sommes partielles* de la série $\sum u_n$. Remarquer que toute suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut être mise sous forme de série, en utilisant l'écriture

$$v_N = \sum_{n=0}^N (v_n - v_{n-1}),$$

où l'on a posé par convention $v_{-1} = 0$.

Définition 3.1.1. Si la suite $\left(\sum_{n=0}^N u_n\right)_{N \in \mathbb{N}}$ admet une limite, on dit que la série $\sum u_n$ est convergente. La limite de $\left(\sum_{n=0}^N u_n\right)_{N \in \mathbb{N}}$ est appelée somme de la série $\sum u_n$ et est notée $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$. Pour une série convergente $\sum u_n$, les termes de la suite $\left(\sum_{N=n}^{\infty} u_n\right)_{N \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\sum_{n=N}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n - \sum_{n=0}^{N-1} u_n$$

sont appelés restes de la série.

Il faut être bien conscient du fait que la notation $\sum_{n=0}^{\infty}$ contient une *limite*, et est donc à manier avec précaution. Notamment, on prendra garde à ne pas écrire le reste d'une série, et à ne pas parler de la somme d'une série avant d'avoir vérifié la convergence !

Les propriétés sur les suites convergentes donnent la propriété suivante.

Propriété 3.1.2. Une combinaison linéaire de deux séries convergentes est convergente, et on a l'identité, pour deux scalaires λ et μ ,

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} v_n = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda u_n + \mu v_n).$$

Autrement dit, l'ensemble des séries convergentes constitue un espace vectoriel, et l'application qui à une série associe sa limite est linéaire.

Propriété 3.1.3. *Les restes d'une série convergente tendent vers 0.*

Démonstration. Il suffit de passer à la limite dans l'égalité

$$\sum_{n=N}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n - \sum_{n=0}^{N-1} u_n,$$

le membre de droite étant convergent. □

Propriété 3.1.4. *Si la série $\sum u_n$ converge, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.*

Démonstration. En passant à la limite dans l'égalité

$$u_N = \sum_{n=0}^N u_n - \sum_{n=0}^{N-1} u_n,$$

(licite car le membre de droite converge) on obtient

$$\lim_{N \rightarrow \infty} u_N = \sum_{n=0}^{\infty} u_n - \sum_{n=0}^{\infty} u_n = 0. \quad \square$$

La réciproque de cette propriété est *fausse*, comme on peut le voir sur l'exemple de la série $\sum \frac{1}{n}$, dite *série harmonique*. En effet, le terme général de cette série tend vers 0, alors que la série n'est pas convergente, comme nous allons le voir.

On sait qu'une suite réelle converge si et seulement si elle est de Cauchy. Il est donc intéressant de caractériser les séries qui constituent des suites de Cauchy.

Propriété 3.1.5. *Une série $\sum u_n$ constitue une suite de Cauchy si et seulement si les sommes $\sum_{n=p}^q u_n$ tendent vers 0 quand p et q tendent vers l'infini, c'est-à-dire qu'elle vérifie la proposition*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, (N \leq p \leq q) \Rightarrow \left| \sum_{n=p}^q u_n \right| \leq \varepsilon.$$

Démonstration. C'est une simple réécriture de la définition d'une suite de Cauchy. En effet, on a l'égalité $\sum_{n=0}^q u_n - \sum_{n=0}^{p-1} u_n = \sum_{n=p}^q u_n$. □

La propriété 3.1.5 nous permet de montrer que la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge. En effet, on a

$$\sum_{n=N}^{2N} \frac{1}{n} \geq \sum_{n=N}^{2N} \frac{1}{2N} = \frac{N+1}{2N}.$$

Or $\frac{N+1}{2N}$ converge vers 1/2. Les sommes partielles de la série harmonique ne constituent donc pas une suite de Cauchy : cette série diverge.

Définition 3.1.6. Si la série $\sum |u_n|$ est convergente, on dit que la série $\sum u_n$ est absolument convergente.

La propriété suivante permet de réduire l'étude de la convergence de nombreuses séries à l'étude des séries à termes positifs.

Propriété 3.1.7. Une série absolument convergente est convergente et vérifie l'inégalité

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u_n|.$$

Démonstration. Supposons que la série $\sum u_n$ soit absolument convergente. Montrons que la série $\sum u_n$ constitue une suite de Cauchy.

Par l'inégalité triangulaire, on a, pour $p \leq q$,

$$\left| \sum_{n=p}^q u_n \right| \leq \sum_{n=p}^q |u_n|.$$

Comme la série $\sum |u_n|$ converge, ses sommes partielles constituent une suite de Cauchy et on a

$$\sum_{n=p}^q |u_n| \xrightarrow{p, q \rightarrow \infty} 0.$$

Comme $\left| \sum_{n=p}^q u_n \right| \leq \sum_{n=p}^q |u_n|$, les sommes partielles de $\sum u_n$ constituent aussi une suite de Cauchy et la série $\sum u_n$ converge.

Pour montrer l'inégalité, il suffit de remarquer que $\left| \sum_{n=0}^N u_n \right|$ converge (note 1) vers $\left| \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right|$, et de passer à la limite dans l'inégalité triangulaire

$$\left| \sum_{n=0}^N u_n \right| \leq \sum_{n=0}^N |u_n|.$$

□

3.2 Séries à termes positifs

Dans cette partie, on va donner des critères de convergence pour les séries à termes positifs. L'intérêt est que la propriété 3.1.7 permet d'en déduire des critères de convergence pour des suites de signe quelconques (ou à valeur complexes).

Propriété 3.2.1. Soit $\sum u_n$ une série dont le terme général est positif. Alors $\sum u_n$ converge si et seulement si ses sommes partielles sont bornées. Dans ce cas on a alors

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N u_n = \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{n=0}^N u_n.$$

(note 1). En effet, l'inégalité $||v_n| - |l|| \leq |v_n - l|$ montre que si $v_n \rightarrow l$, alors $|v_n| \rightarrow |l|$

Démonstration. Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à termes positifs, la suite $(\sum_{n=0}^N u_n)_{N \in \mathbb{N}}$ est croissante. Elle converge alors si et seulement si elle est bornée, et dans ce cas sa limite est égale à sa borne supérieure. \square

Propriété 3.2.2. Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à terme général positif telles que $u_n \leq v_n$.

- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.
- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

Démonstration. Comme $u_n \leq v_n$, on a $\sum_{n=0}^N u_n \leq \sum_{n=0}^N v_n$. Si $\sum v_n$ converge, on a

$$\sum_{n=0}^N u_n \leq \sum_{n=0}^N v_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} v_n,$$

et les sommes partielles de $\sum u_n$ sont donc bornées. Par la propriété 3.2.1, cela montre que $\sum u_n$ converge. L'autre implication est la contraposée de la première. \square

Passons maintenant à l'étude de certaines séries particulières.

La convergence de la série géométrique $\sum a^n$ se montre de manière très simple, et cette série va nous donner des critères de convergence pour d'autres séries :

Propriété 3.2.3. Soit a un nombre complexe. La série $\sum a^n$ converge si et seulement si $|a| < 1$. On a alors dans ce cas

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}.$$

On peut remarquer que si $|a| < 1$, on n'a même pas $a^n \rightarrow 0$, et la série ne peut pas converger en vertu de la propriété 3.1.3.

Démonstration. Premièrement, on écarte le cas $a = 1$, pour lequel les sommes partielles valent $\sum_{n=0}^N 1 = N + 1$, la série étant alors divergente.

Dans le cas $a \neq 1$, on remarque que $(1-a) \sum_{n=0}^N a^n = \sum_{n=0}^N a^n - \sum_{n=1}^{N+1} a^n = 1 - a^{N+1}$. On a donc, en divisant par $1-a$ (qui est non-nul),

$$\sum_{n=0}^N a^n = \frac{1 - a^{N+1}}{1 - a}.$$

La série converge donc si et seulement si a^{N+1} a une limite quand N tend vers l'infini, ce qui revient bien à $|a| < 1$. \square

On remarque que la suite $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la seule (à multiplication par une constante près) à vérifier l'égalité $\frac{u_{n+1}}{u_n} = a$. On peut en fait obtenir un critère de convergence proche de celui de la série géométrique pour les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ converge.

Théorème 3.2.4 (Critère de d'Alembert). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. On suppose que le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ converge vers un réel l .

- si $l > 1$, alors la série $\sum u_n$ diverge ;

— si $l < 1$, alors la série $\sum u_n$ converge.

Ce critère ne permet toutefois pas de conclure dans le cas $l = 1$ comme on peut le voir sur les exemples $\sum \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$. En effet, la première série diverge et la deuxième converge^(note 2), alors que les rapports de termes consécutifs vérifient

$$\frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad \text{et} \quad \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \rightarrow 1.$$

Démonstration. Plaçons nous d'abord dans le cas $l < 1$. Comme $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ converge vers une limite l strictement inférieure à 1, si $l < 1 - \varepsilon < 1$ ^(note 3), alors il existe un certain rang n_0 tel que pour $n \geq n_0$ on ait $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 - \varepsilon$. On peut donc écrire

$$\frac{u_N}{u_{n_0}} = \prod_{n=n_0}^{N-1} \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \prod_{n=n_0}^{N-1} (1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^{N-n_0}.$$

On a donc $u_N \leq \frac{u_{n_0}}{(1-\varepsilon)^{n_0}} (1-\varepsilon)^N$ dès que $N > n_0$. Comme la série $\sum (1-\varepsilon)^N$ converge, alors $\sum u_N$ converge aussi, puisque ces deux séries sont à termes positifs.

Le cas $l > 1$ se traite de manière similaire : $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ converge vers une limite l strictement supérieure à 1, donc pour $1 < 1 + \varepsilon < l$ ^(note 4) il existe un rang n_0 tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 + \varepsilon$ si $n \geq n_0$. On écrit

$$\frac{u_N}{u_{n_0}} = \prod_{n=n_0}^{N-1} \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \prod_{n=n_0}^{N-1} (1 + \varepsilon) = (1 + \varepsilon)^{N-n_0},$$

ce qui donne $u_N \geq \frac{u_{n_0}}{(1+\varepsilon)^{n_0}} (1+\varepsilon)^N$ dès que $N > n_0$. Comme la série $\sum (1+\varepsilon)^N$ diverge, $\sum u_N$ diverge aussi. \square

En fait, on peut énoncer un résultat un peu moins restrictif (il ne suppose pas que le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ait une limite) en utilisant la notion de limites inférieures et supérieures en lieu et place de limites, comme dans le théorème suivant :

Théorème 3.2.5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. Si

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1,$$

alors la série $\sum u_n$ converge. Si

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1,$$

alors la série diverge.

La preuve du théorème 3.2.5 se fait alors exactement comme celle du théorème 3.2.4, en utilisant la propriété suivante des limites supérieures (et inférieures) :

(note 2). Voir propriété 3.2.10

(note 3). Un tel ε existe nécessairement, par exemple $\varepsilon = (1 - l)/2$.

(note 4). Par exemple, $\varepsilon = (l - 1)/2$.

Propriété 3.2.6. Si $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = l < \infty$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang n_0 tel que si $n \geq n_0$ on a $u_n \leq l + \varepsilon$.

Si $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = l > -\infty$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang n_0 tel que si $n \geq n_0$ on a $u_n \geq l - \varepsilon$.

Démonstration. Posons $l = \limsup_n u_n$. On a $\limsup_n u_n = \inf_{n \geq 0} \sup_{k \geq n} u_k < l + \varepsilon$, donc par définition de la borne inférieure, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\sup_{k \geq n_0} u_k < l + \varepsilon$, ce qui donne le résultat. \square

On peut énoncer un autre critère de convergence basé sur le fait que $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la seule suite à vérifier $(u_n)^{1/n} = a$. On peut en fait étendre le critère de convergence des séries géométriques aux séries dont le terme général u_n est tel que $(u_n^{1/n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Propriété 3.2.7 (Règle de Cauchy). Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que la suite $(u_n^{1/n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite l .

- Si $l < 1$, alors la série converge ;
- Si $l > 1$, alors la série diverge.

Démonstration. — Si $l < 1$, pour un ε tel que $l < 1 - \varepsilon < 1$, il existe un rang n_0 tel que, si $n \geq n_0$, on a $u_n^{1/n} \leq 1 - \varepsilon$. On a donc, pour $n \geq n_0$, l'inégalité $u_n \leq (1 - \varepsilon)^n$. Comme la série géométrique de raison $1 - \varepsilon$ converge, il en est de même de $\sum u_n$.

- Si $l > 1$, alors il existe un rang n_0 tel que $u_n^{1/n} > 1$ dès que $n \geq n_0$. On a donc, pour $n \geq n_0$, $u_n \geq 1$. Par conséquent, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers 0, et la série $\sum u_n$ est donc divergente. \square

On peut affaiblir les hypothèses de ce théorème en remplaçant la limite par une limite supérieure :

Propriété 3.2.8. Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs.

- Si $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} < 1$, alors la série converge ;
- Si $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} > 1$, alors la série diverge.

Démonstration. La preuve reste essentiellement la même, on doit juste remarquer que dans le cas où $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} > 1$, on a $u_n^{1/n} > 1$ pour une infinité de valeurs de n (plutôt que pour tout n assez grand). \square

De même que pour la règle de d'Alembert, on ne peut pas conclure immédiatement dans le cas où la limite supérieure vaut 1, comme on peut le voir sur les exemples des séries $\sum \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$.

Il existe des cas pour lesquels la règle de Cauchy permet de conclure, mais pas celle de d'Alembert. Par exemple, si on considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{2^n} & \text{si } n \text{ est pair ;} \\ \frac{1}{3^n} & \text{si } n \text{ est impair,} \end{cases}$$

on remarque que

$$u_n^{1/n} = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{3} & \text{si } n \text{ est impair,} \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \begin{cases} \frac{2^{n+1}}{3^n} = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n & \text{si } n \text{ est impair} \\ \frac{3^{n+1}}{2^n} = 3 \left(\frac{3}{2}\right)^n & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

On a donc $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} = 1/2 < 1$, alors que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$. Par conséquent, la règle de Cauchy permet de conclure, mais pas celle de d'Alembert. La raison est que la règle de Cauchy considère les valeurs de chaque u_n dans l'absolu, alors que la règle de d'Alembert ne considère que les accroissements relatifs entre deux termes consécutifs, qui peuvent être grand alors que les termes de la série sont petits.

On a en fait l'inégalité suivante, qui montre que la règle de Cauchy est plus fine que la règle de d'Alembert.

Propriété 3.2.9. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. Alors on a

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

Démonstration. Montrons $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n^{1/n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$. On pose $l = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$, que l'on peut supposer fini (dans le cas contraire, il n'y a rien à montrer). Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un indice n_0 tel que si $n \geq n_0$, alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} < l + \varepsilon$. On a donc, pour $N \geq n_0$,

$$\frac{u_N}{u_{n_0}} = \prod_{n=n_0}^{N-1} \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \prod_{n=n_0}^{N-1} (l + \varepsilon) = (l + \varepsilon)^{N-n_0}.$$

On peut donc écrire,

$$u_N^{1/N} \leq \left(\frac{u_{n_0}}{(l + \varepsilon)^{n_0}} \right)^{1/N} (l + \varepsilon).$$

En passant à la limite supérieure, on trouve

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} u_N^{1/N} \leq (l + \varepsilon).$$

Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on en déduit que $\limsup_{N \rightarrow \infty} u_N^{1/N} \leq l = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{u_{N+1}}{u_N}$.

On a donc montré la troisième inégalité. La première se montre de la même manière, et la deuxième découle de la définition des limites inférieure et supérieure. \square

On veut maintenant pouvoir déterminer le comportement asymptotiques de séries pour lesquelles les règles de Cauchy et d'Alembert ne s'appliquent pas. L'exemple typique de telles séries étant les séries puissances (ou *séries de Riemann*) du type $\sum \frac{1}{n^\alpha}$. On a un critère très simple pour la convergence de ces séries.

Propriété 3.2.10. La série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Démonstration. On sait que si $\alpha < \beta$, alors $\frac{1}{n^\beta} \leq \frac{1}{n^\alpha}$. Par conséquent, il suffit de montrer la divergence de la série $\sum \frac{1}{n}$, et la convergence de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ dès que $\alpha > 1$.

La divergence de la série $\sum \frac{1}{n}$ a déjà été traité, il reste donc à traiter le cas $\alpha > 1$. On écrit

$$\sum_{n=2^N}^{2^{N+1}-1} \frac{1}{n^\alpha} \leq \sum_{n=2^N}^{2^{N+1}-1} \frac{1}{(2^N)^\alpha} = \frac{2^{N+1} - 2^N}{(2^\alpha)^N} = \frac{1}{(2^{\alpha-1})^N}.$$

On fixe un entier naturel n . Il existe un entier N tel que $n \leq 2^{N+1} - 1$. On a

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^{2^{N+1}-1} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{q=0}^N \sum_{k=2^q}^{2^{q+1}-1} \frac{1}{k^\alpha} \leq \sum_{q=0}^N \frac{1}{(2^{\alpha-1})^q} \leq \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{(2^{\alpha-1})^q} < \infty.$$

La dernière série converge car $\frac{1}{2^{\alpha-1}} < 1$. Les sommes partielles de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ sont donc bornées. Comme la série est à termes positifs, on en déduit qu'elle converge. \square

Pour avoir un nouveau critère de convergence des séries, nous allons essayer d'appliquer le critère de d'Alembertaux séries de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$. Remarquons que la suite $\frac{1}{n^\alpha}$ vérifie (note 5)

$$\begin{aligned} \frac{1/(n+1)^\alpha}{1/n^\alpha} &= (1+1/n)^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln(1+1/n)} \\ &= e^{-\alpha(\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n}))} \\ &= 1 - \alpha \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

On va en déduire un critère de convergence pour toutes les séries dont le terme général admet un développement limité semblable.

Propriété 3.2.11 (Règle de Duhamel). *Supposons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie le développement suivant en $n \rightarrow \infty$:*

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Alors :

- si $\alpha > 1$, la série $\sum u_n$ converge ;
- si $\alpha < 1$, la série $\sum u_n$ diverge.

Démonstration. On va montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut, à partir d'un certain rang, être comparée à une suite de la forme $\frac{1}{n^\alpha}$.

Supposons $1 < \alpha$. On choisit $1 < 1 + \varepsilon < \alpha$. On a

$$\begin{aligned} n \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{1/(n+1)^{1+\varepsilon}}{1/n^{1+\varepsilon}} \right) &= n \left(1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) - n \left(1 - \frac{1+\varepsilon}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= (1 + \varepsilon - \alpha) + o(1). \end{aligned}$$

Cela signifie que la suite de terme général $n \left(\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{1/(n+1)^{1+\varepsilon}}{1/n^{1+\varepsilon}} \right)$ converge vers $1 + \varepsilon - \alpha$, qui est strictement négatif. Par conséquent, cette suite est strictement négative à partir d'un certain rang n_0 . On a donc

$$\frac{u_N}{u_{n_0}} = \prod_{n=n_0}^{N-1} \frac{u_{n+1}}{u_n} < \prod_{n=n_0}^{N-1} \frac{1/(n+1)^{1+\varepsilon}}{1/n^{1+\varepsilon}} = \frac{n_0^{1+\varepsilon}}{N^{1+\varepsilon}}.$$

À partir du rang n_0 , on a donc $u_N \leq \frac{u_{n_0} n_0^{1+\varepsilon}}{N^{1+\varepsilon}}$. Comme la série $\sum \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ converge, alors $\sum u_n$ aussi. La preuve pour le cas $\alpha < 1$ est similaire. \square

(note 5). On rappelle que si $u_n \rightarrow 0$, alors $\ln(1+u_n) = u_n + o(u_n)$ et $e^{u_n} = 1 + u_n + o(u_n)$.

Quand on sait comparer les termes généraux de deux séries, on peut en déduire des comparaisons entre les sommes partielles ou les restes des séries, d'après la propriété suivante.

Propriété 3.2.12. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites positives.

- Supposons que la série $\sum u_n$ diverge
 - Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum v_n$ diverge et $\sum_{n=0}^N u_n \sim \sum_{n=0}^N v_n$
 - Si $u_n = o(v_n)$, alors $\sum v_n$ diverge et $\sum_{n=0}^N u_n = o\left(\sum_{n=0}^N v_n\right)$;
 - Si $u_n = O(v_n)$, alors $\sum v_n$ diverge et $\sum_{n=0}^N u_n = O\left(\sum_{n=0}^N v_n\right)$.
- Supposons que la série $\sum v_n$ converge.
 - Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{n=N}^{\infty} u_n \sim \sum_{n=N}^{\infty} v_n$
 - Si $u_n = o(v_n)$, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{n=N}^{\infty} u_n = o\left(\sum_{n=N}^{\infty} v_n\right)$;
 - Si $u_n = O(v_n)$, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{n=N}^{\infty} u_n = O\left(\sum_{n=N}^{\infty} v_n\right)$.

Démonstration. On fait seulement la preuve pour le premier cas, les cinq autres étant semblables (ou plus simples). Comme $u_n \sim v_n$, pour tout $1 > \varepsilon > 0$ il existe un n_0 tel que si $n \geq n_0$, on a

$$(1 - \varepsilon)v_n < u_n < (1 + \varepsilon)v_n,$$

ce qui montre que $\sum v_n$ diverge, puisque $\sum u_n$ diverge.

Montrons maintenant l'équivalence des sommes partielles. On a

$$\sum_{n=0}^{n_0-1} u_n + (1 - \varepsilon) \sum_{n=n_0}^N v_n < \sum_{n=0}^N u_n < \sum_{n=0}^{n_0-1} u_n + (1 + \varepsilon) \sum_{n=n_0}^N v_n.$$

On en déduit l'encadrement

$$\frac{\sum_{n=0}^{n_0-1} u_n}{\sum_{n=0}^N v_n} + (1 - \varepsilon) \frac{\sum_{n=n_0}^N v_n}{\sum_{n=0}^N v_n} < \frac{\sum_{n=0}^N u_n}{\sum_{n=0}^N v_n} < \frac{\sum_{n=0}^{n_0-1} u_n}{\sum_{n=0}^N v_n} + (1 + \varepsilon) \frac{\sum_{n=n_0}^N v_n}{\sum_{n=0}^N v_n}.$$

Or, puisque la série $\sum v_n$ diverge, la suite $\left(\sum_{n=0}^N v_n\right)_{N \in \mathbb{N}}$ tend vers ∞ , ce qui implique que $\frac{\sum_{n=0}^{n_0-1} u_n}{\sum_{n=0}^N v_n}$ tend vers 0 et $\frac{\sum_{n=n_0}^N v_n}{\sum_{n=0}^N v_n}$ vers 1. On en conclut

$$1 - \varepsilon < \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n=0}^N u_n}{\sum_{n=0}^N v_n} \leq \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{n=0}^N u_n}{\sum_{n=0}^N v_n} < 1 + \varepsilon.$$

Ces inégalités étant vraies pour tout ε , on en déduit que les limites supérieure et inférieure valent 1, de sorte que $\frac{\sum_{n=0}^N u_n}{\sum_{n=0}^N v_n}$ converge vers 1, et donc que $\sum_{n=0}^N u_n \sim \sum_{n=0}^N v_n$ \square

Dans la propriété 3.2.12, il est important que les deux suites soient positives (ou au moins qu'elles soient de signe constant à partir d'un certain rang). En effet, on peut construire le contre-exemple suivant :

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{n}.$$

La série $\sum u_n$, étant alternée, converge ^(note 6), alors que la série $\sum v_n$ diverge à cause du terme $\frac{1}{n}$. Les deux suites sont pourtant équivalentes.

On énonce maintenant le critère de comparaison séries/intégrales, qui permet de ramener l'étude de certaines séries à l'étude d'intégrales.

Théorème 3.2.13. Soit $f : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ une fonction décroissante. Alors la série

$$\sum \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right)$$

converge.

Du théorème 3.2.13, on déduit que l'étude de la série $\sum f(n)$ peut se ramener à celle de la primitive de f :

Corollaire 3.2.14. Soit f vérifiant les hypothèses du théorème 3.2.13. Alors la série $\sum f(n)$ converge si et seulement si la fonction f est intégrable sur $[0, \infty[$. De plus,

— dans le cas où $\sum f(n)$ converge, on a

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} f(n) \leq \int_N^{\infty} f(t) dt \leq \sum_{n=N}^{\infty} f(n) ;$$

— dans le cas où $\sum f(n)$ diverge, on a le développement asymptotique

$$\sum_{n=0}^N f(n) = \int_0^N f(t) dt + \sum_{n=0}^{\infty} \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right) + o(1). \quad (3.1)$$

Remarquer que dans le développement (3.1), le premier terme tend vers ∞ , alors que le second est constant.

Ce corollaire est illustré sur la figure 3.1 : la valeur de l'intégrale $\int_0^n f(t) dt$ est encadrée par les quantités $\sum_{k=0}^{n-1} f(k)$ et $\sum_{k=1}^n f(k)$. L'énoncé du théorème 3.2.13 correspond au fait que l'aire grisée est finie.

Preuve du théorème 3.2.13. Comme la fonction f est décroissante, on peut écrire

$$f(n+1) \leq f(t) \leq f(n) \text{ si } t \in [n, n+1],$$

d'où on déduit

$$0 \leq f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n) - f(n+1).$$

En sommant de $n = 0$ à $n = N$, on obtient les inégalités

$$0 \leq \sum_{n=0}^N \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right) \leq \sum_{n=0}^N f(n) - f(n+1) = f(0) - f(N+1).$$

(note 6). Voir la propriété 3.3.1 ci-dessous.




FIGURE 3.1 – Comparaison d’une série et d’une intégrale.

Comme la suite $f(n)$ est décroissante et minorée (par 0), elle converge vers une limite en ∞ . On a donc

$$\sum_{n=0}^N \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right) \leq f(0) - \lim_{N \rightarrow \infty} f(N).$$

La série $\sum \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right)$ est donc une série à terme général positif dont les sommes partielles sont bornées. Il s’agit donc d’une série convergente. \square

Preuve du corollaire 3.2.14. L’expression

$$\sum_{n=0}^N f(n) - \int_0^{N+1} f(x) dx = \sum_{n=0}^N \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(x) dx \right) \quad (3.2)$$

montre que la différence entre la suite des sommes partielles de $\sum f(n)$ et la suite $\left(\int_0^n f(x) dx \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente (c’est le théorème 3.2.13). Cela montre donc que $\sum f(n)$ est convergente si et seulement si $\int_0^n f(x) dx$ a une limite, c’est-à-dire si f est intégrable sur $[0, \infty[$.

Dans le cas où ces deux suites divergent, un passage à la limite dans (3.2) permet d’obtenir le développement 3.1. Dans le cas où elles convergent, l’encadrement énoncé s’obtient en sommant de N à ∞ les inégalités $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n)$. \square

On peut par exemple déduire de l’équation (3.1) appliquée à la fonction définie par $f(t) = \frac{1}{1+t}$ le développement asymptotique suivant :

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} = \ln N + \gamma + o(1),$$

où γ est une constante (dont les premières décimales sont 0.57721), appelée *constante d'Euler* (ou *d'Euler-Mascheroni*). On sait assez peu de chose sur γ , notamment on ignore encore à ce jour si elle est rationnelle ou non.

3.3 Séries à termes complexes

Propriété 3.3.1 (Critère des séries alternées). *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ soit décroissante et que deux termes consécutifs soient de signe opposés (une telle série est dit alternée). Alors la série $\sum u_n$ est convergente. De plus, si $u_N \leq 0$, on a*

$$\sum_{n=0}^N u_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{N+1} u_n.$$

On a donc une estimation de la vitesse de convergence :

$$|u_{N+1}| - |u_{N+2}| \leq \left| \sum_{n=0}^N u_n - \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right| \leq |u_{N+1}|.$$

Démonstration. Quitte à remplacer $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on peut supposer que u_n est du signe de $(-1)^n$.

Considérons les deux suites $(v_N)_{N \in \mathbb{N}}$ et $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ définies par

$$v_N = \sum_{n=0}^{2N+1} u_n \quad \text{et} \quad w_N = \sum_{n=0}^{2N} u_n.$$

On va montrer que ces deux suites sont adjacentes, de sorte qu'elles convergent vers la même limite, ce qui permettra de conclure que la série $\sum u_n$ converge.

Tout d'abord, on a $w_N = v_N - u_{2N+1} \geq v_N$, puisque les termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'indices impairs ont été supposés négatifs. Ensuite, $v_{N+1} - v_N = u_{2N+2} + u_{2N+3} = (|u_{2N+2}| - |u_{2N+3}|) \leq 0$ (puisque la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ décroît), de sorte que $(v_N)_{N \in \mathbb{N}}$ est croissante. De même $(w_N)_{N \in \mathbb{N}}$ est décroissante. Enfin on a $|v_N - w_N| = |u_{2N+1}|$ qui tend vers 0. On a bien affaire à des suites adjacentes. \square

Exemple : la série $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est convergente quel que soit $\alpha > 0$. De plus, on remarque qu'elle n'est pas absolument convergente si $0 < \alpha \leq 1$.

On va montrer un résultat plus général que le théorème des séries alternées. On va tout d'abord montrer la propriété suivante, qui est un analogue discret de la formule d'intégration par parties.

Propriété 3.3.2 (Transformation d'Abel). *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites à valeurs complexes. On pose*

$$U_n = \sum_{k=0}^n u_k \quad \text{et} \quad v_n = V_{n+1} - V_n.$$

On a alors, pour tout entier $N \geq 1$,

$$\sum_{n=0}^N u_n V_n = - \sum_{n=0}^{N-1} U_n v_n + U_N V_N.$$

Dans l'énoncé de la propriété 3.3.2, la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut être vue comme une “primitive” de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (une somme est analogue à une intégrale) et la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut être vue comme une “dérivée” de la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (une différence est analogue à une dérivation)

Démonstration. On écrit :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N u_n V_n &= \sum_{n=1}^N (U_n - U_{n-1}) V_n + U_0 V_0 = \sum_{n=1}^N U_n V_n - \sum_{n=1}^N U_{n-1} V_n + U_0 V_0 \\ &= \sum_{n=0}^N U_n V_n - \sum_{n=0}^{N-1} U_n V_{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} U_n (V_n - V_{n+1}) + U_N V_N \\ &= - \sum_{n=0}^{N-1} U_n v_n + U_N V_N. \end{aligned}$$

□

Cette écriture permet de montrer le résultat suivant.

Propriété 3.3.3. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites à valeurs complexes. Si les sommes partielles de la série $\sum u_n$ constituent une suite bornée et si la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive et décroît vers 0, alors la série $\sum u_n V_n$ converge.

Démonstration. On reprend les notations de la propriété 3.3.2. On va montrer que les sommes partielles de la série $\sum u_n V_n$ constituent une suite de Cauchy. La suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par une constante notée C . On a alors

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=p}^q u_n V_n \right| &= \left| \sum_{n=0}^q u_n V_n - \sum_{n=0}^{p-1} u_n V_n \right| \\ &= \left| - \sum_{n=0}^{q-1} U_n v_n + U_q V_q + \sum_{n=0}^{p-2} U_n v_n - U_{p-1} V_{p-1} \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=p-1}^{q-1} U_n v_n \right| + |U_q V_q| + |U_{p-1} V_{p-1}| \\ &\leq C \left(\sum_{n=p-1}^{q-1} |v_n| + |V_q| + |V_{p-1}| \right). \end{aligned}$$

Or, comme la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroît, on a $|v_n| = |V_{n+1} - V_n| = V_n - V_{n+1}$. La somme du membre de droite est donc une somme télescopique, et on obtient

$$\left| \sum_{n=p}^q u_n V_n \right| \leq C \left(\left(\sum_{n=p}^{q-1} V_n - V_{n+1} \right) + V_q + V_{p-1} \right) = C(V_p + V_{p-1}).$$

Le membre de droite tend vers 0 par hypothèse quand p et q tendent vers l'infini. La série $\sum u_n V_n$ satisfait donc le critère de Cauchy. \square

Un corollaire important de ce théorème est le suivant :

Corollaire 3.3.4. *Pour toute suite décroissante $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et tout réel θ non multiple de 2π , les séries*

$$\sum e^{in\theta} u_n, \quad \sum \cos(n\theta) u_n \quad \text{et} \quad \sum \sin(n\theta) u_n$$

convergent.

Démonstration. Comme on a

$$\sum \cos(n\theta) u_n = \sum \left(e^{in\theta} \frac{u_n}{2} + e^{-in\theta} \frac{u_n}{2} \right) \quad \text{et} \quad \sum \sin(n\theta) u_n = \sum \left(e^{in\theta} \frac{u_n}{2} - e^{-in\theta} \frac{u_n}{2} \right),$$

il suffit d'étudier la série $\sum e^{in\theta} u_n$. Cette série rentre bien dans le cadre de la propriété 3.3.3 puisque la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive et décroît vers 0, et les sommes partielles $\sum_{n=0}^N e^{in\theta}$ vérifient (puisque comme $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on a $e^{i\theta} \neq 1$)

$$\left| \sum_{n=0}^N e^{in\theta} \right| = \left| \frac{1 - e^{i(N+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|},$$

et sont donc bornées. \square

3.4 Séries doubles

Dans cette partie, on s'intéresse à des séries indexées par *deux* entiers, de la forme $\sum u_{n,m}$. Il y a alors deux manières naturelles de définir une somme de la série : en faisant d'abord la somme sur les indices n , puis sur les indices m , ou bien dans l'autre sens. Autrement dit, on se demande tout d'abord si la quantité $v_m = \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}$ est bien définie, et si c'est le cas, si la quantité $\sum_{m=0}^{\infty} v_m = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}$ est bien définie. Une autre question intéressante est de savoir si il existe un lien entre les deux quantités

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m} \quad \text{et} \quad \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}.$$

La propriété suivante dit essentiellement que dans le cas où $u_{n,m} \geq 0$, toutes les quantités que l'on vient de présenter sont définies et vérifient les relations auxquelles on peut s'attendre.

Propriété 3.4.1 (Théorème de Fubini). *Soit $(u_{n,m})_{(n,m) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de réels positifs indexée par les couples $(n,m) \in \mathbb{N}^2$. Si pour tout entier naturel m la série $\sum_n u_{n,m}$ est convergente et si la série $\sum_m (\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m})$ converge, alors, pour tout n , la série $\sum_m u_{n,m}$ converge, de même que la série $\sum_n (\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m})$. De plus, on a*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m} \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m} \right)$$

Démonstration. Sous les hypothèses de l'énoncé, on a la majoration

$$\sum_{m=0}^M u_{n,m} \leq \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m} \leq \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}.$$

Les sommes partielles de la série à termes positifs $\sum_m u_{n,m}$ sont donc majorées, de sorte que cette série converge.

Ensuite, on a

$$\sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^M u_{n,m} = \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^N u_{n,m} \leq \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m} \leq \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}.$$

En passant à la limite $M \rightarrow \infty$ (ce qui est licite puisque N est fini), on trouve

$$\sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m} \leq \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m},$$

de sorte que les sommes partielles de la série $\sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m}$ sont bornées. Comme cette série est à termes positifs, on en déduit qu'elle converge. En passant à la limite dans la dernière inégalité, on trouve

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m} \leq \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m}.$$

Par symétries entre les indices n et m , l'égalité inverse est également vraie, et on en déduit l'égalité des sommes. \square

Pour généraliser la propriété 3.4.1 aux cas des nombres complexes, on doit ajouter une hypothèse de convergence absolue :

Propriété 3.4.2. Soit $(u_{n,m})_{(n,m) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de nombres complexes indexée par les couples $(n, m) \in \mathbb{N}^2$. Si pour tout naturel m la série $\sum_n |u_{n,m}|$ est convergente et si la série $\sum (\sum_{n=0}^{\infty} |u_{n,m}|)$ converge, alors les séries $\sum_m u_{n,m}$, $\sum_n u_{n,m}$, $\sum (\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m})$ et $\sum (\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m})$ convergent et on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m} \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m} \right)$$

Démonstration. La première partie de l'énoncé est une simple application de la propriété 3.4.1 et du fait qu'une série absolument convergente est convergente. Pour montrer l'égalité des sommes, on remarque qu'on a l'égalité

$$\left| \sum_{n=0}^N \left(\sum_{m=0}^{\infty} u_{n,m} \right) - \sum_{m=0}^N \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,m} \right) \right| = \left| \sum_{n=0}^N \left(\sum_{m=N+1}^{\infty} u_{n,m} \right) - \sum_{m=0}^N \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} u_{n,m} \right) \right|,$$

Ensuite, en utilisant l'inégalité triangulaire on a

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^N \left(\sum_{m=N+1}^{\infty} u_{n,m} \right) - \sum_{m=0}^N \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} u_{n,m} \right) \right| &\leq \sum_{n=0}^N \left(\sum_{m=N+1}^{\infty} |u_{n,m}| \right) + \sum_{m=0}^N \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |u_{n,m}| \right) \\ &= \sum_{m=N+1}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^N |u_{n,m}| \right) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^N |u_{n,m}| \right) \\ &\leq \sum_{m=N+1}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} |u_{n,m}| \right) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} |u_{n,m}| \right). \end{aligned}$$

Le membre de droite tend bien vers 0, étant le reste d'une série convergente. \square

On va maintenant énoncer une propriété du *produit de Cauchy*, ou *produit de convolution* de deux séries, qui est la définition naturelle du produit de deux séries.

Définition 3.4.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. On définit leur produit de Cauchy $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la formule

$$w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}.$$

Le produit de Cauchy est commutatif, puisqu'un changement de variable $q = n - k$ dans la somme précédente donne

$$w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} = \sum_{q=0}^n u_{n-q} v_q.$$

Le produit de Cauchy se comporte bien vis à vis des séries absolument convergentes.

Propriété 3.4.4. Si les séries à termes complexes $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors il en est de même de la série $\sum w_n$, où $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$. De plus on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n \right).$$

Démonstration. On a

$$\sum_{n=0}^N |w_n| = \sum_{n=0}^N \left| \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} \right| \leq \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^n |u_k| |v_{n-k}|.$$

On peut intervertir les deux sommes en écrivant

$$\sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^n |u_k| |v_{n-k}| = \sum_{k=0}^N \sum_{k=n}^N |u_k| |v_{n-k}| = \sum_{k=0}^N \sum_{q=0}^{N-k} |u_k| |v_q|,$$

la dernière égalité s'obtenant par le changement de variable $q = n - k$. On a donc

$$\sum_{n=0}^N |w_n| \leq \sum_{k=0}^N \sum_{q=0}^N |u_k| |v_q| = \left(\sum_{k=0}^N |u_k| \right) \left(\sum_{q=0}^N |v_q| \right) \leq \left(\sum_{k=0}^{\infty} |u_k| \right) \left(\sum_{q=0}^{\infty} |v_q| \right),$$

ce qui montre que la série $\sum w_n$ est absolument convergente, les sommes partielles de la série des modules étant bornées. Pour montrer que la somme du produit de Cauchy vaut le produit des sommes, on écrit

$$\left| \sum_{n=0}^{2N} w_n - \left(\sum_{k=0}^N u_k \right) \left(\sum_{q=0}^N v_q \right) \right| = \left| \sum_{n=0}^{2N} \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} - \left(\sum_{k=0}^N u_k \right) \left(\sum_{q=0}^N v_q \right) \right|.$$

En intervertissant les sommes et en faisant le changement de variables $q = n - k$, on obtient

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^{2N} \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} - \left(\sum_{k=0}^N u_k \right) \left(\sum_{q=0}^N v_q \right) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{2N} \sum_{n=k}^{2N} u_k v_{n-k} - \sum_{k=0}^N \sum_{q=0}^N u_k v_q \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{2N} \sum_{q=0}^{2N-k} u_k v_q - \sum_{q=0}^N \sum_{k=0}^N u_k v_q \right|. \end{aligned}$$

On peut alors écrire,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{2N} \sum_{q=0}^{2N-k} u_k v_q - \sum_{q=0}^N \sum_{k=0}^N u_k v_q \right| &= \left| \sum_{k=N+1}^{2N} \sum_{q=0}^{2N-k} u_k v_q + \sum_{q=N+1}^{2N} \sum_{k=0}^{2N-q} u_k v_q \right| \\ &\leq \sum_{k=N+1}^{2N} \sum_{q=0}^{2N-k} |u_k| |v_q| + \sum_{q=N+1}^{2N} \sum_{k=0}^{2N-q} |u_k| |v_q| \\ &\leq \sum_{k=N+1}^{2N} \sum_{q=0}^{\infty} |u_k| |v_q| + \sum_{q=N+1}^{2N} \sum_{k=0}^{\infty} |u_k| |v_q| \\ &\leq \left(\sum_{k=N+1}^{\infty} |u_k| \right) \left(\sum_{q=0}^{\infty} |v_q| \right) + \left(\sum_{q=N+1}^{\infty} |v_q| \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} |u_k| \right). \end{aligned}$$

Les restes d'une série convergente tendent vers zéro, par conséquent le membre de droite tend vers 0, ce qui achève la démonstration. \square

3.5 Exercices

Exercice 3.1.

Donner la nature des séries suivantes, et calculer la somme des éventuelles séries convergentes.

$$\begin{aligned} &\sum \frac{1}{n(n+1)} ; \sum e^{-n} ; \sum \ln(1 + 1/n) ; \\ &\sum \frac{n^2 + n - 3}{n!} ; \sum 3^n \sin^3 \left(\frac{\theta}{3^{n+1}} \right) ; \sum \frac{1}{n} ; \\ &\sum \frac{1}{\ln n} ; \sum \frac{\cos n}{2^n} ; \sum \frac{(-1)^n}{(-1)^n + n}. \end{aligned}$$

Exercice 3.2.

Soit $\sum u_n$ une série de terme général positif.

1. Montrer que si $\sum u_n$ converge, alors $\sum u_n^a$ converge pour tout $a \geq 1$.
2. Montrer que si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum u_n^a$ diverge pour tout $a < 1$.
3. Montrer que $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ converge si et seulement si $\sum u_n$ converge.

Exercice 3.3.

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Montrer que la série $\sum a_n 10^{-n}$ converge. On notera $0.a_1 a_2 a_3 \dots$ sa limite. Combien vaut $0.999\dots$? Sous quelle condition les réels $0.a_1 a_2 a_3 \dots$ et $0.b_1 b_2 b_3 \dots$ sont-ils égaux?

Exercice 3.4.

Soit $\sum u_n$ une série divergente dont le terme général est positif. Montrer que la série $\sum \frac{u_n}{\sum_{k=0}^n u_k}$ diverge.

Exercice 3.5.

Soit u_n une suite décroissante de nombres réels positifs.

1. Montrer que si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_n n u_n = 0$. La réciproque est-elle vraie? (On pourra s'inspirer de l'exercice précédent)
2. Montrer que si la série $\sum u_n$ converge, alors $\sum n(u_n - u_{n+1})$ converge. Comparer les sommes de ces deux séries.
3. Comparer les natures des séries

$$\sum u_n ; \sum n u_{n^2} \text{ et } \sum 2^n u_{2^n}.$$

Exercice 3.6.

[Formule de Stirling]

On considère la suite $u_n = \ln(n!) - (n + \frac{1}{2}) \ln(n) + n$.

1. Montrer que la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ est absolument convergente (on utilisera le développement limité en 0 suivant : $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^2)$).
2. En déduire que u_n converge et qu'il existe une constante C (note 7) telle que

$$u_n \sim C e^{-n} n^n \sqrt{n}.$$

Exercice 3.7.

Donner la nature des séries suivantes (a et b sont des réels strictement positifs).

$$\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} ; \sum \frac{n!}{n^n} ; \sum \frac{a^n}{1+b^n} ; \sum \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$$

$$\sum \left(\frac{n+a}{n+b} \right)^{n^2} ; \sum \frac{n}{\prod_{k=1}^n (1+a^k)} ; \sum \frac{1}{n} \cos \left(2n \frac{\pi}{3} \right).$$

Exercice 3.8.

Donner un équivalent à $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, pour $\alpha > 1$.

(note 7). En fait, on a $C = \sqrt{2\pi}$.

Exercice 3.9.

Quelle est la nature de la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$? En utilisant le fait que la suite $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ converge, donner la valeur de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

Exercice 3.10.

Donner la nature des séries données par

$$\sum \alpha^n n^\beta (\ln n)^\gamma$$

en fonction des réels α , β et γ (avec $\alpha > 0$).

Exercice 3.11.

Quelle est la nature de la série $\sum \frac{1}{1+\sqrt{2}+\dots+\sqrt{n}}$?

Exercice 3.12.

Montrer l'inégalité

$$\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} \leq e \leq \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} + \frac{1}{N!N}.$$

En déduire que e est un nombre irrationnel.

Exercice 3.13.

Donner un équivalent à la fonction $t \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$, pour t tendant vers 1.

Exercice 3.14.

Que peut-on dire du produit de Cauchy de la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ par elle-même ? On rappelle que le produit de Cauchy des séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ est la série de terme général $\sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$.

Exercice 3.15.

Montrer la formule

$$\frac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{p+n-1}^n z^n,$$

où z est un complexe vérifiant $|z| < 1$.

Exercice 3.16.

Soit z et z' deux nombres complexes.

1. Montrer que la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge absolument. On notera sa somme e^z .
2. Montrer que $e^z e^{z'} = e^{z+z'}$.

Chapitre 4

Fonctions de la variable réelle

4.1 Étude locale des fonctions

On va utiliser la terminologie suivante, qui sera utile par la suite.

Définition 4.1.1. Un voisinage d'un réel a est un sous-ensemble de \mathbb{R} contenant un intervalle non-trivial centré en a , c'est à dire un intervalle de la forme $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$, pour un certain $\varepsilon > 0$.

Par exemple, les ensembles $] - 1, \infty[$, \mathbb{R} , ou $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [n - 1/3, n + 1/3]$ sont des voisinages de 0. En revanche, les ensembles $[0, 1]$, $[0, \infty[$ ou \mathbb{Q} n'en sont pas.

Définition 4.1.2. On dit qu'une fonction réelle f définie sur un voisinage I d'un point a a pour limite en a la valeur l si elle vérifie la proposition

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, (|x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon).$$

Si la fonction f admet l comme limite au point a , on note

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l, \text{ ou encore } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l.$$

On peut également parler des limites à gauche et à droite d'une fonction.

Définition 4.1.3. On dit qu'une fonction f définie au voisinage^(note 1) d'un point a admet l comme limite à gauche en a si elle vérifie la proposition

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, (x \in]a - \eta, a[) \Rightarrow (|f(x) - l| \leq \varepsilon).$$

On peut définir de même la notion de limite à droite.

Si f admet l comme limite à gauche (resp. à droite) en a , on note

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l \text{ ou } \lim_{x \nearrow a} f(x) = l \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l \text{ ou } \lim_{x \searrow a} f(x) = l).$$

(note 1). On peut aussi supposer que f n'est définie que sur un voisinage à gauche de a , c'est-à-dire sur un ensemble contenant un sous-ensemble de la forme $]a - \varepsilon, a[$, pour $\varepsilon > 0$.

Définition 4.1.4. On dit qu'une fonction f définie au voisinage d'un point a est continue en a si elle admet une limite en a .

Si la fonction f de I dans \mathbb{R} est continue en tout point a de I , on dit qu'elle est continue sur I , ou tout simplement qu'elle est continue. L'ensemble des fonctions continues sur I sera noté $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

Si f admet une limite à gauche en a et que $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$, on dit que f est continue à gauche en a . On définit de même la continuité à droite.




FIGURE 4.1 – Continuité d'une fonction.

On peut exprimer la continuité à partir des limites à gauche et à droite :

Propriété 4.1.5. Une fonction f définie sur un voisinage de a est continue en a si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en a .

On peut caractériser la continuité de la manière suivante :

Propriété 4.1.6 (Caractérisation séquentielle de la continuité). Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur un voisinage d'un point a .

- La fonction f est continue en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers a , la suite ^(note 2) $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $f(a)$.
- On peut également caractériser de cette manière la continuité à gauche (resp. à droite.) en se limitant aux suites prenant des valeurs strictement inférieures (resp. strictement supérieures) à a .

Démonstration. Supposons la fonction f continue en a , et soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergeant vers a . Soit ε un réel positif. Par continuité de f en a , il existe un réel η tel que si $|x - a| \leq \eta$, alors $|f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$. Mais par convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers a , il existe un indice n_0 tel que pour $n \geq n_0$, on ait $|u_n - a| \leq \eta$. En conséquence, si $n \geq n_0$, on a $|f(u_n) - f(a)| \leq \varepsilon$. Cela montre que la suite $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.

Montrons l'implication inverse. Pour cela, nous allons passer par la contraposée. Supposons que la fonction f ne soit pas continue. Par conséquent, il existe un réel ε tel que pour tout η , il existe un x_η dans $]a - \eta, a + \eta[$ tel que $|f(a) - f(x_\eta)| \geq \varepsilon$. La suite $(x_{1/n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a (puisque $|x_{1/n} - a| \leq \frac{1}{n}$) sans que $(f(x_{1/n}))_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge vers $f(a)$ (puisque $|f(a) - f(x_{1/n})| \geq \varepsilon$). \square

(note 2). Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a et comme f est définie sur un voisinage de a , les u_n sont dans le domaine de définition de f pour n assez grand. Par conséquent, l'expression $f(u_n)$ a bien un sens pour n assez grand.

Cette caractérisation par les suites de la continuité permet de déduire des résultats sur les passages à la limite à partir des mêmes résultats dans le cadre des suites.

Propriété 4.1.7. Soient f et g deux fonctions définies sur un voisinage d'un point a telle que pour tout $x \neq a$ dans un voisinage de a on ait

$$f(x) \leq g(x).$$

Si les deux fonctions admettent une limite en a , alors ces limites vérifient

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

La même inégalité est vraie pour les limites à gauche ou à droite.

Démonstration. On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers a . On a alors

$$\lim_n f(u_n) = \lim_{x \rightarrow a} f(x), \text{ et } \lim_n g(u_n) = \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

On conclut alors en passant à la limite en n dans l'inégalité $f(u_n) \leq g(u_n)$. \square

Il est important de noter que l'on *ne peut pas* conclure à une inégalité stricte entre les limites si on a seulement une inégalité stricte entre les fonctions.

Propriété 4.1.8 (“Théorème des gendarmes”). Soient f , g et h trois fonctions définies sur un voisinage d'un point a telle que pour tout x dans un voisinage de a on ait

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Si f et h ont une limite en a et si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$, alors g admet également une limite en a et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x).$$

Démonstration. On note $\lambda = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite tendant vers a . Pour tout n , on a l'inégalité $f(u_n) \leq g(u_n) \leq h(u_n)$. Comme de plus les deux suites $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(h(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers la même limite λ , le théorème des gendarmes pour les suites montre que la suite $(g(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers λ . Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arbitraire, cela montre que g admet une limite en a valant λ . \square

Propriété 4.1.9. Soient f et g deux fonction continues en un point a . On a les propriétés suivantes :

- pour tout réel λ , la fonction λf est continue en a ;
- la fonction $f + g$ est continue en a ;
- la fonction fg est continue en a ;
- si $f(a) \neq 0$, alors f ne s'annule pas sur un voisinage de a . La fonction $\frac{1}{f}$ est alors bien définie sur un voisinage de a et est continue en a .

Autrement dit, l'ensemble des fonction continues en un point a constitue une *algèbre*.

Démonstration. Laissez en exercice. \square

Propriété 4.1.10. Soient f et g deux fonctions telles que f soit définie sur un voisinage I de a et continue en a , et que g soit définie sur $f(I)$ et continue en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est continue en a .

Démonstration. On note pour simplifier $l_g = \lim_{y \rightarrow f(a)} g(y)$ et $l_f = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Soit ε un réel strictement positif. Par continuité de g en $f(a)$, on peut trouver un réel η strictement positif tel que si y est dans $|f(a) - y| \leq \eta$, alors $|g(y) - l_g| \leq \varepsilon$. Mais alors, par continuité de f en a , on peut trouver un réel strictement positif ζ tel que si $|x - a| \leq \zeta$, alors $|f(x) - l_f| \leq \eta$. Par conséquent, si $|x - a| \leq \zeta$, alors $|g(f(x)) - l_g| \leq \varepsilon$. On a donc montré que $g \circ f$ admettait l_g comme limite en a . \square

4.2 Fonctions continues sur un intervalle

Théorème 4.2.1. [Théorème des valeurs intermédiaires] Soit f une fonction continue d'un intervalle I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . L'image $f(I)$ de I par f est un intervalle.

Autre formulation :

Théorème 4.2.2 (Théorème des valeurs intermédiaires 2). Soit f une fonction continue de $[a, b]$ dans \mathbb{R} . Si c est tel que $f(a) < c < f(b)$ ou $f(b) < c < f(a)$, alors il existe x dans $[a, b]$ tel que $f(x) = c$.




FIGURE 4.2 – Le théorème des valeurs intermédiaires. Aux pointillés bleus, les valeurs possibles de x .

Il est important de comprendre que ce résultat *n'est pas* évident. Pour s'en convaincre, on peut méditer sur l'exemple de la fonction de \mathbb{Q} dans lui-même qui à x associe $x^2 - 2$. Cette fonction continue prend une valeur négative en 0 et positive en 2, mais ne s'annule jamais (car $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel).

Une preuve du théorème des valeurs intermédiaires fera en fait appel d'une manière ou d'une autre à la complétude de \mathbb{R} , que ce soit sous la forme de suites de Cauchy, de la propriété de la borne supérieure, de la propriété des segments emboîtés, etc.

Démonstration. On montre la deuxième formulation du théorème. On suppose $f(a) < c < f(b)$. Le cas inverse s'en déduit en appliquant le résultat à la fonction $-f$. On pose $A_c = \{x \in [a, b], f(x) \leq c\}$. L'ensemble A_c est borné (car contenu dans $[a, b]$). On peut donc définir $x_0 = \sup A_c$. On va montrer que $f(x_0) = c$. Tout d'abord remarquons que par continuité on peut trouver $\varepsilon > 0$ tel que $f(x) < c$ pour x dans $[a, a + \varepsilon]$ et que $f(x) > c$ pour x dans $[b - \varepsilon, b]$. Par conséquent, x_0 est un élément de $]a, b[$. Ensuite, on remarque que $f(x) > c$ sur $]x_0, b]$. Par continuité, on obtient $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \geq c$. D'autre part, comme x_0 est la borne supérieure de A_c , il existe une suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A_c qui converge vers x_0 . Or $f(y_n) \leq c$, d'où $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) \leq c$. On déduit que $f(x_0) = c$. \square

Propriété 4.2.3. *Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Alors la fonction f est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit, il existe y et z dans $[a, b]$ tels que*

$$f(y) \leq f(x) \leq f(z) \text{ pour tout } x \text{ de } [a, b].$$

Démonstration. Ce résultat est basé sur la compacité de l'intervalle $[a, b]$. Il faudra donc à un moment de la preuve utiliser cette propriété, par exemple avec le théorème de Bolzano-Weierstrass.

On pose $M = \sup f([a, b])$ (qui peut a priori être infini), et on choisit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers M . Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ convergente dont on note z la limite. Par continuité de f , la suite $(f(x_{\varphi(n)}))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(z)$, d'où $M = f(z)$. On a donc montré que la fonction atteint sa borne supérieure. Le cas de la borne inférieure se fait de manière symétrique. \square

Définition 4.2.4. *Soit f une fonction de I un intervalle de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . On dit que f est uniformément continue si elle vérifie la proposition*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta) \Rightarrow (|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon).$$

Cette définition signifie intuitivement que la fonction f est continue "partout de la même manière". Il est intéressant de comparer cette définition avec celle de continuité. La continuité sur I s'exprime par l'expression

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in I, \exists \eta > 0, \forall y \in I, (|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon).$$

En revanche, l'uniforme continuité s'exprime par

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \forall y \in I, (|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon).$$

Autrement dit, dans le cas de la continuité simple, η peut dépendre de x , alors que pour l'uniforme continuité η doit être le même pour tout x . On voit notamment que :

Propriété 4.2.5. *Une fonction uniformément continue est continue.*

La réciproque de cette propriété est bien entendu fautive comme le montre l'exemple de la fonction $x \mapsto x^2$ (en effet les points $x_n = n$ et $y_n = n + 1/n$ vérifient $|x_n - y_n| = |n - (n + 1/n)| = 1/n \rightarrow 0$, alors que $|f(x_n) - f(y_n)| = |n^2 - (n^2 + 2 + 1/n^2)| = 2 + 1/n^2 > 2$).

Toutefois, on a une réciproque à la propriété 4.2.5 si l'on ne considère la fonction que sur un *segment* :

Théorème 4.2.6. *[Théorème de Heine] Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$. Alors la fonction f est uniformément continue sur $[a, b]$.*

Démonstration. On va montrer la contraposée. La proposition “ f n’est pas uniformément continue sur I ” s’écrit avec les quantificateurs

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in I, \exists y \in I, (|x - y| \leq \eta \text{ et } |f(x_\eta) - f(y_\eta)| > \varepsilon).$$

Choisissons un tel ε . On considère des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$. Par la propriété de Bolzano-Weierstrass on en extrait des sous-suites convergentes $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ (on est sur le segment $[a, b]$) ^(note 3). Comme on a $|x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}| \leq \frac{1}{\varphi(n)}$, les deux suites ont la même limite l . Or, on a l’inégalité $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| > \varepsilon$, qui fait que la fonction f ne peut pas être pas continue. \square

Un cas particulier de fonction uniformément continue est le suivant :

Définition 4.2.7. On dit qu’une fonction de I dans \mathbb{R} est Lipschitzienne si il existe une constante k telle que pour x et y dans I , on ait

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Propriété 4.2.8. Une fonction Lipschitzienne est uniformément continue.

Démonstration. Dans la définition de l’uniforme continuité, pour un ε donné, il suffit de choisir $\eta = \varepsilon/k$. \square

La réciproque est bien entendu fausse, comme on le voit sur l’exemple de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ définie sur $[0, \infty[$. En effet, les points 0 et $1/n$ vérifient $|\sqrt{1/n} - \sqrt{0}| = \sqrt{1/n} = \sqrt{n}|1/n - 0|$. Si la fonction était k -Lipschitzienne, on aurait alors $\sqrt{n}|1/n - 0| \leq k|1/n - 0|$, de sorte que k devrait vérifier $k \geq \sqrt{n}$ pour tout n , ce qui est impossible.

4.3 Dérivation

Définition 4.3.1. On dit qu’une fonction f définie au voisinage d’un point a est dérivable en a si la quantité $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, appelée taux d’accroissement converge vers une limite quand h tend vers 0. La limite du taux d’accroissement est notée $f'(a)$ et appelée dérivée de f au point a .
On dit qu’une fonction f définie sur un intervalle ouvert est dérivable si elle est dérivable en tout point de I . On peut alors définir sur I la fonction f' appelée dérivée de f .

Au vu de cette définition, dire qu’une fonction est dérivable en un point a revient à dire que cette fonction est proche d’une fonction affine au voisinage de a . Plus précisément f est proche de la fonction

$$x \mapsto f(a) + (x - a)f'(a)$$

(voir la deuxième remarque après le corollaire 4.5.8). Ceci est illustré sur la figure 4.3 où l’on a représenté le graphe d’une fonction f ainsi que sa tangente en un point a , qui a pour équation $y = f(a) + (x - a)f'(a)$. L’écart entre la fonction et la tangente tend vers 0 quand x tend vers a .

La dérivabilité est une notion plus forte que la notion de continuité :

(note 3). On peut prendre la même fonction extractrice φ pour $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en extrayant d’abord une sous-suite convergente $(x_{\varphi_0(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ puis en extrayant une sous-suite convergente $(y_{\varphi_0(\varphi_1(n))})_{n \in \mathbb{N}}$ de $(y_{\varphi_0(n)})_{n \in \mathbb{N}}$. On pose alors $\varphi = \varphi_0 \circ \varphi_1$.




FIGURE 4.3 – Une fonction et sa tangente.

Propriété 4.3.2. Si f est une fonction définie au voisinage d'un point a et est dérivable au point a , alors f est continue au point a .

Démonstration. On a

$$|f(a+h) - f(a)| = h \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right|.$$

Or, si f est dérivable en a , $\left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right|$ converge (vers $|f'(a)|$) quand h tend vers 0, et donc reste borné, de sorte que

$$|f(a+h) - f(a)| \leq Ch \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

□

En revanche on peut trouver des fonctions continues mais non dérivables. L'exemple le plus simple est la fonction valeur absolue, qui est continue sur \mathbb{R} mais n'est pas dérivable en 0. En effet, on a

$$\frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & \text{si } h > 0, \\ -1 & \text{si } h < 0, \end{cases}$$

de sorte que le taux d'accroissement n'a pas de limite en 0.

La fonction valeur absolue est en revanche dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. On peut quand même trouver des fonctions continue qui ne sont dérivables en aucun point, comme dans la proposition suivante.

Propriété 4.3.3. Si a et b sont deux réels vérifiant $|a| < 1$ et $|ab| > 1$, alors la fonction f définie par

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n x)$$

est continue sur \mathbb{R} mais dérivable en aucun point.




FIGURE 4.4 – Un exemple de fonction continue mais dérivable en aucun point.

Cette propriété se comprend bien en remarquant que la série $\sum a^n$ converge de sorte que la série définissant f est absolument convergente^(note 4), alors que la série $\sum (ab)^n$ diverge, de sorte que la série qui est naturellement candidate pour définir f' , à savoir $-\sum (ab)^n \sin(b^n x)$, n'est a priori pas nécessairement convergente (ceci ne constitue bien entendu pas une preuve complète!). Sur la figure 4.4, on a représenté la fonction f pour les valeurs $a = 0.5$ et $b = 4$.

Démonstration. Admis. □

La dérivabilité est stable par les opérations suivantes :

Propriété 4.3.4. Soient f et g deux fonctions définies sur un voisinage d'un point a .

- La fonction $f + g$ est dérivable au point a et on a $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$;
- La fonction λf est dérivable en a et $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$;
- La fonction fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f(a)g'(a) + f'(a)g(a)$;
- Si $f(a)$ est non-nul, la fonction $\frac{1}{f}$ est dérivable, et $\left(\frac{1}{f}\right)'(a) = -\frac{f'(a)}{(f(a))^2}$.

Démonstration. Les propriétés de linéarité viennent des propriétés équivalentes pour les limites.

Pour le produit, on écrit

$$\frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}g(a+h) + f(a)\frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

Les quantités $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, $g(a+h)$, $f(a)$ et $\frac{g(a+h)-g(a)}{h}$ convergent respectivement vers $f'(a)$, $g(a)$, $f(a)$ et $g'(a)$, et on sait que l'on peut passer à la limite dans un produit.

Pour l'inverse d'une fonction, on écrit (comme f est continue, on a $f(a+h) \neq 0$ pour h assez petit)

$$\frac{\frac{1}{f(a+h)} - \frac{1}{f(a)}}{h} = \frac{f(a) - f(a+h)}{h} \times \frac{1}{f(a)f(a+h)},$$

qui converge bien vers la limite voulue. □

(note 4). Ce qui assure notamment que f est continue, voir la propriété 6.1.4.

La formule donnant la dérivée du produit se comprend bien sur la figure 4.5 : la fonction $x \mapsto f(x)g(x)$ est la fonction qui à x associe la surface d'un rectangle de côtés $f = f(x)$ et $g = g(x)$. Si les côtés varient respectivement d'une taille $df = f(x+h) - f(x)$ et $dg = g(x+h) - g(x)$, alors la surface du rectangle varie de $f.dg + g.df + df.dg$. Pour une fonction dérivable, $df.dg$ est de l'ordre de h^2 et est donc négligeable, pour h petit devant $f.dg + g.df$ qui est de l'ordre de h . On obtient donc la formule $d(fg) = f.dg + g.df$.




FIGURE 4.5 – Dérivée d'un produit.

Par récurrence, en appliquant plusieurs fois la formule $(fg)' = f'g + fg'$, on obtient la formule suivante :

Propriété 4.3.5 (Formule de Leibniz). *Si f et g sont deux fonctions n fois dérivables en un point a , on a*

$$(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(a)g^{(n-k)}(a).$$

On peut aussi composer les fonctions dérivables :

Propriété 4.3.6. *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable au point a et g une fonction définie sur $f(I)$ et dérivable en $f(a)$. Alors la fonction $g \circ f$ est dérivable en a et*

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Démonstration. Soit h un réel positif. On a

$$\frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a)}{h} = \frac{g(f(a) + hf'(a) + h\tau_h) - g(f(a))}{h},$$

où l'on a posé $\tau_h = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a)$, qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. En conséquence,

$$\begin{aligned} \frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a)}{h} &= \frac{g(f(a) + hf'(a) + h\tau_h) - g(f(a))}{(f'(a) + \tau_h)h} (f'(a) + \tau_h) \\ &= \frac{g(f(a) + \varepsilon_h) - g(f(a))}{\varepsilon_n} (f'(a) + \tau_h), \end{aligned} \quad (4.1)$$

où l'on a posé $\varepsilon_h = (f'(a) + \tau_h)h$. Comme ε_h tend également vers 0 quand h tend vers 0, l'expression en (4.1) tend bien vers $g'(f(a))f'(a)$ quand h tend vers 0. \square

On peut aussi calculer la dérivée d'une fonction réciproque de la manière suivante :

Propriété 4.3.7. *Soit f une fonction bijective d'un intervalle ouvert I dans un intervalle ouvert J . On suppose f et sa réciproque continues. Pour a dans I , si f est dérivable en a avec $f'(a)$ non-nul, alors la fonction réciproque f^{-1} est dérivable en $f(a)$ avec*

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Démonstration. En posant $\tau_h = f^{-1}(f(a) + h) - a$, on obtient $f(a + \tau_h) - f(a) = h$, de sorte que

$$\frac{f^{-1}(f(a) + h) - f^{-1}(f(a))}{h} = \frac{f^{-1}(f(a) + h) - a}{h} = \frac{\tau_h}{f(a + \tau_h) - f(a)}.$$

Par continuité de f et de f^{-1} , la quantité τ_h tend vers 0 quand h tend vers 0 ce qui nous donne le résultat. \square

Propriété 4.3.8. *Soit f une fonction définie sur un voisinage de a et dérivable en a . Si a est un extremum local pour la fonction f , alors $f'(a) = 0$.*

On rappelle que si il existe un voisinage I d'un point a tel que $f(x) \leq f(a)$ pour tout x dans I , on dit que a est un *maximum local* de f (ou que f admet un maximum local en a), si $f(a) \leq f(x)$ pour x dans I on dit que a est un *minimum local*, et que si a est un minimum local ou un maximum local, on dit que a est un *extremum local*.

Sur la figure 4.6, on voit que la fonction a une dérivée nulle en ses extrema locaux a_i , sauf en a_1 et a_7 , situés aux bornes de l'intervalle de définition, puisque la fonction n'est pas définie sur un *voisinage* de ces points.




FIGURE 4.6 – Extrema d'une fonction. Les points a_i sont des extrema locaux de la fonction représentée.

Démonstration. On peut supposer (quitte à changer f en $-f$) que a est un maximum local pour f . On a donc, pour h assez petit $f(a+h) \leq f(a)$. En conséquence,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0 \text{ et } f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0.$$

La quantité $f'(a)$ est donc à la fois positive et négative, elle est donc nulle. \square

Il est important de remarquer que l'on peut avoir $f'(a) = 0$ sans que f atteigne un minimum en a . L'exemple le plus classique est la fonction $x \mapsto x^3$ qui a une dérivée nulle en 0. C'est également le cas de la fonction représentée en Figure 4.6 au point b .

Théorème 4.3.9 (Théorème de Rolle). *Soit f une fonction continue de $[a, b]$ dans \mathbb{R} , dérivable sur $]a, b[$. Si $f(a) = f(b)$, alors il existe c dans $]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.*

Le théorème de Rolle est illustré sur la figure 4.7, avec les différentes valeurs possibles de c .




FIGURE 4.7 – Le théorème de Rolle.

Démonstration. Le résultat est évident si la fonction f est constante égale à $f(a)$ sur l'intervalle $[a, b]$, car la dérivée de f est alors nulle en tout point de $]a, b[$.

On peut donc supposer que f est non constante, et quitte à changer f en $-f$, on peut supposer qu'elle prend une valeur strictement supérieure à $f(a)$. Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, elle atteint son maximum en un point c , qui est distinct de a et b (puisque la fonction atteint une valeur strictement supérieure à $f(a) = f(b)$). Par la propriété 4.3.8, on déduit que $f'(c) = 0$. \square

Théorème 4.3.10 (Théorème des accroissements finis). *Soit f une fonction continue de $[a, b]$ dans \mathbb{R} , dérivable sur $]a, b[$. Il existe un élément c de $]a, b[$ tel que*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Si la dérivée de f est bornée, on déduit notamment de cette formule l'inégalité des accroissements finis :

$$|f(b) - f(a)| \leq |b - a| \sup_{[a, b]} |f'(x)|.$$

Le théorème des accroissements finis est illustré sur la figure 4.8.




FIGURE 4.8 – Le théorème des accroissements finis. Les flèches correspondent à une pente de $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

L'inégalité des accroissements finis se comprend très bien par un exemple de la vie courante : si vous vous déplacer en voiture sur l'autoroute en respectant la limite de 130km/h, au bout d'une heure vous vous trouverez nécessairement à moins de 130 kilomètres de votre point de départ.

Démonstration. Il suffit d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction g définie sur $[a, b]$ par

$$g(x) = f(x) - f(a) - (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

La fonction g est dérivable sur $]a, b[$ (comme somme de f et d'un polynôme) et vérifie $g(a) = 0$, $g(b) = 0$. Le théorème de Rolle nous permet de conclure qu'il existe c tel que $g'(c) = 0$. Or $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. On a donc $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. \square

Propriété 4.3.11. Soit f une fonction dérivable définie sur un intervalle ouvert. Alors :

- f est croissante si et seulement si elle vérifie $f'(x) \geq 0$ pour tout x ;
- f est décroissante si et seulement si elle vérifie $f'(x) \leq 0$ pour tout x ;
- f est constante si et seulement si elle vérifie $f'(x) = 0$ pour tout x ;
- Si f vérifie $f'(x) > 0$ sur I , alors elle est strictement croissante ;
- Si f vérifie $f'(x) < 0$ sur I , alors elle est strictement décroissante ;

Démonstration. Supposons que f est croissante. Si $h > 0$ alors, $f(x+h) - f(x) \geq 0$, d'où $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. De même, si $h < 0$, on a $f(x+h) - f(x) \leq 0$, de sorte $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. En passant à la limite $h \rightarrow 0$, on trouve donc $f'(x) \geq 0$. De même, on montre qu'une fonction décroissante a une dérivée négative. Par

conséquent, une fonction constante, qui est croissante et décroissante, a une dérivée à la fois positive et négative. Cette dérivée est donc nulle.

Inversement, soit f une fonction ayant une dérivée positive sur l'intervalle $]a, b[$, et soient $\alpha < \beta$ deux points de $]a, b[$. Par le théorème des accroissements finis, on peut trouver c dans $]a, b[$ tel que $f(\beta) - f(\alpha) = f'(c)(\beta - \alpha)$ qui est positif. Par conséquent, $f(\alpha) \leq f(\beta)$, ce qui montre que f est croissante. De même on montre qu'une fonction à dérivée négative est décroissante et par conséquent, qu'une fonction à dérivée nulle (c'est à dire à la fois positive et négative) est à la fois croissante et décroissante, et donc constante. Enfin, on remarque que si la dérivée de f est strictement positive, la quantité $f(\beta) - f(\alpha) = f'(c)(\beta - \alpha)$ est également strictement positive, de sorte que f est strictement croissante. \square

Cette propriété n'est vraie que si f est définie sur un intervalle, comme le montre l'exemple de la fonction f définie sur $] - 1, 0[\cup] 0, 1[$ par la formule

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in] - 1, 0[\\ 1 & \text{si } x \in] 0, 1[\end{cases},$$

qui a une dérivée nulle sans être constante. Autre exemple : la fonction définie sur \mathbb{R}^* qui à x associe $1/x$ a une dérivée strictement négative ($-1/x^2$) en tout point de \mathbb{R}^* , mais n'est pas décroissante sur \mathbb{R}^* .

D'autre part, on ne peut pas affirmer qu'une fonction dérivable et strictement croissante admet une dérivée strictement positive, comme le montre le contre-exemple de la fonction $x \mapsto x^3$, définie sur \mathbb{R} , strictement croissante, mais qui admet une dérivée nulle en $x = 0$.

Corollaire 4.3.12. *Si f et g sont deux fonctions dérivables définies sur un même intervalle I et telles que $f'(x) = g'(x)$ pour tout x de I , alors elles ne diffèrent que par une constante :*

$$f = g + f(a) - g(a),$$

pour tout a de I .

Démonstration. La fonction $f - g$ a une dérivée uniformément nulle, elle est donc constante. \square

4.4 Comportement asymptotique des fonctions

4.4.1 Relations de comparaison

Les trois notions suivantes permettent de comparer la taille relative de plusieurs fonctions en un point donné.

Définition 4.4.1. *Soient f et g deux fonctions définies au voisinage d'un réel a .*

- *On dit que f est dominée par g au voisinage de a si il existe une constante C telle que $|f(x)| \leq C|g(x)|$ pour tout x dans un voisinage de a .*
- *On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a si il existe une fonction ε définie au voisinage de a dont la limite en a vaut 0 et telle que $|f(x)| \leq |\varepsilon(x)g(x)|$.*
- *On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si $f - g$ est négligeable devant g .*

Les notations suivantes (appelées *notations de Landau*) peuvent s'avérer très puissantes si l'on sait les manier correctement. Il y a notamment quelques pièges à éviter.

Définition 4.4.2. Soient f et g deux fonctions définies au voisinage d'un réel a .

- Si f est négligeable devant g au point a , on notera $f(x) = o_a(g(x))$ ou " $f(x) = o(g(x))$ au voisinage de a " ou même $f(x) = o(g(x))$ tout court si il n'y a pas d'ambiguïté sur le point a .
- Si f est dominée par g au point a , on notera $f(x) = O_a(g(x))$ ou $f(x) = O(g(x))$.
- Si f est équivalent à g au point a , on notera $f(x) \sim_a g(x)$ ou $f(x) \sim g(x)$.

On notera bien que le signe "=" devant les $O(\dots)$ et $o(\dots)$ ne désigne pas une égalité! Notamment en 0 on a bien $o(x^2) = o(x)$ alors que $o(x) = o(x^2)$ est faux. En toute rigueur, il faudrait plutôt écrire $f(x) \in o(g(x))$, où l'on noterait $o(g(x))$ l'ensemble des fonctions négligeables devant g . L'exemple précédent reviendrait alors à dire que $o(x^2) \subset o(x)$ alors que $o(x) \not\subset o(x^2)$. On voit bien que les deux fonctions ne jouent pas un rôle symétrique.

L'autre danger de ces notation est qu'il ne faut pas utiliser le signe \sim comme une égalité, même si on a équivalence entre $f \sim g$ et $g \sim f$. Notamment, il faut se garder d'ajouter des équivalents. Par exemple, on a les équivalences en 0

$$\sin(x) \sim x \text{ et } \tan(x) \sim x, \quad (4.2)$$

sans toutefois avoir $\sin(x) - \tan(x) \sim 0$. En réalité, on trouve

$$\sin(x) - \tan(x) \sim -\frac{x^3}{2}.$$

Notamment, on évitera d'utiliser la notation $f(x) \sim_a 0$, qui signifie que f est nulle sur un voisinage de a . Si on doit ajouter deux quantités dont on ne connaît que des équivalents, il faut revenir à la définition : dans l'exemple (4.2) les équivalents signifient

$$\sin(x) = x + o(x) \quad \text{et} \quad \tan(x) = x + o(x).$$

On a donc

$$\sin(x) - \tan(x) = x + o(x) - x + o(-x) = o(x)$$

On pourra aussi méditer sur un exemple comme $\cos(x) \sim 1 - \frac{x^2}{2}$, qui est vrai, mais $\cos(x) \sim 1 + 666x^{42}$ est tout aussi vrai.

Propriété 4.4.3. Pour une fonction g définie sur un voisinage V de a telle que $g(x) \neq 0$ pour x dans $V \setminus \{a\}$, on a équivalence entre $f(x) \sim g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Démonstration. Si $f(x) \sim g(x)$, alors $f(x) - g(x) = \varepsilon(x)g(x)$ pour une certaine fonction tendant vers 0 quand x tend vers a . Pour $x \neq a$, on peut alors diviser cette égalité par $g(x)$ pour obtenir

$$\frac{f(x)}{g(x)} - 1 = \varepsilon(x),$$

ce qui montre bien que $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1 pour x tendant vers a .

Inversement, si l'on suppose que $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1, alors en posant $\varepsilon(x) = \frac{f(x)}{g(x)} - 1$, on a bien $f(x) = g(x) + \varepsilon(x)g(x)$ quand x tend vers a . \square

4.4.2 Développements limités

On dit qu'une fonction f définie au voisinage d'un point a admet un *développement limité* à l'ordre n en a si on peut écrire

$$f(x) = a_0 + a_1(x - a) + \dots + a_n(x - a)^n + o_a((x - a)^n).$$

En pratique on préférera se ramener, par le changement de variables $x = a + h$ à l'écriture

$$f(a + h) = a_0 + a_1h + \dots + a_nh^n + o_0(h^n),$$

qui permet de ne considérer que des développements limités en 0.

Les développements limités permettent d'approcher localement une fonction par une fonction polynôme. Nous illustrons ceci sur la figure 4.9, dans le cas de la fonction exponentielle qui admet pour développement limité

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^6).$$

On a représenté sur la figure 4.9 le graphe de fonction exponentielle à laquelle a été retranché le début de son développement limité, à savoir les fonctions e^x , $e^x - 1$, $e^x - 1 - x$, $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$, $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$ et $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{24}$. On a tracé le graphe sur un petit voisinage de 0 (à savoir $[-0.1, 0.1]$). Sur ce voisinage, la fonction se confond quasiment avec le premier terme du développement limité. Par exemple $e^x - 1 - x \simeq \frac{x^2}{2}$. Noter que l'échelle change d'un graphe au suivant.




FIGURE 4.9 – Exemple de développement limité : les graphes des fonctions e^x , $e^x - 1$, $e^x - 1 - x$, $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$, $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$ et $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{24}$.

Propriété 4.4.4. Soit f une fonction dérivable sur un voisinage de 0 dont la dérivée f' admet un développement limité à l'ordre n en 0 donné par

$$f'(x) = P_n(x) + o(x^n),$$

où P_n est un polynôme de degré n . Alors f admet un développement limité à l'ordre $n + 1$, donné par

$$f(x) = f(0) + \int_0^x P_n(y) dy + o(x^{n+1}).$$

Autrement dit, on peut intégrer terme à terme un développement limité.

Démonstration. On écrit $f'(x) = P_n(x) + x^n \varepsilon(x)$, où ε est une fonction tendant vers 0 en 0. En intégrant entre 0 et x , on trouve

$$f(x) = f(0) + \int_0^x P_n(y) dy + \int_0^x y^n \varepsilon(y) dy$$

Il reste alors simplement à écrire

$$\left| \int_0^x y^n \varepsilon(y) dy \right| \leq \sup_{y \in [-x, x]} |\varepsilon(y)| \int_0^x y^n dy = \frac{1}{n+1} \sup_{y \in [-x, x]} |\varepsilon(y)| x^{n+1}.$$

La fonction $x \mapsto \sup_{y \in [-x, x]} |\varepsilon(y)|$ tend bien vers 0 lorsque x tend vers 0. □

Propriété 4.4.5. Soit g une fonction admettant un développement limité en un point a à l'ordre n

$$g(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - a) + \dots + \alpha_n(x - a)^n + o((x - a)^n)$$

et f une fonction admettant un développement limité à l'ordre m en α_0 (remarquer que $\alpha_0 = g(a)$)

$$f(x) = \beta_0 + \beta_1(x - \alpha_0) + \dots + \beta_m(x - \alpha_0)^m + o((x - \alpha_0)^m)$$

alors la fonction $f \circ g$ admet un développement limité à l'ordre $\min(n, m)$ en a , obtenu en composant les développements limités de f et g

$$\begin{aligned} f \circ g(x) = & \beta_0 \\ & + \beta_1(\alpha_1(x - a) + \dots + \alpha_n(x - a)^n) \\ & + \dots \\ & + \beta_m(\alpha_1(x - a) + \dots + \alpha_n(x - a)^n)^m \\ & + o((x - a)^{\min(m, n)}), \end{aligned}$$

en ne gardant que les termes d'ordre inférieur ou égal à $\min(n, m)$.

Démonstration. On écrit les termes négligeables explicitement sous la forme $(x - a)^n \varepsilon_1(x - a)$ et $(x - \alpha_0)^m \varepsilon_2(x - \alpha_0)$, où $\varepsilon_1(y)$ et $\varepsilon_2(y)$ tendent vers 0 lorsque y tend vers 0. On remplace ensuite le développement de $g(x)$ dans celui de $f(x)$ et on développe. □

4.5 Développement de Taylor

Définition 4.5.1. Soit f une fonction d'un intervalle I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . On dit que f est de classe \mathcal{C}^1 si elle est dérivable et si sa dérivée est continue. De même on définit par récurrence les fonctions de classe \mathcal{C}^{k+1} comme les fonctions dérivables dont la dérivée est de classe \mathcal{C}^k . On définit également les fonctions de classe \mathcal{C}^∞ comme les fonctions qui sont de classe \mathcal{C}^k pour tout entier k .

L'ensemble des fonctions de classe \mathcal{C}^k (avec k dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$) d'un intervalle I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} est noté $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$.

On définit la dérivée n -ième d'une fonction par la relation de récurrence

$$\begin{cases} f^{(0)}(x) = f(x), \\ f^{(n+1)} = (f^{(n)})'(x) \quad \text{pour tout } n \geq 0. \end{cases}$$

Définition 4.5.2. Soit f une fonction définie sur un voisinage d'un point a . On dit que f est n fois dérivable au point a si elle est de classe \mathcal{C}^{n-1} au voisinage de a et si $f^{(n-1)}$ est dérivable en a .

Si f est n fois dérivable en tout point d'un intervalle I de \mathbb{R} , on dit qu'elle est n fois dérivable sur I .

On notera parfois $\mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe k fois dérivable d'un intervalle I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

Propriété 4.5.3. L'ensemble $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ (avec k dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$) est stable par combinaison linéaire et par produit.

Démonstration. Cela se déduit des propriétés de dérivabilité d'un produit ou d'une combinaison linéaire. \square

On veut approcher une fonction f par un polynôme. Une manière naturelle de faire au voisinage d'un point a est d'utiliser la proposition suivante :

Propriété 4.5.4. Soit f une fonction n fois dérivable sur un voisinage de $a \in \mathbb{R}$. Il existe un unique polynôme P_n de degré inférieur ou égal à n dont les dérivées en a coïncident avec celles de f . Plus précisément, pour $0 \leq k \leq n$, on a

$$f^{(k)}(a) = P_n^{(k)}(a).$$

Le polynôme P_n , appelé polynôme de Taylor d'ordre n de f , est donné par

$$P_n = f(a) + f'(a)(X - a) + \dots + f^{(n)}(a) \frac{(X - a)^n}{n!}. \quad (4.3)$$

Démonstration. L'ensemble E_n des polynôme de degré inférieur ou égal à n est un espace vectoriel de dimension $n + 1$. La famille $(\Pi_a^k)_{k=0, \dots, n}$ définie par $\Pi_a^k = \frac{(X-a)^k}{k!}$ est une base de cet espace dont la base duale $(\delta_k^a)_{k=0, \dots, n}$ est définie par $\delta_k^a(P) = P^{(k)}(a)$ (pour le prouver, il suffit de vérifier que $\delta_k^a(\Pi_q^a)$ vaut 1 si $k = q$ et 0 dans le cas contraire).

Pour toute suite $(\lambda_k)_{k=0, \dots, n}$, il existe donc un unique polynôme P de E_n tel que $\delta_k^a(P) = \lambda_k$, donné par $P = \sum_{k=1}^n \lambda_k \Pi_k^a$. En appliquant ce résultat à $\lambda_k = f^{(k)}(a)$, on obtient le résultat annoncé. \square

Une question naturelle est alors de calculer l'erreur commise en approchant $f(x)$ par la valeur $P_n(x)$ où P_n est le polynôme de Taylor défini en (4.3). Plus précisément, on cherche une expression de la quantité $f(x) - P_n(x)$, appelée *reste de Taylor*. C'est l'objet des formules de Taylor, qui sont données par les théorèmes 4.5.5, 4.5.6 et 4.5.7

Théorème 4.5.5 (Formule de Taylor avec reste intégral). *Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^{n+1} sur un voisinage du point a , alors on a, pour tout h suffisamment petit, le développement :*

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2 f''(a)}{2} + \dots + \frac{h^n f^{(n)}(a)}{n!} + \frac{1}{n!} \int_a^{a+h} (a+h-x)^n f^{(n+1)}(x) dx.$$

Le reste intégral peut aussi s'écrire, après le changement de variables $x = a + th$ comme

$$\frac{1}{n!} \int_a^{a+h} (a+h-x)^n f^{(n+1)}(x) dx = \frac{h^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n f^{(n+1)}(a+th) dt.$$

On remarquera que dans le cas $n = 0$, la formule de Taylor avec reste intégral est simplement la formule $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$ exprimant une fonction \mathcal{C}^1 comme l'intégrale de sa dérivée.

Démonstration. C'est une récurrence sur n utilisant la formule d'intégration par parties. Pour $n = 0$, l'égalité

$$f(a+h) = f(a) + \int_a^{a+h} f'(x) dx$$

exprime simplement la fonction comme l'intégrale de sa dérivée (ce qui est prouvé au chapitre 5 dans la propriété 5.2.1). En supposant vraie l'égalité au rang n , on montre l'égalité au rang $n+1$ en intégrant par parties ($f^{(n+1)}$ se dérive en $f^{(n+2)}$ et $\frac{1}{n!}(a+h-x)^n$ se primitive en $-\frac{1}{(n+1)!}(a+h-x)^{n+1}$) :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \int_a^{a+h} (a+h-x)^n f^{(n+1)}(x) dx &= \left[-\frac{1}{(n+1)!} (a+h-x)^{n+1} f^{(n+1)}(x) \right]_a^{a+h} \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^{a+h} (a+h-x)^{n+1} f^{(n+2)}(x) dx \\ &= 0 + \frac{1}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(a) \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^{a+h} (a+h-x)^{n+1} f^{(n+2)}(x) dx. \end{aligned}$$

□

On peut affaiblir l'hypothèse " f de classe \mathcal{C}^{n+1} " quitte à avoir une expression moins précise du reste.

Théorème 4.5.6 (Formule de Taylor-Lagrange). *Si f est une fonction $n+1$ fois dérivable sur un voisinage d'un point a , alors pour tout h tel que $[a, a+h]$ ^(note 5) soit inclus dans le domaine de définition de f , il existe α dans $[0, 1]$ tel que*

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2 f''(a)}{2} + \dots + \frac{h^n f^{(n)}(a)}{n!} + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a + \alpha h).$$

Notamment, si $f^{(n+1)}$ est bornée, on en déduit la majoration de l'erreur :

$$\left| f(a+h) - \left(f(a) + hf'(a) + \frac{h^2 f''(a)}{2} + \dots + \frac{h^n f^{(n)}(a)}{n!} \right) \right| \leq \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{0 \leq \alpha \leq 1} |f^{(n+1)}(a + \alpha h)|.$$

On remarquera que le cas $n = 0$ est exactement le théorème des accroissements finis.

Démonstration. On pose

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^n \frac{(1-t)^k h^k f^{(k)}(a+th)}{k!} - \lambda(1-t)^{n+1}.$$

On vérifie alors que φ est dérivable, puisque f est de classe \mathcal{C}^n et que $f^{(n)}$ est dérivable. On a $\varphi(0) = \sum_{k=0}^n \frac{h^k f^{(k)}(a)}{k!} - \lambda$ et $\varphi(1) = f(a+h)$. Le choix

$$\lambda = -f(a+h) + \sum_{k=0}^n \frac{h^k f^{(k)}(a)}{k!}$$

permet donc d'avoir $\varphi(0) = \varphi(1)$, ce qui permet d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction φ . Il existe donc un α dans $[0, 1]$ tel que

$$\varphi'(\alpha) = \frac{(1-\alpha)^n h^{n+1} f^{(n+1)}(a+\alpha h)}{n!} - (n+1)\lambda(1-\alpha)^n = 0,$$

et la définition de λ permet de conclure. \square

On peut également se passer de l'hypothèse selon laquelle $f^{(n)}$ est dérivable en cherchant une expression encore moins fine du reste.

Théorème 4.5.7 (Formule de Taylor-Young). *Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^{n-1} au voisinage d'un point a telle que $f^{(n-1)}$ soit dérivable en a , alors on a le développement :*

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2 f''(a)}{2} + \dots + \frac{h^n f^{(n)}(a)}{n!} + o(h^n).$$

Le cas $n = 0$ est simplement la définition de la continuité de f en a , et le cas $n = 1$ est la définition de la dérivabilité de f en a .

Démonstration. On le montre par récurrence.

Le cas $n = 1$ correspond à la définition de la dérivabilité de f en a .

Supposons la propriété vraie au rang n . Si la fonction f est de classe \mathcal{C}^n avec $f^{(n)}$ dérivable, alors f' est de classe \mathcal{C}^{n-1} et sa dérivée $n-1^{\text{ème}}$ est dérivable, on peut donc lui appliquer la propriété, de sorte que

$$f'(a+h) = f'(a) + hf''(a) + \frac{h^2 f'''(a)}{2} + \dots + \frac{h^n f^{(n+1)}(a)}{n!} + o(h^n).$$

Il suffit ensuite d'intégrer ce développement limité en vertu de la propriété 4.4.4. \square

Il est important de remarquer que dans chacun des théorèmes 4.5.5, 4.5.6 et 4.5.7, les hypothèses correspondent aux hypothèses "minimales" pour que la formule obtenue ait un sens. En effet :

- dans la formule de Taylor avec reste intégral, on doit pouvoir définir l'intégrale faisant intervenir la fonction f^{n+1} , on demande donc par exemple que f soit de classe \mathcal{C}^{n+1} ;

(note 5). ou $[a+h, a]$, si h est négatif.

- dans la formule de Taylor-Lagrange, $f^{(n+1)}(a + \alpha h)$ n'est définie que si f est $n + 1$ fois dérivable ;
- dans la formule de Taylor-Young, le dernier terme du développement n'a de sens que si f est dérivable en a .

De plus, dans cette série de trois théorèmes, les hypothèses sont de plus en plus faibles, ce qui fait que les conclusions sont également de plus en plus faibles.

Corollaire 4.5.8. *Une fonction n fois dérivable en un point a admet un développement limité à l'ordre n au point a .*

Quelques remarques :

- La réciproque du corollaire 4.5.8 est *fausse* ! Pour s'en convaincre, il suffit de considérer une fonction f continue mais non dérivable, vérifiant $f(0) = 0$ ^(note 6). On pose ensuite $f_n(x) = x^n f(x)$. Comme f est continue en 0 avec $f(0) = 0$, on a $f_n(x) = o(x^n)$ en 0. Cependant, si $n \geq 2$, la fonction f_n n'est dérivable qu'au point $x = 0$.
- Toutefois, une partie de la réciproque pour $n = 1$ est vraie. En effet, le développement limité à l'ordre 1, $f(x + h) = f(x) + h\lambda + o(h)$ revient exactement à la définition de la dérivabilité de f en x avec $f'(x) = \lambda$. En fait ce qui empêche de passer à n supérieur à 1 est le fait qu'un développement limité donne de l'information sur la fonction (par exemple si elle est dérivable), mais pas sur ses dérivées (par exemple il n'indique pas que la dérivée est dérivable).

4.6 Exercices

Exercice 4.1.

Calculer la dérivée $n^{\text{ème}}$ des fonctions

$$f(x) = \frac{2}{x^3 - x}, \quad g(x) = \frac{1}{x^2 + 2 \cos(\theta)x + 1}, \quad h(x) = \cos(2x)e^x \text{ et } k(x) = \sin(x)e^{2x}(x^2 - x).$$

Exercice 4.2.

Déterminer la droite asymptote en $x = \infty$ des fonction suivantes, et préciser la position de la courbe par rapport à l'asymptote :

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 2}{1 - x^2}, \quad \frac{\sqrt{x^5 + x^3 + x - 1}}{\sqrt{x^3 - x}}, \quad x^2 \ln(x) - x^2 \ln(1 + x).$$

Exercice 4.3.

Donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 des fonctions suivantes :

$$\frac{\ln(1 + x)}{\cos(x)}, \quad \sin(e^x - 1), \quad \tan(x), \quad \sqrt{\frac{\ln(1 + \sin(x))}{x}}, \quad (\cos(x))^{\sin(x)}.$$

Exercice 4.4.

Trouver de trois manières différentes le développement limité à l'ordre 5 de la fonction \tan . On pourra utiliser la définition de la fonction \tan , utiliser l'expression de sa dérivée, où encore inverser la fonction \arctan .

(note 6). On a admis l'existence de telles fonctions, voir la propriété 4.3.3

Exercice 4.5.

Donner les limites en $x = 0$ des expressions suivantes :

$$\frac{\ln(1+2x) - \sin(x)}{e^{3x} - 1}, \frac{e^x - \cos(2x)}{\tan(2x) - \sin(x)}, \frac{\sqrt{x^2 + x^3} - x - x^2/2}{\ln(1+x) - \sin(x - x^2/2)}, \frac{\cos(x)^x - 1}{\sin(x) - x} - 1, x^{\sin(x)}, \left(\frac{x}{\sin(x)}\right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

Exercice 4.6.

Montrer que la fonction $\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$ peut se prolonger par continuité en 0. Le prolongement est-il de classe \mathcal{C}^1 ?

Exercice 4.7.

Trouver la limite en $x = 0$ de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{\tan(\sin(x)) - \sin(\tan(x))}{\arctan(\arcsin(x)) - \arcsin(\arctan(x))}$$

(cet exercice peut se faire sans trop de calculs *si on s'y prend bien*).

Exercice 4.8.

Soit $\alpha > 0$ et $u_0 \neq 0$ deux réels. Montrer que la relation de récurrence

$$u_{n+1} = u_n - \frac{u_n^2 - \alpha}{2u_n} = \frac{u_n}{2} + \frac{\alpha}{2u_n}$$

définit bien une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite. Donner une majoration de $u_n - \lim_k u_k$ quand n tend vers l'infini (éventuellement en supposant $|u_0 - \lim_n u_n|$ assez petit).

Exercice 4.9.

Soit n un entier supérieur ou égal à trois. Montrer que l'équation $e^x = nx$ a deux solutions réelles $a_n < b_n$. Quel sont les comportements asymptotiques de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

Exercice 4.10.

Caractériser les fonctions continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} vérifiant l'équation fonctionnelle :

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

Et si on suppose seulement f continue en 0 ? Même question pour les équations

$$f(x+y) = f(x)f(y), \quad f(xy) = f(x) + f(y) \quad \text{et} \quad f(xy) = f(x)f(y)$$

(pour les deux dernières, on prendra f de $]0, \infty[$ dans \mathbb{R} , et on considérera le point 1 plutôt que 0).

Exercice 4.11.

Donner un exemple de fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} continue en aucun point ; en un seul point. Montrer que la fonction f de \mathbb{R} dans \mathbb{R} définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \text{ est un rationnel (écrit sous forme de fraction irréductible)} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mais en aucun point de \mathbb{Q} .

Exercice 4.12.

Soit f une fonction k -Lipschitzienne de \mathbb{R} dans \mathbb{R} avec $k < 1$.

1. On définit, pour x_0 un réel donné, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la relation de récurrence $x_{n+1} = f(x_n)$.
Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy;
2. En déduire qu'il existe un unique réel x tel que $f(x) = x$;
3. La conclusion précédente est-elle toujours valide si f va de I dans I , où I est un intervalle ouvert ? fermé ?

Exercice 4.13.

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui à x associe x^2 est continue mais pas uniformément continue. Montrer que la fonction $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ qui à x associe \sqrt{x} est uniformément continue, mais pas Lipschitzienne.

Exercice 4.14.

Montrer que si une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue, alors on peut trouver deux constantes réelles a et b telles que $|f(x)| \leq a|x| + b$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 4.15.

Montrer qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue si et seulement si il existe une fonction ω de $[0, \infty[$ dans $[0, \infty[$ telle que $\lim_{t \rightarrow 0} \omega(t) = 0$ et que pour tous réels x, y , on ait

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega(|x - y|).$$

Retrouver à partir de cela le fait que les fonctions Lipschitziennes sont uniformément continues.

Exercice 4.16.

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 \sin(\frac{1}{x})$. Est-elle dérivable ? Est-elle de classe \mathcal{C}^1 ?

Exercice 4.17.

Montrer que la fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

est de classe \mathcal{C}^∞ .

Exercice 4.18.

Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que pour tout x de $[a, b]$,

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

Exercice 4.19.

Soit f une fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} de classe \mathcal{C}^2 telle que f et f'' soient bornées. Montrer que l'on a

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| \leq 2 \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)| \right)^{\frac{1}{2}}$$

(on pourra commencer par montrer $|f'(x)| \leq h \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| + \frac{1}{h} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)|$ quels que soient $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$).

Exercice 4.20.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé (sur \mathbb{R}). Montrer que P' est également scindé sur \mathbb{R} et que ses racines sont comprises entre la plus petite et la plus grande racine de P . Montrer que si les racines de P sont distinctes, alors les racines de P' le sont aussi.

Exercice 4.21.

Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^2 de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} nulle en 0. Quelle est la limite de

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) ?$$

Et celle de

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{1}{n+k}\right) ?$$

Exercice 4.22.

Soit f une fonction dérivable en tout point de $[0, 1]$. On suppose $f'(0) < f'(1)$. Pour α un élément de $]f'(0), f'(1)[$ et $x \in [0, 1]$, on pose $g_\alpha(x) = f(x) - \alpha x$. Montrer que g_α est continue sur $[0, 1]$ et que son minimum n'est atteint ni en 0 ni en 1. En déduire que la fonction f' vérifie le théorème des valeurs intermédiaires.

Exercice 4.23.

Soit f une fonction continue de \mathbb{R} dans $[0, \infty[$ telle que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 0$. Montrer que f est majorée et atteint sa borne supérieure.

Chapitre 5

Intégration

5.1 Intégration sur un segment

Il existe plusieurs théories de l'intégration, permettant de donner un sens à l'intégrale des fonctions appartenant à une certaine catégorie de fonctions, plus ou moins vaste selon la théorie utilisée. La théorie de l'intégration que nous présenterons ici la théorie de l'intégration *au sens de Riemann*. Nous allons revenir sur la construction de cette intégrale.

La notion d'intégrale a pour objectif d'associer à une fonction f de $[a, b]$ dans \mathbb{R} un nombre, noté $\int_a^b f(x)dx$, qui correspondrait à la "taille" de cette fonction. On peut notamment penser à la surface présente sous le graphe de la fonction. Idéalement, on voudrait que cette notion ait un sens pour la plus grande classe de fonctions possibles.

On s'attend à ce que l'intégrale vérifie les propriétés "évidentes" suivantes :

(croissance) Si f et g sont deux fonctions ayant une intégrale et telles que $f \leq g$, alors

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

(linéarité) Si f et g sont deux fonctions admettant une intégrale et λ et μ sont deux réels, alors $\lambda f + \mu g$ admet une intégrale qui vaut

$$\int_a^b \lambda f(x) + \mu g(x)dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx.$$

(cas des fonctions élémentaires) Si α et β sont des éléments de $[a, b]$ avec $\alpha \leq \beta$, alors la fonction $\mathbf{1}_{(\alpha, \beta)}$ ^{(note 1), (note 2)}, a une intégrale, donnée par

$$\int_a^b \mathbf{1}_{(\alpha, \beta)} = \beta - \alpha.$$

Nous allons maintenant partir de ces trois propriétés élémentaires pour en déduire une notion d'intégrale pouvant s'appliquer à une classe plus grande de fonctions, contenant notamment toutes les fonctions continues sur $[a, b]$.

(note 1). Les parenthèses désignent des crochets ouverts ou fermés

(note 2). Pour une partie A de \mathbb{R} fonction $\mathbf{1}_A$, appelée *indicatrice* de A est définie par $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et $\mathbf{1}_A(x) = 0$ sinon.

Définition 5.1.1. — On appelle subdivision d'un segment $[a, b]$ une suite finie

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

La quantité $\max_{i=0}^{n-1} |x_{i+1} - x_i|$ s'appelle le pas de la subdivision.

— On dit qu'une fonction f définie sur un segment $[a, b]$ est en escalier si il existe une subdivision $(x_i)_{i=0, \dots, n}$ de $[a, b]$ telle que f soit constante sur l'intervalle $]x_i, x_{i+1}[$. On notera $\mathcal{E}([a, b])$ (ou simplement \mathcal{E} s'il n'y a pas d'ambiguïtés) l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$.

Une fonction en escalier est donc de la forme

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{1}_{]x_{i-1}, x_i[}(x) + \sum_{i=0}^n \mu_i \mathbf{1}_{\{x_i\}}(x),$$

avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. La propriété de linéarité permet de définir l'intégrale d'une fonction en escalier à partir des intégrales de fonctions élémentaires : en effet, on peut écrire

$$\int_a^b \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{1}_{]x_{i-1}, x_i[}(x) dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i \int_a^b \mathbf{1}_{]x_{i-1}, x_i[}(x) dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i - x_{i-1}).$$

Noter que les fonctions de la forme $\mathbf{1}_{\{c\}}$ ont une intégrale nulle, on va donc les oublier dans le reste du chapitre.

Soit f une fonction définie sur un segment $[a, b]$. On suppose que la fonction f admet une intégrale. Si v et w sont des fonctions en escalier sur $[a, b]$ telles que $v \leq f \leq w$, la propriété de croissance nous donne l'inégalité suivante, illustrée sur la figure 5.1

$$\int_a^b v(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b w(x) dx.$$




FIGURE 5.1 – Encadrement d'une fonction par des fonctions en escalier. L'aire sous la courbe est encadrée par les deux surfaces hachurées.

En passant à la borne supérieure sur toutes les fonctions v en escalier inférieures à f et à la borne inférieure sur toutes les fonctions w en escalier supérieures à f , on obtient l'encadrement

$$\sup_{v \in \mathcal{E}, v \leq f} \int_a^b v(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \inf_{w \in \mathcal{E}, f \leq w} \int_a^b w(x) dx.$$

On est donc amenés naturellement à la définition suivante :

Définition 5.1.2. On dit qu'une fonction f définie sur un segment $[a, b]$ est intégrable (au sens de Riemann, ou encore Riemann-intégrable) si les quantités $\sup_{v \in \mathcal{E}, v \leq f} \int_a^b v(x) dx$ et $\inf_{w \in \mathcal{E}, f \leq w} \int_a^b w(x) dx$ sont finies et égales. On définit alors l'intégrale de f comme la valeur commune

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{v \in \mathcal{E}, v \leq f} \int_a^b v(x) dx = \inf_{w \in \mathcal{E}, f \leq w} \int_a^b w(x) dx.$$

Le principe de cette définition est le suivant : on sait intégrer les fonctions en escalier, dont les graphes ne sont que des réunions de rectangles, la propriété de croissance de l'intégrale permet donc d'encadrer l'hypothétique intégrale d'une fonction f par les bornes inférieures et supérieures de la définition 5.1.2. Quand ces deux bornes sont égales, l'intégrale de la fonction, si elle existe, ne peut pas valoir autre chose que la valeur commune de ces deux bornes. On définit donc l'intégrale de f de cette manière.

Il existe des fonctions bornées qui ne sont pas intégrables au sens de Riemann. L'exemple le plus simple est la fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ qui vaut 1 sur l'ensemble des rationnels et 0 en dehors. Montrons que cette fonction n'est pas intégrable sur le segment $[0, 1]$ (pour fixer les idées). Tout d'abord, on a un encadrement de la fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ donné par $0 \leq \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \leq 1$ sur le segment $[0, 1]$, de sorte qu'on a les inégalités

$$\sup_{v \in \mathcal{E}, v \leq \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}} \int_0^1 v(x) dx \geq 0 \quad \text{et} \quad \inf_{w \in \mathcal{E}, \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \leq w} \int_0^1 w(x) dx \leq 1. \quad (5.1)$$

De plus, si v une fonction en escalier avec $v \leq \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, en écrivant $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{1}_{[t_{i-1}, t_i[}$, avec $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$, on voit que l'on a nécessairement $\lambda_i \leq 0$, de sorte que $\int_0^1 v(x) dx \leq 0$. En passant à la borne supérieure et en utilisant (5.1), on obtient $\sup_{v \in \mathcal{E}, v \leq \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}} \int_0^1 v(x) dx = 0$. De même, on aurait $\inf_{w \in \mathcal{E}, \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \leq w} \int_0^1 w(x) dx = 1$. Les bornes supérieures et inférieures de la définition 5.1.2 ne sont pas égales dans le cas de la fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, ce qui signifie que cette fonction n'est pas intégrable au sens de Riemann.

En utilisant le fait que les bornes inférieures et supérieures de la définition 5.1.2 peuvent être approchée à ε près pour tout $\varepsilon > 0$, on peut reformuler la définition 5.1.2 de la manière suivante :

Propriété 5.1.3. Une fonction f de $[a, b]$ dans \mathbb{R} est intégrable au sens de Riemann si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe deux fonctions v et w en escalier sur $[a, b]$ satisfaisant $u \leq f \leq w$ et

$$0 \leq \int_a^b (w(x) - u(x)) dx \leq \varepsilon. \quad (5.2)$$

On utilise également la convention suivante, de sorte que la relation de Chasles soit vérifiée :

Définition 5.1.4. Si $b \leq a$ et si f est une fonction intégrable sur $[b, a]$ on définit

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Cette convention donne la propriété suivante :

Propriété 5.1.5 (Propriété de Chasles). Si a, b et c sont trois réels et si f est fonction intégrable définie sur un segment I contenant a, b et c , alors

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

Démonstration. Supposons que $a \leq b \leq c$. On a alors,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx &= \int_a^c \mathbf{1}_{[a,b]}(x)f(x)dx + \int_a^c \mathbf{1}_{]b,c]}(x)f(x)dx \\ &= \int_a^c (\mathbf{1}_{[a,b]}(x) + \mathbf{1}_{]b,c]}(x))f(x)dx \\ &= \int_a^c f(x)dx. \end{aligned}$$

Si $a \leq c \leq b$ on fait un calcul similaire en utilisant la convention de la définition 5.1.4 et en remarquant que $\mathbf{1}_{[a,b]}(x) - \mathbf{1}_{[c,b]}(x) = \mathbf{1}_{[a,c]}(x)$. Les autres cas se traitent de manière similaire. \square

Propriété 5.1.6. Une fonction intégrable au sens de Riemann sur un segment $[a, b]$ est bornée.

Démonstration. Soit f une fonction Riemann-intégrable sur un segment $[a, b]$. Par définition, les quantités $\inf_{v \leq f} \int_a^b v(x)dx$ et $\sup_{f \leq w} \int_a^b w(x)dx$ sont finies. Notamment, l'ensemble des fonctions en escalier v et w telles que $v \leq f \leq w$ est non vide. Or, une fonction en escalier sur un segment est bornée, de sorte que $\inf v \leq f \leq \sup w$, et la fonction f est bornée. \square

Dans la pratique, on se limitera à un sous-ensemble de l'ensemble des fonctions intégrables, plus simple à caractériser, qui contient les fonctions continues. Il s'agit de l'ensemble des fonctions *continues par morceaux*, défini ci-dessous.

Définition 5.1.7. On dit qu'une fonction définie sur un segment $[a, b]$ est continue par morceaux si il existe une subdivision $(x_i)_{i=0, \dots, n}$ de $[a, b]$ telle que $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ soit continue et admette des limites en x_i^+ et en x_{i+1}^- .

Propriété 5.1.8. Toute fonction continue par morceaux sur un segment $[a, b]$ est intégrable.

Démonstration. Quitte à faire un changement de variable on peut supposer $[a, b] = [0, 1]$. On va en fait montrer qu'une fonction continue sur $[0, 1]$ est intégrable. En effet, si est f une fonction continue par morceaux relativement à la subdivision $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$, il suffit de considérer successivement chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i]$ pour se ramener à des fonctions continues.

On considère donc une fonction f continue sur le segment $[0, 1]$, et ε un réel strictement positif. Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[0, 1]$ et il existe donc un entier N tel que si $|x - y| < \frac{1}{N}$, alors $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Si on pose $x_i = \frac{i}{N}$, on a donc $0 < \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) < \varepsilon$. On définit deux fonctions en escalier v et w de la manière suivante :

$$v = \sum_{i=1}^n \left(\min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) \times \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i[} \text{ et } w = \sum_{i=1}^n \left(\max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) \times \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i[}.$$

On a alors $v \leq f \leq w$ et $\int_0^1 w(x) - v(x)dx \leq \varepsilon$. \square

Nous allons maintenant voir une manière plus explicite de calculer l'intégrale.

Définition 5.1.9. Soit f une fonction définie sur $[a, b]$, et $(x_i)_{i=0, \dots, n}$ une subdivision de $[a, b]$. On appelle somme de Riemann associée à la subdivision $(x_i)_{i=0, \dots, n}$ toute somme de la forme

$$\sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1})$$

où c_i est un élément de $[x_{i-1}, x_i]$.

On a la caractérisation suivante des fonctions intégrables.

Propriété 5.1.10. Une fonction f définie sur un segment $[a, b]$ est intégrable si et seulement si les sommes de Riemann associées aux subdivisions de $[a, b]$ convergent quand le pas de la subdivision tend vers 0.

Plus précisément f est intégrable si et seulement la proposition suivante est vraie :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x_i)_{i=0, \dots, n} \text{ subdivision}, \forall c_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

$$\left(\max_{i=1}^n |x_i - x_{i-1}| < \eta \right) \Rightarrow \left(\left| \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \lambda \right| \leq \varepsilon \right).$$

Le réel λ est alors nécessairement égal à $\int_a^b f(x)dx$.

Démonstration. Pour montrer le sens direct, on va d'abord raisonner sur les fonctions en escalier. Si u est une fonction en escalier et si $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, est une subdivision de $[a, b]$, alors

$$\left| \sum_{i=1}^n u(c_i)(x_i - x_{i-1}) - \int_a^b u(x)dx \right| \leq M \times \left(\sup_{[a,b]} u - \inf_{[a,b]} u \right) \times \max_{i=1}^n |x_i - x_{i-1}|,$$

où M est le nombre de discontinuités de la fonction u . Par conséquent, quand le pas de la subdivision tend vers 0, la quantité $\sum_{i=1}^n u(c_i)(x_i - x_{i-1})$ converge vers $\int_a^b u(x)dx$. Pour une fonction f intégrable sur $[a, b]$ quelconque, pour $\varepsilon > 0$, il existe par définition deux fonctions en escalier v et w avec $v \leq f \leq w$ et $0 \leq \int_a^b w(x) - v(x)dx \leq \varepsilon$. On a donc l'inégalité

$$\sum_{i=1}^n v(c_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n w(c_i)(x_i - x_{i-1}). \quad (5.3)$$

Comme les fonction v et w sont en escalier, le membre de droite de (5.3) converge, quand le pas de la subdivision tend vers 0, vers $\int_a^b w(x)dx$ qui est inférieur à $\int_a^b f(x)dx + \varepsilon$ et le membre de gauche vers $\int_a^b v(x)dx$ qui est supérieur à $\int_a^b f(x)dx - \varepsilon$. Ceci étant vrai pour tout ε , la quantité $\sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1})$ converge bien vers $\int_a^b f(x)dx$.

Inversement, supposons que f est une fonction définie sur $[a, b]$ telle que les sommes de Riemann convergent vers un réel λ quand le pas de la subdivision tend vers 0, et soit ε un réel positif. Considérons le réel η tel que les subdivisions de pas $< \eta$ conduisent à des sommes de Riemann valant λ à $\frac{\varepsilon}{2}$ près. Considérons alors une subdivision $(x_i)_{i=0, \dots, n}$ de pas $< \eta$, et définissons deux fonctions en escalier v et w par

$$v(x) = \sum_{i=1}^n \left(\inf_{[x_{i-1}, x_i[} f(x) \right) \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i[} \text{ et } w(x) = \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i[} f(x) \right) \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i[}$$

On a alors $v \leq f \leq w$ et

$$\begin{aligned} \int_0^1 w(x) - v(x) dx &= \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i[} f(x) - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq (\lambda + \varepsilon/2) - (\lambda - \varepsilon/2) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Par la propriété 5.1.3, cela montre que la fonction f est intégrable au sens de Riemann. \square

En pratique, la propriété 5.1.10 est surtout utilisée dans le cas où la subdivision utilisée est la subdivision uniforme $(u_i^{[a,b],n})_{i \in \{0, \dots, n\}}$ sur $[a, b]$ définie par

$$u_i^{[a,b],n} = \frac{(n-i)}{n}a + \frac{i}{n}b.$$

Le pas de cette subdivision vaut $\frac{b-a}{n}$, ce qui tend bien vers 0. On obtient donc le résultat suivant :

Corollaire 5.1.11. *Si f est une fonction Riemann intégrable sur le segment $[a, b]$, alors on a*

$$\lim_n \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{(n-i)}{n}a + \frac{i}{n}b\right) = \int_a^b f(x) dx$$

Deux inégalités utiles pour encadrer des intégrales :

Propriété 5.1.12 (Inégalité de la moyenne et inégalité triangulaire). *Si f et g sont deux fonctions intégrables sur un segment $[a, b]$, alors on a l'inégalité triangulaire*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

ainsi que l'inégalité de la moyenne

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq \sup_{[a,b]} |g| \int_a^b |f(x)| dx.$$

Démonstration. On a, par définition de la valeur absolue, $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$. La propriété de croissance de l'intégrale nous donne alors

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

ce qui donne la première inégalité.

Pour la deuxième, on remarque que

$$0 \leq |f(x)g(x)| \leq |f(x)| \sup_{[a,b]} |g|$$

et on intègre par rapport à x . \square

Propriété 5.1.13. Si f et g sont deux fonctions intégrables sur un segment $[a, b]$, alors la fonction fg est elle aussi intégrable sur $[a, b]$.

Attention : ce résultat est valide pour des fonctions intégrables sur un *segment*, mais ne le sera plus dans le cas des fonctions définies sur un intervalle quelconque.

Démonstration. En écrivant $fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$, on voit qu'il suffit de montrer que le carré d'une fonction intégrable sur $[a, b]$.

On considère donc une fonction f intégrable sur un segment $[a, b]$. Supposons tout d'abord f positive, on peut encadrer f par deux fonctions en escalier v et w telles que $0 \leq v \leq f \leq w \leq \sup f$ et telle que $\int_a^b w(x) - v(x) dx \leq \frac{\varepsilon}{\sup f}$. On a alors $v^2 \leq f^2 \leq w^2$, où les deux fonction v^2 et w^2 sont en escalier et vérifient

$$\int_a^b w^2(x) - v^2(x) dx = \int_a^b (w(x) - v(x))(w(x) + v(x)) dx \leq \sup(w - v) \frac{\varepsilon}{\sup f} \leq \varepsilon,$$

ce qui montre que f^2 est intégrable. Si maintenant f est de signe quelconque, alors comme f est bornée, il existe une constante c telle que $f + c$ soit positive. On a alors $f^2 = (f + c - c)^2 = (f + c)^2 - 2cf + c^2$. La fonction $f + c$ étant positive, on peut lui appliquer le raisonnement précédent, de sorte que $(f + c)^2$ est intégrable. De plus, $-2cf + c^2$ est intégrable, ce qui fait que f^2 est intégrable comme somme de fonctions intégrables. \square

Propriété 5.1.14 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). Si f et g sont deux fonctions intégrables sur un segment $[a, b]$, alors

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx \int_a^b |g(x)|^2 dx} \quad (5.4)$$

Dans l'inégalité (5.4), tous les termes sont bien définis en vertu de la propriété 5.1.13.

Démonstration. On considère le polynôme de degré 2 suivant :

$$\begin{aligned} P(X) &= \int_a^b (Xf(x) + g(x))^2 dx \\ &= \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right) X^2 + 2 \left(\int_a^b (x)f(x)g(x) dx \right) X + \int_a^b (x)|g(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

La première expression de P montre qu'il ne prend que des valeurs positives sur \mathbb{R} , et notamment que son discriminant est négatif. D'après la deuxième expression, ce discriminant vaut

$$\Delta = 4 \left(\int_a^b (x)f(x)g(x) dx \right)^2 - 4 \int_a^b |f(x)|^2 dx \int_a^b |g(x)|^2 dx.$$

L'inégalité $\Delta \leq 0$ correspond alors exactement à l'inégalité à démontrer. \square

On peut également définir l'intégrale de fonctions à valeurs dans \mathbb{R}^n , \mathbb{C} , \mathbb{C}^n , ou même dans un espace vectoriel réel de dimension *finie* quelconque. Il suffit pour cela de travailler coordonnée par coordonnée : on considère une fonction f à valeurs un \mathbb{R} -espace vectoriel E de dimension finie et on écrit $f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)e_i$ où $(e_i)_{i=1,\dots,n}$ est une base de E . On définit alors

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(x)dx \right) e_i \in E,$$

on est donc ramené à des intégrales de fonctions à valeurs réelles. Toutes les résultats ci-dessus restent alors vrais, pour peu que l'on remplace la valeur absolue par une norme sur E .

5.2 Lien entre intégrale et primitive

On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle I admet une *primitive* F si la fonction F est dérivable sur I et vérifie $F'(x) = f(x)$, pour tout x de I .

On a la propriété suivante :

Propriété 5.2.1. *Soit f une fonction intégrable sur un segment $[a, b]$. Soit c un point de $[a, b]$. On pose $F_c(x) = \int_c^x f(y)dy$. On a les résultats suivants :*

1. *la fonction F_c est continue ;*
2. *si f est continue en x , alors F_c est dérivable en x et vérifie $F'_c(x) = f(x)$;*
3. *si f est continue sur $[a, b]$, alors F_c est de classe \mathcal{C}^1 et est l'unique primitive de f sur $[a, b]$ qui s'annule en c . Notamment, pour tout primitive F de f , on a*

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Démonstration. 1. Comme f est intégrable sur le segment $[a, b]$, la propriété 5.1.6 montre qu'elle est bornée par une constante M . On peut alors écrire

$$|F_c(x) - F_c(y)| = \left| \int_x^y f(x)dx \right| \leq \left| \int_x^y |f(x)|dx \right| \leq \left| \int_x^y Mdx \right| = M|x - y|.$$

La fonction F_c est donc Lipschitzienne, et par conséquent continue.

2. On va montrer que le taux d'accroissement de F_c en un point x_0 où f est continue tend vers $f(x_0)$. Soit ε un réel positif, et soit η tel que

$$|x - x_0| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \left| \frac{F_c(x) - F_c(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt. \end{aligned}$$

Si $|x - x_0| \leq \eta$, pour tout t dans $[x_0, x]$ (note 3) on a $|f(t) - f(x_0)| \leq \varepsilon$, de sorte que

$$\left| \frac{F_c(x) - F_c(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x \varepsilon dt = \varepsilon.$$

Cela montre que F_c est dérivable en x_0 de dérivée $f(x_0)$.

3. Si f est continue en tout point de $[a, b]$, alors F_c est, d'après le point précédent, dérivable sur $[a, b]$ et $F'_c = f$ est une fonction continue. L'unicité de la primitive à constante près a été vue dans le corollaire 4.3.12. Enfin, si F est une primitive de f , on a, par la propriété de Chasles

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^b f(x) dx - \int_c^a f(x) dx = F_c(b) - F_c(a) = F(b) - F(a),$$

où la dernière égalité vient du fait que la fonction $F_c - F$ est constante (d'où $F_c(b) - F(b) = F_c(a) - F(a)$).

□

Corollaire 5.2.2. *Toute fonction continue admet une primitive.*

Démonstration. Si f est une fonction continue définie sur un intervalle I , alors si a est un élément de I , la fonction $x \mapsto \int_a^x f(y) dy$ est bien une primitive de f . □

On déduit de cette propriété les deux règles de calculs suivantes, très importantes pour le calcul d'intégrales.

Propriété 5.2.3 (Intégration par parties). *Si u et v sont deux fonctions de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$, on a l'égalité*

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Démonstration. La fonction uv est de classe \mathcal{C}^1 , on a donc notamment

$$u(b)v(b) - u(a)v(a) = \int_a^b (uv)'(x) dx = \int_a^b u(x)v'(x) dx + \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

□

(note 3). ou $[x, x_0]$ suivant les cas.

Propriété 5.2.4. Si φ est une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$ et si f est continue sur $\varphi([a, b])$ (note 4), alors on a

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx.$$

Un moyen mnémotechnique simple pour retrouver cette formule est d'imaginer qu'on a posé $y = \varphi(x)$, de sorte que $dy = \varphi'(x)dx$, que $f(y) = f(\varphi(x))$ et que si x varie de a à b , alors y varie de $\varphi(a)$ à $\varphi(b)$.

Démonstration. Soit F une primitive de f (une telle fonction existe, puisque f est continue). On a alors, puisque $(F \circ \varphi)'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x)$,

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = \int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx.$$

□

Dans la plupart des cas, les changements de variables utilisés sont bijectifs : φ est une fonction de classe \mathcal{C}^1 de $[a, b]$ dans $[\varphi(a), \varphi(b)]$ (note 5) et on peut alors écrire la formule de changement de variables sous la forme

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx.$$

5.3 Intégration approchée

Il est utile de pouvoir donner des valeurs approchées à une intégrale que l'on ne sait pas déterminer explicitement.

On va présenter deux méthodes simples pour ce faire. L'idée de base est que l'intégrale d'une fonction sur un segment peut être approchée par la longueur du segment multipliée par la valeur de la fonction en un point du segment. On va voir que le choix de ce point a une importance.

5.3.1 La méthode des rectangles à gauche

La méthode des rectangles à gauche consiste à utiliser l'approximation suivante :

$$\int_a^b f(x) dx \simeq (b-a)f(a). \quad (5.5)$$

On remarque que cette approximation est exacte si la fonction f est constante. Pour estimer l'erreur commise dans le calcul de cette intégrale, on va donc mesurer à quel point la fonction f est proche de la constante $f(a)$. Ceci est formulé dans le résultat suivant :

Lemme 5.3.1. Si f est une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur le segment $[a, b]$, alors on a

$$\left| \int_a^b f(x) dx - f(a)(b-a) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2} \sup_{[a,b]} |f'|.$$

(note 4). Qui est un segment, par les théorèmes 4.2.1 (valeurs intermédiaires) et 4.2.6 (de Heine).

(note 5). ou $[\varphi(b), \varphi(a)]$.

Démonstration. La formule de Taylor-Lagrange appliqué à f en a nous donne la majoration suivante :

$$|f(x) - f(a)| \leq (x - a) \sup_{[a,b]} |f'|.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - f(a)(b-a) \right| &= \left| \int_a^b (f(x) - f(a)) dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - f(a)| dx \\ &\leq \int_a^b (x-a) dx \sup_{[a,b]} |f'| \\ &= \frac{(b-a)^2}{2} \sup_{[a,b]} |f'|. \end{aligned}$$

□

En revanche, la quantité $\frac{(b-a)^2}{2} \sup_{[a,b]} |f'|$ n'a aucune raison d'être petite. Pour que l'intégrale approchée soit proche de la vraie valeur, une méthode est de subdiviser l'intervalle en N sous-intervalles plus petits, et d'appliquer la méthode des rectangles à chacun des sous-intervalles.

Plus précisément, on a le résultat :

Propriété 5.3.2. Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$. Alors on a

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2N} \sup_{[a,b]} |f'|.$$

L'approximation utilisée dans la propriété 5.3.2 est illustrée sur la figure 5.2.




FIGURE 5.2 – La méthode des rectangles à gauche pour le calcul approché d'intégrales. La surface grisée correspond à l'erreur commise.

Démonstration. En appliquant le lemme 5.3.1 à la fonction f sur l'intervalle $[a + (b-a)\frac{k}{N}, a + (b-a)\frac{k+1}{N}]$, on obtient la majoration

$$\left| \int_{a+k\frac{b-a}{N}}^{a+(k+1)\frac{b-a}{N}} f(x) dx - \frac{b-a}{N} f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2N^2} \sup_{[a,b]} |f'|.$$

En sommant de $k = 0$ à $N - 1$, on obtient

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(a + (b-a)\frac{k}{N}\right) \right| &\leq \sum_{k=0}^{N-1} \left| \int_{a+k\frac{b-a}{N}}^{a+(k+1)\frac{b-a}{N}} f(x) dx - \frac{b-a}{N} f\left(a + k\frac{b-a}{N}\right) \right| \\ &\leq N \frac{(b-a)^2}{2N^2} \sup_{[a,b]} |f'| \\ &= \frac{(b-a)^2}{2N} \sup_{[a,b]} |f'|. \end{aligned}$$

□

On peut aussi parler d'une méthode des rectangles à droite, pour laquelle les mêmes résultats sont valides, en remplaçant l'approximation (5.5) par

$$\int_a^b f(x) dx \simeq (b-a)f(b).$$

5.3.2 La méthode du point milieu

Dans cette partie, on va utiliser la même méthode qu'à la partie précédente, mais en évaluant la fonction au *milieu* de l'intervalle et non pas en son bord. Autrement dit on utilise l'approximation

$$\int_a^b f(x) dx \simeq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

On pourrait croire que l'erreur d'approximation sera sensiblement la même que pour la méthode des rectangles à gauche. On va voir qu'il n'en est rien.

La différence vient du fait que la méthode du point milieu est exacte non seulement pour les fonctions constantes, mais aussi pour les fonctions *affines*. Par conséquent, on peut estimer l'erreur commise en estimant la différence entre la fonction et une fonction affine. Graphiquement, cela vient du fait que l'erreur commise sur la première moitié de l'intervalle compense celle commise sur la deuxième moitié. Ceci se voit sur la figure 5.3. L'intégrale approchée par la méthode du point milieu correspond à l'aire situé sous la fonction en escalier, mais cette aire est égale à l'aire située sous le graphe de la fonction affine par morceaux tracée en pointillés.

Lemme 5.3.3. Soit f de classe \mathcal{C}^2 sur $[a, b]$. On a la majoration :

$$\left| \int_a^b f(x) dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \sup_{[a,b]} |f''|.$$

Démonstration. La formule de Taylor-Lagrange appliquée à f sur $[a, b]$ nous donne

$$\left| f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \leq \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \sup_{[a,b]} |f''|.$$




FIGURE 5.3 – La méthode du point milieu pour le calcul approché d'intégrales. La surface grisée correspond à l'erreur commise.

La conclusion vient du même calcul que pour le lemme 5.3.1, en utilisant les identités

$$\int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'\left(\frac{a+b}{2}\right) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

et

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{(b-a)^3}{12}.$$

□

Comme précédemment, on déduit, en subdivisant l'intervalle $[a, b]$:

Propriété 5.3.4. Soit $N \geq 1$ et f de classe \mathcal{C}^2 sur $[a, b]$. On a

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=1}^N f\left(a + \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{b-a}{N}\right) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24N^2} \sup_{[a,b]} |f''|.$$

On voit que dans le cas de la méthode du point milieu, l'erreur est de l'ordre de $\mathcal{O}(N^{-2})$, ce qui est bien meilleur que dans le cas de la méthode des rectangle, où l'erreur est en $\mathcal{O}(N^{-1})$.

5.4 Intégration sur un intervalle quelconque

On peut légitimement se poser la question de définir l'intégrale de fonctions définies sur un intervalle quelconque plutôt que de se limiter à des segment. Sur un intervalle ouvert (dont une des bornes peut désormais valoir $\pm\infty$) on peut observer différents problèmes qui ne se posaient pas sur un segment. En effet, la définition naturelle de fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque I (qui généralise notamment les fonctions continues) est la suivante, pour laquelle une fonction continue par morceaux peut très bien tendre vers $\pm\infty$ à une des bornes.

Définition 5.4.1. On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle I (non nécessairement fermé) est continue par morceaux si elle est continue par morceaux sur tout segment contenu dans I .

Ainsi, on se convaincra sans peine qu'une fonction continue par morceaux sur un intervalle ne peut pas nécessairement être encadrée par des fonctions en escalier intégrables, de sorte que sur un intervalle ouvert, on va pouvoir trouver des fonctions continues par morceaux qui ne sont pas intégrables au sens de la définition 5.1.2. Par exemple, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $]0, 1]$ ne pourra pas être majorée par une fonction en escalier sur $]0, 1]$.

On va donc considérer la définition suivante :

Définition 5.4.2. Soit f une fonction positive définie sur un intervalle I , et telle que f soit Riemann-intégrable sur chaque segment de I . On dira que f est intégrable sur I si elle vérifie une des trois propriétés équivalentes suivantes :

1. $\sup_{J \text{ segment}, J \subset I} \int_J f(x) dx < \infty$;
2. il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissant vers $\inf I$ et une suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissant vers $\sup I$ telles que $\lim_n \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx$ existe ;
3. pour toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissant vers $\inf I$ et toute suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissant vers $\sup I$, la limite $\lim_n \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx$ existe.

On appelle alors intégrale de f le nombre

$$\sup_{J \text{ segment}, J \subset I} \int_J f(x) dx = \lim_n \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx.$$

Il est à noter que les fonctions définies sur un intervalle I quelconque qui sont continues par morceaux au sens de la définition 5.4.1 sont bien intégrables au sens de Riemann sur chaque segment de I .

On peut définir de même l'intégrale d'une fonction de signe quelconque, en passant par la valeur absolue de la fonction.

Définition 5.4.3. Une fonction f de I dans \mathbb{R} est dite intégrable si $|f|$ est intégrable sur I (au sens de la définition précédente). On dit aussi que l'intégrale converge. Dans ce cas, si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites tendant respectivement vers $\inf I$ et $\sup I$, alors la limite

$$\lim_n \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx$$

existe et ne dépend pas du choix des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On définit alors

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_n \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx.$$

On peut ramener l'étude de l'intégrabilité d'une fonction sur un intervalle à l'étude de l'intégrabilité aux bornes de cet intervalle :

Propriété 5.4.4. Soit I un intervalle, soient a et b deux réels avec $\inf I < a < b < \sup I$ et f une fonction Riemann-intégrable sur tout segment de I . Alors f est intégrable sur I si et seulement si elle est intégrable sur $] \inf I, a]$ et sur $[b, \sup I[$.

Démonstration. On considère deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant respectivement vers $\inf I$ et $\sup I$. On écrit alors

$$\int_{a_n}^{b_n} |f(x)| dx = \int_{a_n}^a |f(x)| dx + \int_a^{b_n} |f(x)| dx + \int_b^{b_n} |f(x)| dx.$$

Quand n tend vers l'infini, le membre de gauche converge si et seulement si f est intégrable sur I , et le membre de droite converge si et seulement si f est intégrable sur $] \inf I, a]$ et $[b, \sup I[$. Cela montre le résultat. \square

L'inégalité triangulaire est toujours vraie pour les intégrales sur un intervalle quelconque, de même que la linéarité.

Propriété 5.4.5. *Soit f une fonction intégrable sur un intervalle I . Alors*

$$\left| \int_I f(x) dx \right| \leq \int_I |f(x)| dx.$$

Démonstration. Pour $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des suites d'éléments de I tendant respectivement vers $\inf I$ et $\sup I$, on écrit $\left| \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx \right| \leq \int_{a_n}^{b_n} |f(x)| dx$, puis on fait tendre n vers ∞ . \square

Propriété 5.4.6. *Soit I un intervalle et f et g deux fonctions intégrables sur I . Si λ et μ sont deux réels, alors $\lambda f + \mu g$ est intégrable sur I et on a*

$$\int_I \lambda f(x) + \mu g(x) dx = \lambda \int_I f(x) dx + \mu \int_I g(x) dx.$$

Démonstration. On considère $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de I tendant respectivement vers $\inf I$ et $\sup I$. On écrit $\int_{a_n}^{b_n} |\lambda f(x) + \mu g(x)| dx \leq \lambda \int_{a_n}^{b_n} |f(x)| dx + \mu \int_{a_n}^{b_n} |g(x)| dx$. En faisant tendre n vers ∞ , on voit que $\lambda f + \mu g$ est intégrable.

L'égalité des intégrales s'obtient en passant à la limite dans $\int_{a_n}^{b_n} \lambda f(x) + \mu g(x) dx = \lambda \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx + \mu \int_{a_n}^{b_n} g(x) dx$. \square

On s'intéresse maintenant au comportement asymptotique de l'intégrale d'une fonction au voisinage d'une borne de l'intervalle d'intégration. Le théorème suivant est tout à fait analogue à ce qui a été fait pour les séries.

Théorème 5.4.7. *Soient f et g deux fonctions Riemann-intégrables sur tous les segments d'un intervalle $[a, b[$ ^(note 6) avec g positive.*

— *Si g n'est pas intégrable sur $[a, b[$ et si $f(x) = o(g(x))$ (respectivement $f(x) = O(g(x))$), $f(x) \sim g(x)$ au voisinage de b alors on a*

$$\int_a^x f(t) dt = o\left(\int_a^x g(t) dt\right) \quad \left(\text{resp. } \int_a^x f(t) dt = O\left(\int_a^x g(t) dt\right), \int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt\right),$$

au voisinage de b .

(note 6). le même résultat est bien entendu vrai pour des intervalles de la forme $]a, b]$ si l'on fait les substitutions adéquates.

- Si g est intégrable sur $[a, b[$ et si $f(x) = o(g(x))$ (respectivement $f(x) = O(g(x))$), $f(x) \sim g(x)$ au voisinage de b alors f est intégrable sur $[a, b[$ et on a

$$\int_x^b f(t)dt = o\left(\int_x^b g(t)dt\right) \quad \left(\text{resp. } \int_x^b f(t)dt = O\left(\int_x^b g(t)dt\right), \int_x^b f(t)dt \sim \int_x^b g(t)dt\right),$$

au voisinage de b .

Ce théorème permet notamment d'étudier l'intégrabilité d'une fonction en se ramenant à des fonctions équivalentes dont on connaît l'intégrabilité.

Démonstration. On ne traite que le cas g non-intégrable en b et $f = o(g)$, les autres cas se traitant de manière similaire.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $f = o(g)$ au voisinage de b , il existe un élément x_0 de $[a, b[$ tel que si $x \in [x_0, b[$ alors, $|f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}g(x)$. On a donc pour $x > x_0$

$$\left|\int_a^x f(t)dt\right| \leq \left|\int_a^{x_0} f(t)dt\right| + \int_{x_0}^x |f(t)|dt \leq \left|\int_a^{x_0} f(t)dt\right| + \frac{\varepsilon}{2} \int_{x_0}^x g(t)dt \leq \left|\int_a^{x_0} f(t)dt\right| + \frac{\varepsilon}{2} \int_a^x g(t)dt.$$

Comme g n'est pas intégrable en b , $\int_a^x g(t)dt$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers b , et il existe un x_1 dans $[a, b[$ tel que si $x > x_1$, alors

$$\left|\int_a^{x_0} f(t)dt\right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_a^x g(t)dt.$$

Finalement, on a, pour $x \geq \max(x_1, x_2)$

$$\left|\int_a^x f(t)dt\right| \leq \varepsilon \int_a^x g(t)dt,$$

ce qui montre que $\int_a^x f(t)dt = o\left(\int_a^x g(t)dt\right)$. □

Beaucoup de fonctions usuelles ont un comportement équivalent à une puissance de x au voisinage des bornes d'intégration. Il est donc utile de savoir pour quelles valeurs de α la fonction $x \mapsto x^\alpha$ est intégrable sur $]0, 1]$ et sur $[1, \infty[$.

Propriété 5.4.8. Soit α un réel quelconque. Alors :

- La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est intégrable sur $]0, 1]$ si et seulement si $\alpha > -1$.
- La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est intégrable sur $[1, \infty[$ si et seulement si $\alpha < -1$.

Démonstration. Pour tout $x > 0$, on a $x^\alpha > 0$, il suffit donc d'étudier le comportement asymptotique des suites

$$\int_{1/n}^1 x^\alpha dx \quad \text{et} \quad \int_1^n x^\alpha dx.$$

On a pour $\alpha = -1$

$$\int_{1/n}^1 x^{-1} dx = [\ln(x)]_{1/n}^1 = \ln(n) \rightarrow \infty \quad \text{et} \quad \int_1^n x^{-1} dx = [\ln(x)]_1^n = \ln(n) \rightarrow \infty.$$

Par conséquent, pour $\alpha = -1$, x^α n'est intégrable ni sur $]0, 1]$ ni sur $[1, \infty[$. Pour $\alpha \neq -1$, on a

$$\int_{1/n}^1 x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_{1/n}^1 = \frac{1}{\alpha+1} - \frac{1}{(\alpha+1)n^{\alpha+1}} \quad \text{et} \quad \int_1^n x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_1^n = \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} - \frac{1}{\alpha+1}.$$

On doit donc différencier selon le signe de $\alpha + 1$. On observe alors que $\int_{1/n}^1 x^\alpha dx$ a une limite finie si et seulement si $\alpha > -1$ et que $\int_1^n x^\alpha dx$ a une limite finie si et seulement si $\alpha < -1$. \square

Les autres comportements classiques à la limite d'un intervalle sont les comportements logarithmiques et exponentiels.

Propriété 5.4.9. *Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \ln^\alpha(x)$ est intégrable sur $]0, 1]$ mais pas sur $[1, \infty[$. La fonction $e^{\lambda x}$ est intégrable sur $[0, \infty[$ si et seulement si $\lambda < 0$.*

Démonstration. On sait que $\frac{1}{x} = o(\ln^\alpha(x))$ en $+\infty$ quel que soit $\alpha \in \mathbb{R}$, par le théorème 2.4.4. Or $\frac{1}{x}$ n'est pas intégrable sur $[1, \infty[$, donc \ln^α non plus.

On sait également que $\ln^\alpha(x) = o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ en 0, quel que soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Comme, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable sur $]0, 1]$, la fonction \ln^α l'est donc aussi.

Pour la fonction exponentielle, un calcul donne, pour $\lambda \neq 0$

$$\int_0^n e^{\lambda x} dx = \left[\frac{e^{\lambda x}}{\lambda} \right]_0^n = \frac{1 - e^{\lambda n}}{\lambda}.$$

Si $\lambda > 0$ cette suite diverge, si $\lambda < 0$, elle converge vers $\frac{1}{\lambda}$. Le cas $\lambda = 0$ correspond à une fonction constante, ce qui a déjà été traité dans le cas des fonctions puissances. \square

5.5 Théorèmes de convergence

Le théorème suivant est l'outil principal pour étudier l'intégrabilité de la limite d'une suite de fonctions.

Théorème 5.5.1 (Théorème de convergence dominée). *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions intégrables au sens de Riemann sur tous les segments d'un intervalle I . On suppose que*

1. *pour tout $x \in I$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge ;*
2. *la fonction $f(x) = \lim_n f_n(x)$ est Riemann-intégrable sur les segments de I ;*
3. *il existe une fonction positive g intégrable sur I telle que*

$$|f_n(x)| \leq g(x)$$

pour tout n et tout x de I .

Alors, les f_n et f sont intégrables sur I et

$$\lim_n \int_I |f_n(x) - f(x)| dx = 0. \tag{5.6}$$

De plus, on a

$$\lim_n \int_I f_n(x) dx = \int_I f(x) dx.$$

Démonstration. Admis. Le résultat “fort” à montrer est la limite (5.6). La deuxième conclusion s’en déduit par

$$\left| \int_I f_n(x) dx - \int_I f(x) dx \right| \leq \int_I |f_n(x) - f(x)| dx \rightarrow 0.$$

□

On va démontrer une version plus faible de ce théorème, mais dont la preuve sera plus simple.

Propriété 5.5.2. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions Riemann-intégrable sur un segment $[a, b]$. On suppose que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction f Riemann-intégrable. Alors on a

$$\lim_n \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

Démonstration. On écrit

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq |b - a| \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

□

5.6 Intégrales dépendant d’un paramètre

Dans cette partie on s’intéresse aux fonctions définies comme l’intégrale d’une fonction de plusieurs variables par rapport à l’une de ses variables, plus précisément, aux fonctions F de la forme

$$F(x) = \int_I f(t, x) dt.$$

Une question naturelle est alors de trouver des critères pour assurer que ces fonctions sont continues, dérivables, etc.

On va noter (t, x) les variables de la fonction à intégrer, t désignant la variable d’intégration, qui vivra donc dans un intervalle de \mathbb{R} , et x désignant la variable par rapport à laquelle on souhaite obtenir de la régularité (c’est-à-dire de la continuité, de la dérivabilité, etc.). Cette variable vivra dans une partie de \mathbb{R}^d (par exemple).

Dans les théorèmes à suivre, on va donc faire des hypothèses d’intégrabilité sur la fonction $t \mapsto f(t, x)$, et des hypothèses de régularité sur la fonction $x \mapsto f(t, x)$.

On commence par énoncer un théorème permettant de prouver la *continuité* d’une fonction définie par une intégrale.

Théorème 5.6.1 (Théorème de continuité sous l’intégrale). Soit f une fonction définie sur $I \times \Omega$, où I est un intervalle de \mathbb{R} et Ω une partie de \mathbb{R}^d . On suppose que

1. pour tout t de I la fonction $x \mapsto f(t, x)$ est continue sur Ω ;
2. pour tout x de Ω , la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est Riemann-intégrable sur les segments de I ;
3. il existe une fonction g positive, intégrable sur I telle que $|f(t, x)| \leq g(t)$ pour tout (t, x) de $I \times \Omega$.

Alors la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est intégrable pour tout x et la fonction F définie par

$$F(x) = \int_I f(t, x) dt$$

est continue sur Ω .

Démonstration. Comme, pour tout x , la fonction $t \mapsto |f(t, x)|$ est majorée par la fonction intégrable g , la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est intégrable et la définition de F a bien un sens.

Soit x un point de Ω et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de Ω tendant vers x . On va montrer que la suite $(F(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $F(x)$, ce qui suffira à montrer que la fonction F est continue. On a $F(x_n) = \int_I f(t, x_n) dt$. Posons $\varphi_n(t) = f(t, x_n)$. D'après les hypothèses du théorème, la fonction φ_n est Riemann-intégrable sur les segments de I , la suite $(\varphi_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\varphi(t) = f(t, x)$ pour tout t , $\varphi(t)$ est Riemann-intégrable sur tout segment de I et enfin on a l'inégalité

$$|\varphi_n(t)| \leq g(t)$$

pour tout t .

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée, et on trouve

$$\lim_n F(x_n) = \lim_n \int_I \varphi_n(t) dt = \int_I \varphi(t) dt = F(x).$$

□

Passons maintenant à un théorème de *dérivabilité*.

Théorème 5.6.2 (Théorème de dérivabilité sous l'intégrale). *Soit f une fonction définie sur $I \times \Omega$, où I et Ω sont des intervalles de \mathbb{R} . On suppose que*

1. *pour tout t de I , la fonction $x \mapsto f(t, x)$ est de classe \mathcal{C}^1 sur Ω ;*
2. *pour tout x de Ω , la fonction $t \mapsto f(t, x)$ est intégrable sur I ;*
3. *pour tout x de Ω , la fonction $t \mapsto \partial_x f(t, x)$ est intégrable sur I ;*
4. *il existe une fonction g positive, intégrable sur I telle que $|\partial_x f(t, x)| \leq g(t)$ pour tout (t, x) de $I \times \Omega$.*

Alors l'expression

$$F(x) = \int_I f(t, x) dx$$

définit bien une fonction F de classe \mathcal{C}^1 et on a

$$F'(x) = \int_I \partial_x f(t, x) dt.$$

À noter :

- Remarquer que les hypothèses 1, 2 et 3 sont seulement des hypothèses servant à donner un sens aux intégrales $\int_I f(t, x) dx$ et $\int_I \partial_x f(t, x) dx$.
- Noter que pour ce théorème, on n'a pas besoin d'hypothèse de domination sur la fonction f elle-même, mais seulement sur sa dérivée partielle en x .

Démonstration. Tout d'abord, F est bien définie car $t \mapsto f(t, x)$ est supposée intégrable sur I .

Pour montrer le théorème, il suffit de montrer que pour tout x dans Ω et toute suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers 0 et telle que $x + h_n$ soit dans Ω , on a

$$\lim_n \frac{F(x + h_n) - F(x)}{h_n} = \int_I \partial_x f(x, t) dt.$$

On aura en effet montré que la fonction F est dérivable et que sa dérivée est la fonction $x \mapsto \int_I \partial_x f(t, x) dt$ qui est continue, au vu du théorème précédent.

On a

$$\frac{F(x + h_n) - F(x)}{h_n} = \frac{1}{h_n} \left(\int_I f(t, x + h_n) dt - \int_I f(t, x) dt \right) = \int_I \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} dt.$$

Posons donc $\psi_n(t) = \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n}$. La fonction ψ_n est intégrable sur I , converge simplement vers la fonction intégrable $t \mapsto \partial_x f(t, x)$ et le théorème des accroissements finis montre que

$$|\psi_n(t)| = \left| \frac{f(t, x + h_n) - f(t, x)}{h_n} \right| \leq \frac{1}{|h_n|} |h_n| \sup_{\lambda \in [0, 1]} |\partial_x f(t, x + \lambda h_n)| \leq g(t).$$

On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée, et on en déduit

$$\lim_n \frac{F(x + h_n) - F(x)}{h_n} = \int_I \partial_x f(t, x) dt,$$

ce qui achève la démonstration. □

5.7 Exercices

Exercice 5.1.

Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^a \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx, \quad \int_0^\pi \frac{\sin(x) \cos x}{1 + \cos^2 x} dx, \quad \int_0^1 \frac{3x^5 + 5x^4 + 2x^3 + 1}{x^6 + 2x^5 + x^4 + 2x + 3} dx, \quad \int_{-1}^1 (2x + 3x^2) \sqrt{1 + x^2 + x^3} dx,$$

$$\int_1^a \ln(x) dx, \quad \int_0^a \arcsin(x) dx, \quad \int_0^1 \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx, \quad \int_0^a x^2 \arctan(x) dx, \quad \int_1^2 x \ln(x) dx, \quad \int_0^a \frac{dx}{e^x + e^{-x}},$$

$$\int_0^a \frac{dx}{e^x + e^{-x} + 2}, \quad \int_0^a (x^2 + 1)e^{2x} dx, \quad \int_0^a (x^2 + 1) \cos x dx, \quad \int_{1/2}^2 \frac{\ln x}{1 + x^2} dx, \quad \int_a^b \sqrt{(b-x)(x-a)} dx.$$

Exercice 5.2.

Donner un équivalent des expressions suivantes lorsque n tend vers ∞ ($\alpha > -1$)

$$\sum_{k=1}^n k^\alpha, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k^2}, \quad \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{1/n}.$$

Exercice 5.3.

Calculer, pour $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

$$\int_0^\pi \ln(1 - 2 \cos(x)\alpha + \alpha^2) dx$$

(on pourra utiliser des sommes de Riemann et considérer la factorisation de $X^{2n} - 1$ en produits de polynômes réels irréductibles).

Exercice 5.4.

Soit f une fonction continue positive sur $[a, b]$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f(x)^n \right)^{1/n} = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

Exercice 5.5.

On considère f une fonction de classe \mathcal{C}^2 de $[0, 1]$ dans \mathbb{R} .

1. Montrer que

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) + \frac{1}{2} \int_0^1 x(x-1)f''(x) dx.$$

2. En déduire un équivalent de

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx$$

(on pourra commencer par regarder $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\frac{k}{n}) + f(\frac{k-1}{n}))$).

Exercice 5.6.

Soient f une fonction 2π -périodique continue et φ une fonction de classe \mathcal{C}^1 , 2π -périodique.

1. On définit le produit de convolution de f par φ par la formule

$$f * \varphi(x) = \int_0^{2\pi} \varphi(x-t)f(t) dt.$$

Montrer que la fonction $f * \varphi$ est 2π -périodique, de classe \mathcal{C}^1 et que $f * \varphi = \varphi * f$.

2. On suppose que φ est positive, que $\int_0^{2\pi} \varphi(t) dt = 1$, et on choisit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que si que $\varphi(t) = 0$ si $t \in [\eta, 2\pi - \eta]$, alors pour tout x de \mathbb{R}

$$|f(x) - f * \varphi(x)| \leq \varepsilon.$$

Exercice 5.7.

Pour chacune des intégrales suivantes, dire si l'intégrale est convergente, et la calculer le cas échéant.

$$\int_0^1 x^\alpha dx, \quad \int_1^\infty x^\alpha dx, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \tan(x) dx, \quad \int_0^\infty 2 \arctan(x) - \pi dx, \quad \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \cos(x)},$$

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_0^\infty e^{-x} dx, \quad \int_0^1 \ln(x) dx, \quad \int_1^\infty \ln(x) dx, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{\ln(x)}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x \ln(x)}.$$

Exercice 5.8.

1. On considère la suite (I_n) définie par la formule

$$\int_0^{\pi/2} (\sin(t))^n dt$$

(on appelle les I_n *intégrales de Wallis*).

- Donner une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2} .
- En déduire une expression générale pour I_n .
- Montrer que $I_n \sim I_{n+1}$. En déduire que

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

(on pourra considérer la suite $(I_n I_{n+1})$).

2. On considère la suite (J_n) définie par

$$J_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx.$$

- Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ est intégrable sur $[0, \infty[$.
- Montrer que J_n converge vers $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$.
- À l'aide d'un changement de variable, donner une relation entre I_n et J_n .
- En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Exercice 5.9.

On considère la fonction

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

- Montrer que $\Gamma(x)$ est bien défini pour tout $x > 0$, et que Γ est une fonction de classe \mathcal{C}^1 (\mathcal{C}^∞ , même).
- Montrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Que vaut $\Gamma(n)$ pour n entier ?

Chapitre 6

Suites et séries de fonctions

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'étude des suites de fonctions, et plus particulièrement à leur convergence : que signifie converger pour une suite de fonctions, et quelles propriétés sont conservées par les passages à la limite ?

6.1 Convergence d'une suite de fonctions

La notion la plus simple de convergence d'une suite fonctions est la notions suivante.

Définition 6.1.1. On dit qu'une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur un intervalle I de \mathbb{R} converge simplement vers une fonction f si quel que soit le réel x de I , on a la convergence $\lim_n f_n(x) = f(x)$.

Toutefois, en pratique cette notion est trop faible. Notamment, elle ne préserve pas la notion de continuité. Par exemple la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur $[0, 2]$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n & \text{si } x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

est une suite de fonctions continues, qui converge simplement vers la limite f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Cette convergence simple est illustrée sur la figure 6.1. On remarque que la fonction limite f n'est pas continue. On a donc besoin d'une notion de convergence des fonctions qui soit plus forte (c'est-à-dire plus restrictive) pour pouvoir déduire de la continuité à la limite. Cette notion est la notion de *convergence uniforme* :

Définition 6.1.2. On dit qu'une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions définies sur un intervalle I de \mathbb{R} converge uniformément vers une fonction f si

$$\limsup_n \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$




FIGURE 6.1 – Convergence simple de la suite de fonction continue $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers une fonction f non continue.

Autrement dit, une suite de fonction converge uniformément si $f_n(x)$ converge vers $f(x)$ avec une vitesse indépendante de x .

La convergence uniforme est effectivement une notion plus forte que la notion de converge simple, comme en atteste la propriété suivante.

Propriété 6.1.3. *Si une suite de fonctions converge uniformément, alors elle converge simplement.*

Démonstration. Soit x un réel de I . On a

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow_n 0.$$

□

La notion de convergence uniforme est importante en analyse car elle préserve la continuité des fonctions. Plus précisément, on a le résultat :

Propriété 6.1.4. *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues d'un intervalle I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . Si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction f , alors f est continue.*

Démonstration. Soit ε un réel positif. Par convergence uniforme, il existe un entier n tel que $\sup_I |f_n - f|$ soit inférieur à $\frac{\varepsilon}{3}$. La fonction f_n étant continue, il existe un réel $\eta > 0$ tel que si x et y sont deux éléments de I vérifiant $|x - y| \leq \eta$, alors on a $|f_n(x) - f_n(y)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$. On peut alors conclure en remarquant que si $|x - y| \leq \eta$, on a

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + 2 \sup_I |f_n - f| \\ &\leq 3 \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Propriété 6.1.5. *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de classe \mathcal{C}^1 d'un segment I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . On suppose que :*

- la suite de fonctions $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction g (qui est par conséquent continue);
- il existe un $a \in I$ tel que $f_n(a)$ converge.

Alors $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément, et sa limite f est de classe \mathcal{C}^1 et vérifie $f' = g$.

Démonstration. On écrit

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(y) dy.$$

On a alors

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &\leq |f_n(a) - f_m(a)| + \left| \int_a^x f'_n(y) - f'_m(y) dy \right| \\ &\leq |f_n(a) - f_m(a)| + |x - a| \sup_I |f'_n - f'_m| \\ &\leq |f_n(a) - f_m(a)| + \sup_{x \in I} |x - a| \sup_I |f'_n - f'_m|. \end{aligned}$$

Comme I est un segment, la quantité $\sup_{x \in I} |x - a|$ est finie. Comme la suite $(f_n(a))_{n \in \mathbb{N}}$ converge et que la suite $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I , on en déduit que

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f_m(x)| = 0, \quad (6.1)$$

autrement dit, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy quel que soit x . En conséquence, f_n converge simplement quand n tend vers l'infini vers une limite, que l'on notera $f(x)$. De plus, l'équation (6.1) implique

$$\lim_n \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

de sorte que la convergence simple de f_n vers f est en fait une convergence uniforme.

Il reste maintenant à montrer que f est une fonction dérivable de dérivée g . Pour cela, on écrit, pour $h \geq 0$ (le cas $h < 0$ étant tout à fait symétrique)

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - g(x) \right| &= \lim_n \left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - g(x) \right| \\ &= \lim_n \frac{1}{h} \left| \int_x^{x+h} f'_n(y) - g(y) dy \right| + \frac{1}{h} \left| \int_x^{x+h} g(y) - g(x) dy \right| \\ &\leq \lim_n \sup_I |f'_n(y) - g(y)| + \sup_{y \in [x, x+h]} |g(y) - g(x)| \\ &= 0 + \sup_{y \in [x, x+h]} |g(y) - g(x)|. \end{aligned}$$

Quand h tend vers 0, le terme de droite tend vers 0 en vertu de la continuité de g sur I .

Par conséquent, la quantité $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ tend bien vers $g(x)$, ce qui montre que f est dérivable de dérivée g . \square

On peut généraliser ce résultat pour des fonctions k fois dérivables :

Corollaire 6.1.6. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de classe \mathcal{C}^k d'un intervalle I de \mathbb{R} dans \mathbb{R} telle que :

- la suite de fonctions $(f_n^{(k)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction g (qui est par conséquent continue);
- pour tout q dans $\{0, \dots, k-1\}$, il existe un $a_q \in I$ tel que $(f_n^{(q)}(a_q))_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Alors la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément, sa limite f est de classe C^k , et pour tout q dans $\{1, \dots, k\}$ la suite $(f_n^{(q)})$ converge uniformément vers $f^{(q)}$.

Démonstration. Il suffit de raisonner par récurrence sur k en appliquant la propriété précédente. \square

Pour les séries, on utilise également le vocabulaire suivant :

Définition 6.1.7. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur un intervalle I . Si la série (à termes réels) $\sum \sup_{x \in I} |f_n(x)|$ converge, on dit que la série $\sum f_n$ converge normalement.

Cette notion permet en fait de rapporter la convergence uniforme d'une série de fonction à la convergence d'une suite de réels. En effet, on a l'implication :

Propriété 6.1.8. Une série de fonction qui converge normalement converge uniformément.

Démonstration. On considère une série de fonction $\sum f_n$ convergeant normalement. Pour tout x , on a

$$\sum_{n=0}^N |f_n(x)| \leq \sum_{n=0}^N \sup_I |f_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sup_I |f_n|.$$

Par conséquent, pour tout x , la série $\sum f_n(x)$ est absolument convergente, et donc convergente. On a alors la majoration, pour $x \in I$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^N f_n(x) - \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right| &= \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \sup_I |f_n|. \end{aligned}$$

En passant à la borne supérieure en x , on obtient

$$\sup_{x \in I} \left| \sum_{n=0}^N f_n(x) - \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \sup_I |f_n| \rightarrow_N 0,$$

ce qui montre que la convergence est uniforme en x . \square

6.1.1 Approximation de fonctions

Il peut souvent être utile d'approcher une fonction donnée par une autre fonction vérifiant certaines propriétés, par exemple une fonction continue, ou dérivable, ou bien encore une fonction en escalier.

Théorème 6.1.9. Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ à valeur dans \mathbb{R} et ε un réel positif.

- Il existe une fonction g continue et affine par morceaux telle que $\sup_{[a, b]} |f - g| \leq \varepsilon$.
De manière équivalente, il existe une suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions continues et affines par morceaux qui converge vers f uniformément sur $[a, b]$ (prendre pour g_n la fonction obtenue en posant $\varepsilon = \frac{1}{n}$).

- Il existe une fonction h en escalier telle que $\sup_{[a,b]} |f - h| \leq \varepsilon$.
 De manière équivalente, il existe une suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escalier qui converge vers f uniformément sur $[a, b]$ (prendre pour h_n la fonction obtenue en posant $\varepsilon = \frac{1}{n}$).

Ce résultat est illustré sur la figure 6.2.




FIGURE 6.2 – Approximation d'une fonction continue par une fonction en escalier et par une fonction affine par morceaux.

Démonstration. Pour simplifier, on supposera que $[a, b] = [0, 1]$ (on peut s'y ramener par un simple changement de variables).

La fonction f étant continue sur un segment, elle est uniformément continue par le théorème de Heine. Par conséquent, étant donné un $\varepsilon > 0$, on peut trouver un entier $n > 0$ tel que si $|x - y| \leq \frac{1}{n}$ on a $|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On prend alors comme fonction g la fonction affine par morceaux par rapport à la subdivision $0 < \frac{1}{n} < \dots < \frac{k-1}{n} < 1$, valant $f\left(\frac{k}{n}\right)$ au point $\frac{k}{n}$ pour chaque entier $k \in \{0, \dots, n\}$. Si x est un élément de $[0, 1]$, on peut noter k l'entier tel que $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right[$. On a alors :

$$|f(x) - g(x)| \leq \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| + \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - g\left(\frac{k}{n}\right) \right| + \left| g\left(\frac{k}{n}\right) - g(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + 0 + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

En effet, $|x - \frac{k}{n}| \leq \frac{1}{n}$, de sorte que $|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, et comme g est affine sur $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, on a

$$\left| g(x) - g\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \left| g\left(\frac{k}{n}\right) - g\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| = \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

On a finalement $\sup_{[0,1]} |f - g| \leq \varepsilon$.

Pour les mêmes raisons, on pourra vérifier que la fonction h prenant la valeur constante $f(\frac{k}{n})$ sur chaque intervalle de la forme $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}[$ vérifie

$$\sup_{[0,1]} |f - h| \leq \varepsilon.$$

□

On peut également approcher une fonction continue par une fonction polynomiale, ou par un polynôme trigonométrique.

Théorème 6.1.10 (Théorème de Stone-Weierstrass). — Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$, à valeurs dans \mathbb{R} et ε un réel strictement positif.

Alors, il existe un polynôme P tel que $\sup_{[a,b]} |f - P| \leq \varepsilon$.

De manière équivalente, il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes qui converge vers f uniformément sur $[a, b]$ (prendre pour P_n le polynôme obtenu en posant $\varepsilon = \frac{1}{n}$).

— Soit f une fonction continue 2π -périodique, à valeurs dans \mathbb{R} et ε un réel strictement positif.

Alors il existe un polynôme trigonométrique $q(x) = \sum_{k=-n}^n a_k e^{ikx}$ tel que $\sup_{\mathbb{R}} |f - q| \leq \varepsilon$.

De manière équivalente, il existe une suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes trigonométriques qui converge vers f uniformément sur \mathbb{R} (prendre pour q_n le polynôme trigonométrique obtenu en posant $\varepsilon = \frac{1}{n}$).

Démonstration. Admis.

□

Théorème 6.1.11. Soit f une fonction Riemann-intégrable sur un intervalle $[a, b]$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que

$$\int_a^b |f(x) - P(x)| dx \leq \varepsilon.$$

Démonstration. Quitte à faire un changement de variable, on peut se placer sur l'intervalle $[0, 1]$. Comme f est Riemann intégrable, il existe deux fonctions en escalier g et h telles que $g \leq f \leq h$ et

$$\int_0^1 h(x) dx - \int_0^1 g(x) dx \leq \varepsilon.$$

Notamment, on a

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx = \int_0^1 f(x) - g(x) dx \leq \int_0^1 h(x) - g(x) dx \leq \varepsilon.$$

On peut donc approcher aussi précisément que l'on veut une fonction Riemann-intégrable par une fonction en escalier (au sens de la distance $\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$). Il suffit donc de montrer le résultat pour une fonction f en escalier.

Une fonction en escalier étant une somme finie d'indicatrices d'intervalles, il suffit de montrer le résultat pour une indicatrice d'intervalle. On suppose donc $f = \mathbf{1}_{[\alpha, \beta]}$. Si on considère la fonction φ continue nulle hors de $[\alpha, \beta]$, valant 1 sur $[\alpha + \varepsilon, \beta - \varepsilon]$ et affine sur $[\alpha, \alpha + \varepsilon]$ et $[\beta - \varepsilon, \beta]$, alors on vérifie que $\int_0^1 |f(x) - \varphi(x)| dx = \varepsilon$.

On a donc approché f par une fonction continue. Il suffit donc de montrer le résultat pour une fonction continue.

Enfin par le théorème 6.1.10, il existe une fonction g telle que $\sup_{[0,1]} |f-g| \leq \varepsilon$. On a donc $\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \sup_{[0,1]} |f-g| \leq \varepsilon$, d'où le résultat. \square

6.2 Séries entières

Dans cette partie, on va s'intéresser à un cas particulier de série de fonctions qui généralise la notion de polynôme.

Définition 6.2.1. Une série entière est une série de la forme $\sum a_n z^n$, où $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite complexe et z est un élément de \mathbb{C} .

Le point de vue le plus naturel pour étudier les séries entières est de les considérer comme des fonctions définies sur un sous-ensemble de \mathbb{C} et à valeurs dans \mathbb{C} . La forme de l'ensemble sur lequel la série converge a une description simple, comme on va le voir dans la partie suivante.

6.2.1 Rayon de convergence

Théorème 6.2.2. Pour toute série entière $\sum a_n z^n$, il existe $R \in [0, \infty]$, appelé rayon de convergence de la série, tel que $\sum a_n z^n$ diverge si $|z| > R$ et converge si $|z| < R$.

Pour la preuve de ce résultat, on aura besoin du résultat intermédiaire suivant :

Lemme 6.2.3 (Lemme d'Abel). Si il existe un nombre complexe z_0 tel que $\sum a_n z_0^n$ converge, alors la série $\sum a_n z^n$ converge pour tout z tel que $|z| \leq |z_0|$.

Démonstration. Comme la série $\sum a_n z_0^n$ converge, son terme général tend vers 0, ce que l'on peut écrire $a_n = o(|z_0|^{-n})$. Par conséquent, si $|z| \leq |z_0|$, on a

$$|a_n z^n| = \left| a_n z_0^n \frac{z}{z_0} \right| = \underbrace{|a_n z_0^n|}_{=o(1)} \left(\frac{|z|}{|z_0|} \right)^n = o \left(\left(\frac{|z|}{|z_0|} \right)^n \right).$$

Comme $\frac{|z|}{|z_0|} < 1$, on en déduit que $|a_n z^n|$ est majoré par le terme général d'une série géométrique convergente, on l'on en déduit que $\sum a_n z^n$ converge. \square

Preuve du théorème 6.2.2. On note $\mathcal{C} = \{z \in \mathbb{C}, \sum a_n z^n \text{ converge}\}$ l'ensemble des points où la série converge. On pose alors $R = \sup\{|z|, z \in \mathcal{C}\}$. On va montrer que cette quantité vérifie bien les propriétés énoncées dans le théorème.

Si $|z| > R$ par définition de R , le point z n'est pas dans \mathcal{C} , c'est-à-dire que $\sum a_n z^n$ ne converge pas. Si $|z| < R$, il existe un élément z_0 de \mathcal{C} tel que $|z| < |z_0| \leq R$. On applique alors le lemme 6.2.3 : comme la série $\sum a_n z_0^n$ converge, on en déduit que $\sum a_n z^n$ converge, ce qui achève la preuve du théorème. \square

Les séries entières peuvent être vues comme des séries de fonctions de la variable z . On a pour l'instant montré une convergence ponctuelle. On va voir que la convergence a en fait lieu d'une manière très forte par rapport à z .

Propriété 6.2.4. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Pour tout $0 < r < R$, la série converge uniformément sur le disque $D(0, r)$.

Démonstration. Pour $z \in D(0, r)$, on a

$$\left| \sum_{n=0}^N a_n z^n - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n \right| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n z^n \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| |z|^n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r^n.$$

Ce dernier terme est le reste d'une série convergente, par conséquent, il tend vers 0. On a donc

$$\sup_{z \in D(0, r)} \left| \sum_{n=0}^N a_n z^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r^n \rightarrow_{N \rightarrow \infty} 0,$$

ce qui achève la preuve. \square

On va maintenant donner quelques moyens pratiques de calculer le rayon de convergence.

Propriété 6.2.5. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière dont les coefficients sont non nuls à partir d'un certain rang. Si la suite $\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ converge, alors sa limite est le rayon de la série.

Démonstration. Il suffit d'appliquer le critère de d'Alembert à la série $\sum a_n z^n$. En effet, on calcule le rapport

$$\frac{|a_n z^n|}{|a_{n+1} z^{n+1}|} = \frac{1}{z} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}. \quad (6.2)$$

Dans le cas où la suite $\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ converge vers une limite R , le rapport (6.2) vers une constante plus grande que 1 si $|z| > R$, et vers une constante plus petite que 1 si $|z| < R$. Le critère de d'Alembert permet de conclure que la série diverge si $|z| < R$ et converge si $|z| > R$. Par conséquent, R est bien le rayon de convergence de la série. \square

On peut en fait préciser ce résultat, quitte à obtenir un expression moins explicite.

Propriété 6.2.6. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Le rayon de convergence R de la série est donné par

$$\frac{1}{R} = \limsup_n |a_n|^{1/n}.$$

Si la limite supérieure ci-dessus est nulle, ce résultat se comprend comme $R = \infty$.

Démonstration. Notons R la quantité $(\limsup_n |a_n|^{1/n})^{-1}$ et montrons qu'il s'agit bien du rayon de convergence de la série $\sum a_n z^n$.

Soit z un nombre complexe avec $|z| < R$ et r un réel vérifiant $|z| < r < R$. On a alors

$$\limsup_n |a_n|^{1/n} = \frac{1}{R} < \frac{1}{r} < \frac{1}{|z|}.$$

Par conséquent, à partir d'un certain rang, on a l'inégalité $|a_n|^{1/n} < \frac{1}{r}$, de sorte que

$$|a_n z^n| = (|a_n|^{1/n} z)^n < \left(\frac{|z|}{r} \right)^n.$$

Comme $\frac{|z|}{r}$ est plus petit que 1, la série de terme général $\left(\frac{|z|}{r}\right)^n$ converge, et par conséquent, la série de terme général $|a_n z^n|$ converge également. On en déduit que le rayon de convergence de la série est supérieur ou égal à R .

Pour montrer l'inégalité inverse, on considère un complexe z avec $R < |z|$. Comme $\limsup_n |a_n|^{1/n} = \frac{1}{R} > \frac{1}{|z|}$, on a l'inégalité $|a_n|^{1/n} > \frac{1}{|z|}$ pour une infinité de valeurs de n , de sorte que $|a_n z^n| > 1$ pour une infinité de valeurs de n . Il s'en suit que le terme général de la série ne tend pas vers 0, et la série est divergente. \square

Considérons deux séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$. Que se passe-t-il si l'on fait, pour l'instant sans chercher à justifier les calculs, le produit de ces deux séries ? On obtient

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} a_n z^n b_m z^m = \sum_{(n,m) \in \mathbb{N}^2} a_n b_m z^{n+m} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\substack{(n,m) \in \mathbb{N}^2 \\ n+m=k}} a_n b_m z^{n+m} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^k a_n b_{k-n}\right) z^k. \end{aligned}$$

On est donc naturellement amenés à la définition suivante :

Définition 6.2.7. Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières. On appelle produit de Cauchy de ces deux séries la série $\sum c_n z^n$, où la suite c_n est donnée par

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Propriété 6.2.8. Si deux séries entières ont des rayons de convergence respectifs R_1 et R_2 , alors leur produit de Cauchy a un rayon de convergence supérieur ou égal à $R = \min(R_1, R_2)$, et sur le disque de rayon R le produit de Cauchy a pour somme le produit des deux sommes.

Démonstration. Il suffit d'appliquer la propriété 3.4.4. \square

On peut trouver des cas où le rayon de convergence du produit est strictement supérieur à chacun des deux rayons. Un exemple est donné par les deux séries

$$\frac{1+z}{1-z} = 1 + 2 \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad \text{et} \quad \frac{1-z}{1+z} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n z^n.$$

Ces deux séries ont un rayon de convergence de 1, en revanche, on peut vérifier que leur produit de Cauchy vaut 1, qui a donc pour rayon de convergence ∞ . Cela se comprend sur le calcul $\frac{1-z}{1+z} \times \frac{1+z}{1-z} = 1$.

On a de même les propriétés suivantes :

Propriété 6.2.9. Si deux séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ ont des rayons de convergence respectifs R_1 et R_2 , alors leur somme $\sum (a_n + b_n) z^n$ a un rayon de convergence supérieur ou égal à $\min(R_1, R_2)$.

Démonstration. C'est une réécriture du fait que la somme de deux séries convergente est convergente. \square

De même, dans certains cas, le rayon peut être strictement supérieur à R_1 et R_2 . Par exemple, la somme des deux séries $\sum z^n$ et $\sum -z^n$ est nulle et a donc un rayon de convergence infini, alors que les deux séries ont un rayon de convergence de 1.

À partir d'une série entière, on peut définir, au moins formellement, une série "dérivée" et une série "primitive" :

Lemme 6.2.10. *Si une série entière $s(z) = \sum a_n z^n$ a un rayon de convergence de R , alors sa série dérivée $s'(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} n a_n z^{n-1}$ et sa série primitive $S(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$ ont également pour rayon de convergence R .*

Démonstration. Il suffit d'appliquer la formule $R = (\limsup_n |a_n|^{1/n})^{-1}$. En effet, les inverses des rayons de convergence de la série dérivée et de la série primitive sont donnés respectivement par

$$\limsup_n |(n+1)a_{n+1}|^{1/n} \quad \text{et} \quad \limsup_n |a_{n-1}/n|^{1/n}.$$

Or $(n+1)^{1/n} = e^{\ln(n)/n}$ tend vers 1, ce qui fait que ces deux quantités sont égales à $\limsup_n |a_n|^{1/n}$. \square

Il est à noter que l'on a pas défini de notion dérivation et de primitivation pour les fonctions définies sur \mathbb{C} . Par conséquent, les notations S et s' ne sont que des *analogues* aux notions de dérivation et de primitivation. On peut toutefois considérer les restrictions à \mathbb{R} des fonctions définies par des séries entières, qui deviennent des fonctions de la variable réelle. Les fonctions ainsi obtenues sont en fait très régulières.

Propriété 6.2.11. *Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . En posant $\varphi(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$, on définit une fonction de $] -R, R[$ dans \mathbb{C} qui est de classe \mathcal{C}^∞ . De plus, la dérivée $k^{\text{ème}}$ s'obtient en dérivant terme à terme :*

$$\varphi^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) x^{n-k}.$$

Démonstration. Pour tout N , la fonction φ_N définie par $\varphi_N(x) = \sum_{n=1}^N a_n x^n$ est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} , puisqu'il s'agit d'un polynôme. De plus, sa dérivée $k^{\text{ème}}$ est donnée par

$$\varphi^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^N a_n n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) x^{n-k}.$$

qui est une la somme partielle d'une série entière de rayon de convergence R , d'après le lemme 6.2.10. Cette dernière série converge donc uniformément sur tout segment $[-r, r]$ avec $r < R$. Par conséquent, toutes les dérivées de la suite $(\varphi_N)_{N \in \mathbb{N}}$ convergent uniformément vers les dérivées de φ sur $[-r, r]$. On en déduit par le corollaire 6.1.6 que φ est de classe \mathcal{C}^∞ sur $[-r, r]$ pour tout $r < R$, et par conséquent sur $] -R, R[$. \square

On remarquera que divers comportements sont possibles sur le cercle de convergence. Par exemple, la série $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ a pour rayon de convergence 1 mais la série ne converge en aucun point du cercle $|z| = 1$ (en effet si $|z| = 1$, le terme général ne tend pas vers 0). À l'opposé, la série $\sum \frac{z^n}{n^2}$ a également un rayon de convergence nul, mais cette fois-ci la série converge pour *tous* les complexes de module 1 (puisque alors $|\frac{z^n}{n^2}| = n^{-2}$ qui est le terme général d'une série convergente). On peut également trouver des situations intermédiaires : la série $\sum \frac{z^n}{n}$, de rayon 1 converge en tout les points du cercle unité sauf en $z = 1$ (voir le corollaire 3.3.4).

6.2.2 Quelles fonctions peuvent se représenter comme des séries entières ?

Définition 6.2.12. On dit qu'une fonction f est développable en série entière sur un intervalle $]\alpha, \beta[$ si pour tout a de $]\alpha, \beta[$, il existe un voisinage V de a tel que pour tout x de V , on ait $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$.

Une question naturelle est de caractériser les fonctions développable en série entière. Une première remarque est que les séries entières définissent des fonctions de classe \mathcal{C}^∞ . Par conséquent, une fonction développable en série entière est nécessairement de classe \mathcal{C}^∞ .

Inversement, soit f une fonction de classe \mathcal{C}^∞ sur un intervalle $]\alpha, \beta[$. On se demande si f est développable en série entière. Si c'était le cas, on aurait, sur un voisinage de tout point a de $]\alpha, \beta[$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n,$$

et les dérivées successives de f seraient données par

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n(x - a)^{n-k},$$

Par conséquent, en évaluant l'expression précédente en $x = a$, on aurait $f^{(k)}(a) = k!a_k$. Autrement dit, le seul développement possible pour f est alors

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

Ce développement correspond au développement de Taylor en a de la fonction f au point a , avec une infinité de termes.

Par conséquent, une fonction de classe \mathcal{C}^∞ sera développable en série entière quand sa série de Taylor converge et est égale à la fonction. On peut donc trouver des fonctions de classes \mathcal{C}^∞ qui ne sont pas développables en série entière en se plaçant dans un des deux cas suivants :

- Le développement de Taylor de la fonction correspond à une série entière de rayon nul. Par exemple, étant donné une suite de réels quelconques $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, il est possible de construire une fonction de classe \mathcal{C}^∞ dont la dérivée $n^{\text{ième}}$ en 0 est donnée par a_n (nous ne détaillerons pas la construction). Si f est la fonction ainsi associée à la suite $((n!)^2)_{n \in \mathbb{N}}$, la série de Taylor de f est $\sum_{n=0}^{\infty} n!z^n$, qui a un rayon de convergence nul.
- La série de Taylor a un rayon de convergence strictement positif, mais la somme de la série diffère de la fonction f . Par exemple, la fonction $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ est de classe \mathcal{C}^∞ et toutes ses dérivées sont nulles en zéro (exercice!). Sa série de Taylor en 0 est donc la série nulle, qui a un rayon de convergence infini, mais qui ne coïncide pas avec f .

En fait on peut caractériser les fonctions développables en série entière de la manière suivante :

Propriété 6.2.13. Une fonction $f :]-r, r[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ est développable en série entière sur $]-r, r[$ si et seulement la proposition

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]-r, r[, |f^{(n)}(x)| \leq \frac{Mn!}{r^n}$$

est vérifiée.

Démonstration. Admis. □

6.3 Séries de Fourier

On appelle *série trigonométrique* une série de la forme

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{int}. \quad (6.3)$$

On remarque que si une série trigonométrique définit une fonction de t (c'est-à-dire si la série converge quel que soit t), alors cette fonction est nécessairement 2π -périodique. La théorie des séries de Fourier tente de répondre à la question inverse : une fonction 2π -périodique peut-elle toujours être représentée par une série de Fourier ?

Observons le calcul non justifié suivant :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} e^{-ikt} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{int} dt &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_0^{2\pi} e^{i(n-k)t} dt \\ &= c_k \int_0^{2\pi} dt + \sum_{n \neq k} c_n \int_0^{2\pi} e^{i(n-k)t} dt \\ &= 2\pi c_k + \sum_{n \neq k} c_n \left[\frac{e^{i(n-k)t}}{i(n-k)} \right]_0^{2\pi} \\ &= 2\pi c_k + 0. \end{aligned} \quad (6.4)$$

On remarque que si une série trigonométrique définit effectivement une fonction, et si tous les calculs précédent sont justifiés, alors l'équation (6.4) montre que les coefficients c_n peuvent être calculés par intégration à partir de la fonction. On est donc amenés à la définition suivante.

Définition 6.3.1. Soit f une fonction 2π -périodique et Riemann-intégrable sur $[0, 2\pi]$. On appelle série de Fourier associée à f la série trigonométrique $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{int}$, où $c_n(f)$ est défini par

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

On remarquera que le calcul précédent peut être mené sur n'importe quel intervalle de largeur 2π :

Propriété 6.3.2. Pour une fonction f 2π -périodique et Riemann-intégrable sur $[0, 2\pi]$, la valeur de l'intégrale $\int_{x_0}^{x_0+2\pi} f(t)dt$ ne dépend pas de x_0 .

Démonstration. On va montrer que l'intégrale sur $[x_0, x_0 + 2\pi]$ est égale à l'intégrale sur $[0, 2\pi]$, ce qui suffit pour démontrer la propriété. Pour cela, on écrit

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0+2\pi} f(t)dt &= \int_{x_0}^0 f(t)dt + \int_0^{2\pi} f(t)dt + \int_{2\pi}^{x_0+2\pi} f(t)dt \\ &= \int_{x_0}^0 f(t)dt + \int_0^{2\pi} f(t)dt + \int_0^{x_0} f(s+2\pi)ds \\ &= \int_0^{2\pi} f(t)dt \end{aligned}$$

où la deuxième égalité a été obtenue à l'aide du changement de variable $t = s + 2\pi$. \square

On remarquera que tout les théorème que nous présenterons resteront valides pour des fonctions T -périodique, pour un T arbitraire. Pour se ramener au cas $T = 2\pi$, il suffira de faire le changement de variables $s = t \times \frac{2\pi}{T}$.

6.3.1 Le cas des séries réelles

On peut remarquer que même si f est à valeurs réelles, la série (6.3) est une série à termes complexes. Or, si on cherche à développer en série de Fourier une fonction à valeurs dans \mathbb{R} , il est naturel de vouloir une série à termes réels. Cela peut se faire en remplaçant les exponentielles complexes par des sinus et cosinus. Plus précisément, on écrit

$$\begin{aligned} c_n(f)e^{int} + c_{-n}(f)e^{-int} &= c_n(f)(\cos(nt) + i\sin(nt)) + c_{-n}(f)(\cos(nt) - i\sin(nt)) \\ &= a_n(f)\cos(nt) + b_n(f)\sin(nt), \end{aligned}$$

où l'on a posé

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f) \quad \text{et} \quad b_n(f) = i(c_n(f) - c_{-n}(f)).$$

On peut calculer directement les coefficients a_n et b_n comme intégrales de la fonction f .

$$\begin{cases} a_n(f) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad \text{pour } n \geq 0, \\ b_n(f) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt, \quad \text{pour } n \geq 1. \end{cases} \quad (6.5)$$

Avec ces notations, la série de Fourier de f peut se récrire (pour l'instant formellement) comme

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f)e^{inx} = \frac{1}{2}a_0(f) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(f)\cos(nt) + b_n(f)\sin(nt). \quad (6.6)$$

Certaines conventions utilisent plutôt le coefficient $\tilde{a}_0(f)$ défini par

$$\tilde{a}_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)dt.$$

La définition est alors moins symétrique, mais l'expression (6.6) se réécrit alors

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx} = \tilde{a}_0(f) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(f) \cos(nt) + b_n(f) \sin(nt),$$

et on n'a plus de facteur $\frac{1}{2}$ devant le terme constant. On remarquera qu'il n'y a pas de coefficient $b_0(f)$. Ces particularités viennent du fait que pour $n = 0$, les coefficients $c_n(f)$ et $c_{-n}(f)$ sont confondus.

Dans la suite, on ne parlera plus que des séries d'exponentielles complexes du type (6.3). Tous les théorèmes énoncés seront encore valides pour une série de sinus et cosinus : en effet, le passage d'un type de série à l'autre est un simple changement d'écriture, qui ne modifie pas fondamentalement le comportement de la série.

On pourra remarquer que la parité d'une fonction se traduit sur les coefficients de Fourier. Plus précisément :

Propriété 6.3.3. *Soit f une fonction 2π -périodique et Riemann-intégrable sur $[0, 2\pi]$.*

- *Si f est une fonction paire, alors $c_n(f) = c_{-n}(f)$, ce qui s'écrit également $b_n(f) = 0$.*
- *Si f est une fonction impaire, alors $c_n(f) = -c_{-n}(f)$, ce qui s'écrit encore $a_n(f) = 0$.*
- *Si f est une fonction réelle, alors $c_n(f) = \overline{c_{-n}(f)}$, ce qui se revient à dire que les $a_n(f)$ et les $b_n(f)$ sont réels.*
- *Si f est une fonction imaginaire pure, alors $c_n(f) = -\overline{c_{-n}(f)}$, et les $a_n(f)$ et les $b_n(f)$ sont imaginaires purs.*

Démonstration. Si f est paire, on a $c_n(f(t)) = c_n(f(-t))$. On remarque alors, en faisant le changement de variables $s = -t$, que

$$c_n(f(-t)) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(-t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(s) e^{int} dt = c_{-n}(f).$$

Les autres égalités se traitent de façon similaire. □

6.3.2 Séries de Fourier et dérivabilité

Propriété 6.3.4. *Si f est une fonction 2π -périodique de classe \mathcal{C}^1 , alors on a l'équation*

$$c_n(f') = inc_n(f).$$

Le résultat reste vrai si f est seulement de classe \mathcal{C}^1 par morceaux et continue.

Démonstration. Il s'agit d'une simple intégration par parties :

$$\int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \left[\frac{f(t) e^{-int}}{-in} \right]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} f'(t) \frac{e^{-int}}{in} dt = \int_0^{2\pi} f'(t) \frac{e^{-int}}{in} dt.$$

Les termes de bords s'annulent à cause de la 2π -périodicité.

Pour le cas d'une fonction \mathcal{C}^1 par morceaux et continue, on subdivise $[0, 2\pi]$ en intervalles où la fonction est de classe \mathcal{C}^1 . □

Cette formule est la raison historique pour laquelle les séries de Fourier ont été introduites. En effet, la motivation initiale de Fourier était de résoudre l'équation décrivant l'évolution de la température d'un solide, connue aujourd'hui sous le nom d'*équation de la chaleur*. Cette équation est donnée par

$$\partial_t f(t, x) = \partial_x \partial_x f(t, x),$$

où $f(t, x)$ est la température du solide au point x et à l'instant t et ∂_x et ∂_t désigne la dérivation par rapport à t et x respectivement. Si on suppose que la température est 2π -périodique, on peut développer en série de Fourier la fonction $x \mapsto f(t, x)$, pour tout t fixé. En notant $c_n(t)$ les coefficients de Fourier correspondants, on obtient, grâce à la propriété 6.3.4, l'équation

$$c'_n(t) = -n^2 c_n(t),$$

où l'on sait résoudre explicitement. En résumé, l'équation de la chaleur prend une forme très simple quand on regarde les coefficients de Fourier, ce qui a permis d'étudier ses solutions.

On peut donner une réciproque partielle à la propriété 6.3.4, c'est-à-dire une condition suffisante sur les coefficients de Fourier pour que la fonction soit de classe \mathcal{C}^1 .

Propriété 6.3.5. *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} nu_n$ soit absolument convergente. Alors la série de Fourier $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e^{int}$ définit une fonction 2π -périodique de classe \mathcal{C}^1 .*

Démonstration. Comme $|u_n| \leq |nu_n|$ dès que $n \neq 0$, la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e^{inx}$ est elle aussi absolument convergente. Les sommes partielles de cette série sont des fonctions de classe \mathcal{C}^1 , dont les dérivées sont les sommes partielles de la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} inu_n e^{inx}$, qui est absolument convergente. Il suffit ensuite d'appliquer les propriétés 6.1.5 et 6.3.10 pour conclure. \square

Par récurrence, on déduit de la propriété 6.3.5 le corollaire suivant :

Corollaire 6.3.6. *Si la suite u_n vérifie $u_n = o(n^{-k})$ pour tout entier k , alors la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e^{inx}$ définit une fonction de classe \mathcal{C}^∞ .*

6.3.3 Structure Hilbertienne

La décomposition en séries de Fourier a une interprétation géométrique dans l'espace de dimension infinie des fonctions de carrés intégrables.

Propriété 6.3.7. *Si $n \neq m$, alors*

$$\int_0^{2\pi} e^{int} e^{-imt} dt = 0.$$

Si $n = m$, alors

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{int} e^{-int} dt = 1.$$

Autrement dit, la famille $(e^{int})_{n \in \mathbb{Z}}$ constitue une famille orthonormée pour le produit scalaire défini par

$$\langle f, g \rangle \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Avec ce point de vue, on a alors

$$c_n(f) = \langle f, e^{int} \rangle,$$

et l'approximation d'une fonction par sa série de Fourier devient alors très naturelle : en effet, si on veut approcher une fonction donnée par un polynôme trigonométrique, une façon de faire est de prendre son projeté orthogonal sur l'espace des polynômes trigonométriques de degré $\leq N$. Ce projeté orthogonal est donné par

$$S_N(f)(t) = \sum_{n=-N}^N \langle f, e^{int} \rangle e^{int} = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int},$$

et on retrouve les sommes partielles de la série de Fourier de f .

On a équivalence entre l'intégrabilité du carré d'une fonction et la sommabilité des carrés de ses coefficients de Fourier :

Théorème 6.3.8. *Pour une fonction 2π -périodique Riemann-intégrable sur $[0, 2\pi]$, les séries*

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n(f)|^2 \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |b_n(f)|^2$$

sont convergentes. De plus, on a l'égalité de Bessel-Parseval

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \frac{|a_0(f)|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n(f)|^2 + |b_n(f)|^2.$$

Enfin, la fonction f peut être vue comme la somme de sa série de Fourier au sens suivant :

$$\lim_{N, M \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left| f(t) - \sum_{n=-N}^M c_n(f) e^{int} \right|^2 dt = 0. \quad (6.7)$$

L'égalité de Bessel-Parseval est un équivalent infini-dimensionnel du théorème de Pythagore.

Selon l'égalité (6.7), une fonction Riemann-intégrable est égale à la somme de sa série de Fourier en un certain sens. Toutefois, le fait que la limite (6.7) soit nulle n'implique pas que, pour un t donné la série réelle $\sum_n c_n(f) e^{int}$ converge, ni que sa somme vaille $f(t)$.

Démonstration. On a l'inégalité

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| f(t) - \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int} \right|^2 dt & (6.8) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int} \right|^2 dt \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N c_n(f) \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} e^{int} dt - \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-N}^N \overline{c_n(f)} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int} \right|^2 dt - 2 \sum_{n=-N}^N |c_n(f)|^2. \end{aligned}$$

De plus, en utilisant la propriété 6.3.7, on obtient en développant

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int} \right|^2 dt = \sum_{n=-N}^N |c_n(f)|^2.$$

Finalement, l'inégalité (6.8) se réécrit

$$\sum_{n=-N}^N |c_n(f)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt.$$

La série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$ est donc une série à termes positifs dont les sommes partielles sont majorées : cette série converge. La définition de $a_n(f)$ et $b_n(f)$ montre alors que les deux séries $\sum_{n \geq 1} |a_n(f)|^2$ et $\sum_{n \geq 1} |b_n(f)|^2$ convergent aussi.

Les autres assertions sont une conséquence du fait (admis) que pour toute fonction 2π -périodique Riemann-intégrable sur $[0, 2\pi]$ et tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver un polynôme trigonométrique q tel que :

$$\int_0^{2\pi} |f(t) - q(t)|^2 dt \leq \varepsilon.$$

□

Une conséquence de ce théorème est qu'une fonction est caractérisée par ses coefficients de Fourier.

Corollaire 6.3.9. *Soit f et g deux fonctions 2π -périodiques et Riemann-intégrables sur $[0, 2\pi]$. Si pour tout n , on a $c_n(f) = c_n(g)$, alors sont égales "presque partout", au sens où on a l'égalité*

$$\int_0^{2\pi} |f(t) - g(t)|^2 dt = 0. \quad (6.9)$$

Notamment, si f et g sont continues par morceaux, on a $f(t) = g(t)$ sauf éventuellement en un nombre fini de points (les points de discontinuité de f ou g).

Démonstration. Par hypothèse, les coefficients de Fourier de la fonction $f - g$ sont nuls, de sorte que l'égalité de Bessel-Parceval appliquée à la fonction $f - g$ prend la forme (6.9). Dans le cas où f et g sont continues par morceaux, la fonction $|f - g|^2$ est une fonction positive continue par morceaux et d'intégrale nulle, de sorte que $f(t) - g(t)$ est nulle sauf éventuellement aux discontinuités de f ou de g . □

6.3.4 Convergence normale

Propriété 6.3.10. *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ une suite telle que la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |u_n|$ soit convergente. Alors, la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e^{int}$ converge uniformément vers une fonction f continue dont les coefficients de Fourier sont donnés par*

$$c_n(f) = u_n.$$

Démonstration. L'hypothèse faite sur les coefficients de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ font que la série $\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n e^{int}$ est une série normalement convergente. Par conséquent, elle converge uniformément, et les termes de la série étant des fonctions continues, sa somme est une fonction continue.

Il reste à montrer que les coefficients de Fourier de f sont les c_n . Pour cela, on remarque que dans ce cas, le calcul (6.4) est justifié : en effet, comme la série converge uniformément, on peut intervertir la somme infinie et l'intégrale. Le reste du calcul est direct. \square

Théorème 6.3.11. *Si f est une fonction 2π -périodique de classe \mathcal{C}^1 par morceaux et continue, alors la suite de fonctions*

$$S_N(f) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int}$$

converge uniformément vers \tilde{f} sur \mathbb{R} (ou, de manière équivalente, sur $[0, 2\pi]$).

Démonstration. On va montrer que la proposition précédente s'applique. Les hypothèses faites sur la fonction permettent d'appliquer la proposition 6.3.4, et on obtient en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)| = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left| \frac{1}{n} c_n(f') \right| \leq \sqrt{\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2}} \sqrt{\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f')|^2} < \infty.$$

La somme $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f')|^2$ est finie en vertu du théorème 6.3.8, puisque la fonction f' est continue par morceaux. \square

Un exemple de convergence uniforme est donné sur la figure 6.3, dans le cas de la fonction $x \mapsto (5 - 4 \cos(x))^{-1}$ dont le développement en série de Fourier est donné par

$$\frac{1}{5 - 4 \cos(x)} = \frac{1}{3} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{e^{inx}}{2^{|n|}},$$

ce qui correspond bien à une convergence uniforme.

6.3.5 Convergence simple

On définit, pour une fonction continue par morceaux f donnée, la fonction \tilde{f} suivante :

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } f \text{ est continue en } t \\ \frac{f(t-) + f(t+)}{2} & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $f(t+)$ et $f(t-)$ désignent les limites respectivement à droite et à gauche de f en t . Cette fonction est introduite en vue du résultat suivant :

Théorème 6.3.12 (Dirichlet). *Si f est une fonction 2π -périodique de classe \mathcal{C}^1 par morceaux, alors la suite de fonctions*

$$S_N(f) = \sum_{n=-N}^N c_n(f) e^{int}$$

converge simplement vers \tilde{f} sur \mathbb{R} (ou, de manière équivalente, sur $[0, 2\pi]$).




FIGURE 6.3 – Convergence de $\frac{1}{3} \sum_{n=-N}^N \frac{e^{inx}}{2^{|n|}}$ vers $(5 - 4 \cos(x))^{-1}$. On a tracé les sommes partielles de la série pour $N = 1$, $N = 3$ et $N = 5$.

La différence entre le théorème 6.3.11 et le théorème 6.3.12, est que dans ce dernier, on ne suppose pas que la fonction soit continue. Noter qu'une fonction peut très bien être \mathcal{C}^1 par morceaux sans être continue/

On prêtera bien attention au fait qu'il faut effectuer la somme de façon symétrique (de $-N$ à N). En effet il existe des fonctions vérifiant les conditions du théorème 6.3.12 telle que les deux séries

$$\sum_{n=0}^N c_n(f) e^{int} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^N c_{-n}(f) e^{-int}$$

divergent en certains points. La convergence des suites de $-N$ à N correspond alors à un phénomène de compensation. Autrement dit, la série est convergente, mais pas forcément absolument convergente, de sorte que la limite peut dépendre de l'ordre de sommation. Par exemple, considérons la fonction f 2π -périodique définie par $f(t) = \pi - t$ si $t \in]0, 2\pi[$ et $f(0) = 0$. On peut vérifier que le développement en série de Fourier de f est donné par

$$\sum_{n \neq 0} \frac{e^{int}}{in}.$$

On remarque que les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{int}}{in}$ et $\sum_{n \leq -1} \frac{e^{int}}{in}$ divergent en $t = 0$, alors que le théorème 6.3.12 assure que $\sum_{n=1}^N \frac{e^{int}}{in} + \frac{e^{-int}}{-in}$ converge vers $f(t)$ quand N tend vers $+\infty$. Cette dernière convergence est illustrée sur la figure 6.4.

Pour faire la preuve du théorème de Dirichlet, on va avoir besoin de la notion suivante :

Définition 6.3.13. Si f et g sont deux fonctions 2π -périodiques et Riemann-intégrables sur $[0, 2\pi]$, on définit leur produit de convolution $f * g$ par la formule

$$f * g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(s)g(t-s)ds.$$




FIGURE 6.4 – Convergence simple de $\sum_{n=1}^N \frac{e^{int} - e^{-int}}{in} = \sum_{n=1}^N \frac{2 \sin(int)}{n}$ vers la périodisée de $\pi - t$ (on a affiché la somme de la série de Fourier pour $N = 1$, $N = 4$ et $N = 20$).

On remarquera que pour tout t , la fonction $s \mapsto f(s)g(t-s)$ est Riemann-intégrable par la propriété 5.1.13, de sorte que l'intégrale définissant $f * g$ a bien un sens.

Propriété 6.3.14. *Le produit de convolution est une application bilinéaire et commutatif : si f , g et h sont trois fonctions 2π -périodiques et Riemann-intégrables sur $[0, 2\pi]$, et si λ et μ sont deux réels, alors on a les relations*

$$f * g = g * f \quad \text{et} \quad (\lambda f + \mu g) * h = \lambda(f * h) + \mu(g * h).$$

Démonstration. La bilinéarité vient de la linéarité de l'intégrale, la commutativité s'obtient par le changement de variables $u = t - s$ dans la définition du produit de convolution. \square

L'intérêt de cette notion dans le cadre des séries de Fourier vient du fait que la somme partielle de la série de Fourier peut s'exprimer comme un produit de convolution, comme expliqué dans la proposition suivante.

Propriété 6.3.15. *Soit f une fonction 2π -périodique et Riemann-intégrable sur $[0, 2]$ On a les égalités*

$$c_n(f)e^{int} = e^{int} * f, \quad S_N(f)(t) = \left(\sum_{n=-N}^N e^{int} \right) * f.$$

Démonstration. La première égalité est un simple calcul. La deuxième s'obtient à partir de la première grâce à la linéarité du produit de convolution. \square

La propriété 6.3.15 montre que le comportement asymptotique d'une série de Fourier va être relié au comportement de la suite de fonctions $(D_N)_{N \in \mathbb{N}}$ appelée *noyau de Dirichlet*, définie par

$$D_N(t) = \sum_{n=-N}^N e^{int}.$$

Propriété 6.3.16. *On a l'expression*

$$D_N(t) = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}. \quad (6.10)$$

On remarquera que D_N est une fonction π -périodique.

On remarquera que l'expression (6.10) se prolonge par continuité en 0 puisque

$$D_N(t) = \frac{\left(N + \frac{1}{2}\right)t + o(t)}{\frac{t}{2} + o(t)} = \frac{N + \frac{1}{2} + o(1)}{\frac{1}{2} + o(1)} = 2N + 1 + o(1).$$

Cela se voit aussi sur la définition de D_N , puisque $D_N(0) = \sum_{n=-N}^N e^{in \times 0} = 2N + 1$.

Démonstration. On effectue le calcul, en remarquant que la série définissant D_N est une série trigonométrique.

$$\begin{aligned} D_N(t) &= \sum_{n=-N}^N e^{int} = \sum_{n=-N}^N (e^{it})^n = e^{-iNt} \frac{e^{i(2N+1)t} - 1}{e^{it} - 1} = \frac{e^{i\frac{t}{2}} e^{iN+\frac{1}{2}t} - e^{-i(N+\frac{1}{2})t}}{e^{i\frac{t}{2}} e^{iN+\frac{1}{2}t} - e^{-i(N+\frac{1}{2})t}} \\ &= \frac{\sin\left(N + \frac{1}{2}\right)t}{\sin\frac{t}{2}}. \end{aligned}$$

\square

Lemme 6.3.17 (Lemme de Riemann-Lebesgue). *Soit f une fonction Riemann-intégrable sur $[0, 2\pi]$. Alors la suite $(c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}}$ tend vers 0 quand n tend vers ∞ ou vers $-\infty$. Plus précisément, on a*

$$\lim_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \int_0^{2\pi} f(t)e^{-i\lambda t} dt = 0.$$

Démonstration. On va commencer par faire la preuve dans le cas où la fonction f est de classe \mathcal{C}^1 . On a alors, en intégrant par parties

$$\left| \int_0^{2\pi} f(t)e^{-i\lambda t} dt \right| = \frac{1}{\lambda} \left| \int_0^{2\pi} f'(t)e^{-i\lambda t} dt \right| \leq \frac{1}{\lambda} \sup_{[0, 2\pi]} |f'| \rightarrow 0.$$

Dans le cas général, le théorème 6.1.11 nous donne, pour tout $\varepsilon > 0$, l'existence d'un polynôme g tel que $\int_0^{2\pi} |f(t) - g(t)| dt \leq \varepsilon$. Un polynôme étant de classe \mathcal{C}^1 , on a

$$\lim_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \left| \int_0^{2\pi} g(t)e^{-i\lambda t} dt \right| = 0,$$

de sorte que

$$\begin{aligned} \limsup_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \left| \int_0^{2\pi} f(t)e^{-i\lambda t} dt \right| &\leq \limsup_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \left| \int_0^{2\pi} f(t)e^{-i\lambda t} dt - \int_0^{2\pi} g(t)e^{-i\lambda t} dt \right| + \left| \int_0^{2\pi} g(t)e^{-i\lambda t} dt \right| \\ &\leq \varepsilon + \limsup_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \left| \int_0^{2\pi} g(t)e^{-i\lambda t} dt \right| \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

On conclut par le fait que cette inégalité est vraie pour tout $\varepsilon > 0$. □

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème de Dirichlet.

Preuve du théorème 6.3.12. On a l'égalité

$$\int_0^{2\pi} D_N(t) dt = \sum_{n=-N}^N \int_0^{2\pi} e^{int} dt = 2\pi.$$

De plus, la fonction D_N est paire de sorte que l'on peut écrire

$$\begin{aligned} 2\pi \left(S_N(f)(t) - \tilde{f}(t) \right) &= \int_{-\pi}^{\pi} D_N(s)f(t-s) ds - \int_{-\pi}^{\pi} D_N(s)\tilde{f}(t) ds \\ &= \int_0^{\pi} D_N(s)f(t-s) ds + \int_{-\pi}^0 D_N(s)f(t-s) ds - \int_{-\pi}^{\pi} D_N(s)\tilde{f}(t) ds \\ &= \int_0^{\pi} D_N(s)f(t-s) ds + \int_0^{\pi} D_N(s)f(t+s) ds - \int_0^{\pi} D_N(s)(f(t-) + f(t+)) ds. \end{aligned}$$

On a donc écrit $S_N(f)(t) - \tilde{f}(t)$ comme l'intégrale sur $[0, 2\pi]$ de D_n multiplié par une certaine fonction. On écrit alors

$$\begin{aligned} 2\pi \left(S_N(f)(t) - \tilde{f}(t) \right) &= \int_0^\pi \sin \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) s \right) \left(\frac{f(t+s) - f(t+)}{\sin \left(\frac{s}{2} \right)} + \frac{f(t-s) - f(t-)}{\sin \left(\frac{s}{2} \right)} \right) ds \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \sin \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) s \right) \left(\frac{f(t+s) - f(t+)}{\sin \left(\frac{s}{2} \right)} + \frac{f(t-s) - f(t-)}{\sin \left(\frac{s}{2} \right)} \right) ds \\ &= \frac{1}{4i} \int_{-\pi}^\pi e^{i(N+\frac{1}{2})s} g(s) ds + \frac{1}{4i} \int_{-\pi}^\pi e^{-i(N+\frac{1}{2})s} g(s) ds, \end{aligned}$$

où l'on a posé

$$g(s) = \frac{f(t+s) - f(t+)}{\sin \left(\frac{s}{2} \right)} + \frac{f(t-s) - f(t-)}{\sin \left(\frac{s}{2} \right)}.$$

Or, f étant de classe \mathcal{C}^1 par morceaux, on a les développements, en $s > 0$

$$f(t+s) = f(t+) + f'(t+)s + o(s) \quad \text{et} \quad f(t-s) = f(t-) - f'(t-)s + o(s),$$

de sorte que la fonction g vérifie, au voisinage de 0,

$$g(s) = \frac{(f'(t+) - f'(t-))s + o(s)}{s/2 + o(s)} = 2(f'(t+) - f'(t-)) + o(1).$$

La fonction g se prolonge donc par continuité en 0 et est donc continue par morceaux. Le lemme 6.3.17 montre donc que $S_N(f)(t) - \tilde{f}(t)$ tend vers 0 quand $N \rightarrow \infty$. \square

Chapitre 7

Fonctions usuelles

La plupart des fonctions que l'on rencontre usuellement en analyse sont obtenues à partir de diverses opérations sur des fonctions simples, principalement les polynômes, la fonction exponentielle et les logarithmes.

Dans ce chapitre, on va donner les définitions et prouver les principales propriétés de ces fonctions.

7.1 Définitions

7.1.1 Les polynômes

Définition 7.1.1. On appelle fonction polynôme une fonction f définie sur \mathbb{R} de la forme

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad (7.1)$$

pour des réels $(a_k)_{k \in \{0, \dots, n\}}$.

Propriété 7.1.2. Les polynômes sont des fonctions de classe \mathcal{C}^∞ de \mathbb{R} dans \mathbb{R} , et la dérivée de la fonction polynôme f définie en (7.1) est la fonction polynôme donnée par

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}.$$

Démonstration. Commençons par traiter le cas de la fonction $x \mapsto x^k$. Grâce à la formule du binôme, on a, pour x et h des réels avec $h \neq 0$:

$$\frac{(x+h)^k - x^k}{h} = \frac{1}{h} \left(\sum_{q=0}^k C_k^q x^{k-q} h^q - x^k \right) = \sum_{q=1}^k C_k^q x^{k-q} h^{q-1} = kx^{k-1} + h \sum_{q=2}^k C_k^q x^{k-q} h^{q-2}.$$

On a donc, dans la limite $h \rightarrow 0$, le développement $\frac{(x+h)^k - x^k}{h} = kx^{k-1} + o(1)$, de sorte que $x \mapsto x^k$ est dérivable de dérivée kx^{k-1} . Par récurrence, la dérivée $k+1$ ^{ème} de x^k est la fonction nulle qui est de classe \mathcal{C}^∞ . Les fonctions monômes $x \mapsto x^k$ sont donc de classe \mathcal{C}^∞ , et par combinaison linéaire, c'est aussi le cas des fonctions polynômes. \square

7.1.2 L'exponentielle

Définition 7.1.3. On appelle fonction exponentielle la fonction \exp définie sur \mathbb{C} par la série entière

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \quad (7.2)$$

On peut vérifier en utilisant la propriété 6.2.5 que la série entière $\sum \frac{1}{n!} z^n$ a bien un rayon de convergence infini, de sorte que la fonction exponentielle est effectivement définie sur \mathbb{C} tout entier.

Comme les coefficients de la série entière définissant \exp sont réels, la restriction à \mathbb{R} de \exp est une fonction de classe C^∞ à valeurs réelles. Son graphe est tracé en figure 7.1.




FIGURE 7.1 – Les graphes des fonctions \exp et \ln . Chaque graphe est le symétrique de l'autre par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Voici une propriété importante de l'exponentielle, qui aurait également pu servir de définition.

Propriété 7.1.4. La restriction à \mathbb{R} de la fonction exponentielle est l'unique solution de l'équation différentielle avec condition initiale :

$$\begin{cases} y' &= y, \\ y(0) &= 1. \end{cases} \quad (7.3)$$

Démonstration. On a clairement $\exp(0) = 1$, et la propriété 6.2.11 de dérivation des série entières montre que

$$\exp'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n!} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \exp(x).$$

La fonction exponentielle est donc bien solution de l'équation (7.3).

Pour montrer que l'exponentielle est l'unique solution de (7.3), on considère une solution y , et on va montrer que $y(x)e^{-x}$ vaut 1, quel que soit le réel x . Pour cela, on dérive

$$(y(x)e^{-x})' = y'(x)e^{-x} + y(x)(-e^{-x}) = y(x)e^{-x} - y(x)e^{-x} = 0.$$

Par conséquent, la fonction $y(x)e^{-x}$ est constante égale à $y(0)e^{-0} = 1$, ce qui achève la démonstration. \square

Une autre propriété qui caractérise l'exponentielle :

Propriété 7.1.5. La fonction exponentielle est l'unique fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} vérifiant la proposition

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, f(a+b) = f(a)f(b), \quad (7.4)$$

qui soit dérivable en 0 avec $f'(0) = 1$.

De plus, la relation (7.4) est également vraie si a et b sont des nombres complexes.

La propriété (7.4) fait qu'il est naturel d'utiliser la notation $\exp(z) = e^z$. On notera aussi $e = \exp(1)$.

Démonstration. On a bien $\exp'(0) = 1$, et le fait que la fonction exponentielle vérifie la proposition (7.4) se déduit du calcul suivant :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{n!} a^k b^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k!n!} a^k b^n \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} a^k \right) \times \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} b^n \right). \end{aligned}$$

Ce calcul est justifié par la propriété 3.4.2 et le fait que la série (7.2) soit absolument convergente pour $z = a$ et $z = b$.

Pour montrons l'unicité, on va montrer qu'une fonction qui satisfait les hypothèses de la propriété 7.1.5 est une solution de l'équation (7.3), qui admet une unique solution. Soit donc f une fonction vérifiant les conditions de l'énoncé. Une telle fonction vérifie pour tout x réel $f(x) = f(x+0) = f(x)f(0)$. Comme $f'(0) = 1$, la fonction f est non constante et il existe au moins un x_0 pour lequel $f(x_0) \neq 0$.

L'égalité $f(x_0) = f(0)f(x_0)$ entraîne donc $f(0) = 1$. Il ne reste qu'à montrer l'égalité $f' = f$, qui se déduit du calcul suivant, pour a et h des réels, $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{f(a)f(h) - f(a)}{h} = f(a) \frac{f(h) - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(a)f'(0) = f(a).$$

Par conséquent, f est dérivable sur \mathbb{R} et vérifie $f' = f$ et $f(0) = 1$. Elle est donc solution de l'équation (7.3), et on a alors $f = \exp$. \square

Propriété 7.1.6. *La fonction \exp est à valeurs dans \mathbb{C}^* . De plus, la restriction de \exp à \mathbb{R} est une bijection de \mathbb{R} dans $]0, \infty[$.*

Démonstration. Si il existe un élément z_0 de \mathbb{C} tel que $e^{z_0} = 0$, alors pour tout z de \mathbb{C} , on aurait, d'après la proposition 7.1.5, $e^z = e^{z-z_0} \times e^{z_0} = e^{z-z_0} \times 0 = 0$. Or la fonction exponentielle n'est pas la fonction nulle.

On a déjà vu que l'exponentielle envoyait \mathbb{R} dans $]0, \infty[$. De plus, comme $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ la fonction exponentielle est strictement croissante.

Pour montrer qu'il s'agit d'une bijection, il suffit, par le théorème des valeurs intermédiaires, de montrer que les deux limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ (qui existent par monotonie) valent respectivement 0 et ∞ . Comme $e^{-x} = 1/e^x$, il suffit de montrer $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$. Or, puisque $e^0 = 1$ et $\exp'(0) = 1$, il existe $\alpha > 0$ tel que $e^\alpha > 1$. Par conséquent,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \lim_n e^{n\alpha} = \lim_n (e^\alpha)^n = \infty,$$

d'où le résultat. \square

7.1.3 Le logarithme

Définition 7.1.7. *On appelle fonction logarithme népérien (ou plus simplement logarithme) la fonction $\ln :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ réciproque de la fonction $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, \infty[$. Cette fonction est bien définie en vertu de la propriété 7.1.6.*

Le graphe de \ln est tracé sur la figure 7.1.

La proposition suivante aurait pu servir de définition à la fonction \ln .

Propriété 7.1.8. *La fonction \ln est l'unique primitive de $x \mapsto 1/x$ s'annulant en 1.*

Démonstration. L'unique primitive de $x \mapsto 1/x$ est la fonction $F : x \mapsto \int_1^x \frac{dy}{y}$. Il suffit de montrer que F est la réciproque de l'exponentielle. Pour cela, on calcule, pour $x \in \mathbb{R}$, avec le changement de variable $y = e^z$:

$$F(e^x) = \int_1^{e^x} \frac{dy}{y} = \int_0^x \frac{e^z dz}{e^z} = \int_0^x dz = x.$$

La fonction F est donc bien la fonction réciproque de l'exponentielle : $F = \ln$. \square

La proposition suivante est une autre caractérisation de la fonction \ln .

Propriété 7.1.9. *La fonction \ln est l'unique fonction de $]0, \infty[$ dans \mathbb{R} vérifiant*

$$\forall a > 0, \forall b > 0, \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b),$$

qui soit dérivable en 1 avec $f'(1) = 1$.

Démonstration. Montrons tout d'abord que \ln vérifie les conditions de l'énoncé. Si a et b sont deux réels, on a

$$e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} e^{\ln b} = ab = e^{\ln(ab)}.$$

Comme les réels $\ln(ab)$ et $\ln(a) + \ln(b)$ ont même image par la fonction exponentielle qui est bijective, ils sont égaux. L'égalité $\ln'(1) = 1$ vient du calcul de la dérivée d'une fonction réciproque (propriété 4.3.7).

Il reste à montrer que si f est une fonction vérifiant les conditions de l'énoncé, alors $f = \ln$. On remarque tout d'abord que $f(1) = f(1) = f(1) + f(1)$, de sorte que $f(1) = 0$. Ensuite, on écrit, pour $x > 0$ et $h \in]-x, \infty[$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(x) + f(1+h/x) - f(x)}{h} = \frac{f(1+h/x)}{h}.$$

Or, comme $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1$, on a $f(1+h/x) = h/x + o(h)$, de sorte que $\frac{f(1+h/x)}{h} = \frac{1}{x} + o(1)$. Autrement dit, f est dérivable sur $]0, \infty[$ avec $f'(x) = \frac{1}{x}$. La fonction f est donc une primitive de $x \mapsto 1/x$ qui s'annule en 1, donc $f = \ln$ d'après la propriété 7.1.8. \square

7.1.4 Les puissances

On avait défini les fonctions puissance $x \mapsto x^n$ pour x réel quelconque dans le cas où n est un entier naturel. On peut l'étendre au cas $n \in \mathbb{Z}$ si on impose $x \neq 0$. La fonction exponentielle permet de généraliser ces fonctions à un exposant réel quelconque en imposant $x > 0$.

Définition 7.1.10. Pour α un réel et $x > 0$, on définit x^α par la formule

$$x^\alpha = \exp(\alpha \ln x).$$

Cette notation est cohérente avec les notations $\exp(x) = e^x$ et x^n .

Propriété 7.1.11. Pour α un réel quelconque, la fonction f_α définie sur $]0, \infty[$ par la formule

$$f_\alpha(x) = x^\alpha$$

est de classe \mathcal{C}^∞ sur $]0, \infty[$, et sa dérivée est donnée par

$$f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

Cette proposition ne revient pas exactement à la propriété 7.1.2 car on n'a pas donné la même définition pour x^α dans le cas $(x, \alpha) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N}$ et dans le cas $(x, \alpha) \in]0, \infty[\times \mathbb{R}$.

Démonstration. La fonction f_α est d'après la définition 7.1.10 la composée de la fonction \ln qui est \mathcal{C}^∞ sur $]0, \infty[$ et de la fonction exponentielle qui est \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} . La fonction f_α est donc \mathcal{C}^∞ sur $]0, \infty[$ et vérifie

$$f'_\alpha(x) = \alpha \ln'(x) \exp(\alpha \ln x) = \frac{\alpha}{x} \exp(\alpha \ln x) = \alpha \exp(-\ln x) \exp(\alpha \ln x) = \alpha \exp((\alpha - 1) \ln x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

\square

7.1.5 Les fonctions trigonométriques

Définition 7.1.12. Pour x un réel, on pose $\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix})$ et $\sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix})$. Autrement dit on a $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$.

On pose également $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, quand $\cos(x) \neq 0$.

Les graphes des fonctions \cos , \sin et \tan sont tracés sur la figure 7.2.




FIGURE 7.2 – Les graphes des fonctions \sin (en haut à gauche), \cos (en bas à gauche) et \tan (à droite), sur l'intervalle $[-2\pi, 2\pi]$.

Propriété 7.1.13. Si x est réel, alors e^{ix} est de module 1. Notamment, on a la formule

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1,$$

et les fonctions \sin et \cos sont à valeurs dans $[-1, 1]$.

De plus, on a $\overline{e^{ix}} = e^{-ix}$, d'où

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ et } \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Démonstration. Si x est réel, on a

$$\overline{e^{ix}} = \overline{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\overline{ix^n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ix)^n}{n!} = e^{-ix}.$$

Par conséquent, $|e^{ix}|^2 = e^{ix} \overline{e^{ix}} = e^{ix} e^{-ix} = 1$. On obtient alors $1 = |e^{ix}|^2 = |\cos(x) + i \sin(x)|^2 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$. \square

Propriété 7.1.14. Les fonctions \sin et \cos sont de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} , avec $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$. La fonction \tan est de classe \mathcal{C}^∞ hors de l'ensemble des solutions de $\cos(x) = 0$, et on a

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Démonstration. Les fonctions \sin et \cos sont de classe \mathcal{C}^∞ car il s'agit des parties réelles et imaginaires de la fonction $x \mapsto e^{ix}$ qui est de classe \mathcal{C}^∞ . Les égalités $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$ découlent du calcul

$$\cos'(x) + i \sin'(x) = (e^{ix})' = i e^{ix} = -\sin(x) + i \cos(x).$$

Pour la tangente, on a $\left(\frac{\sin}{\cos}\right)' = \frac{\sin' \cos - \cos' \sin}{\cos^2} = \frac{\cos^2 + \sin^2}{\cos^2}$, et on utilise $\tan = \sin / \cos$ ou $\cos^2 + \sin^2 \equiv 1$. \square

Propriété 7.1.15. *Il existe un plus petit nombre strictement positif π tel que $\cos(\pi/2) = 0$. On a approximativement $\pi = 3.141592\dots$*

Le nombre π vérifie l'égalité $e^{i\pi/2} = i$, et donc $e^{2i\pi} = i^4 = 1$.

Notamment, pour tout nombre complexe z et tout entier k , on a $e^{z+2ik\pi} = e^z$. En particulier, les fonction \sin , \cos et $x \mapsto e^{ix}$ sont 2π -périodiques.

Démonstration. Par définition du cosinus, on a $\cos(0) = 1 > 0$. De plus la propriété 3.3.1 nous donne la majoration

$$\cos(2) \leq 1 - \frac{2^2}{2} + \frac{2^4}{24} = -\frac{1}{3} < 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaire, la fonction \cos s'annule au moins une fois sur $[0, 2]$. Comme $\cos(0) > 0$, il existe bien un plus petit réel strictement positif $x_0 = \pi/2$ avec $\cos(x_0) = 0$.

On a alors

$$1 = \cos^2(\pi/2) + \sin^2(\pi/2) = 0 + \sin^2(\pi/2).$$

Par conséquent $\sin(\pi/2)$ vaut soit 1 soit -1 . Or, \sin a une dérivée positive sur $[0, \pi/2]$ si bien que $\sin(\pi/2) > 0$, d'où $\sin(\pi/2) = 1$, et donc $e^{i\pi/2} = i$. On a donc $e^{2i\pi} = i^4 = 1$. \square

Propriété 7.1.16. *Pour tout réel x , on a*

1. $\sin(x) = \sin(\pi - x) = -\sin(\pi + x) = -\sin(-x)$;
2. $\cos(x) = \cos(-x) = -\cos(\pi - x) = -\cos(\pi + x)$;
3. $\tan(x) = \tan(x + \pi) = -\tan(-x) = -\tan(\pi - x)$;
4. $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x)$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$.

Démonstration. Utiliser la formule $e^{x+y} = e^x e^y$ et les égalités $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\pi/2} = i$. \square

On a quelques formules pour modifier une expression incluant des fonctions trigonométriques. Il ne faut pas les connaître par cœur, mais plutôt savoir qu'elles existe et être capable de les retrouver. On peut toutes les montrer en utilisant la formule $e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy}$, ainsi que les définitions $\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix}) = (e^{ix} + e^{-ix})/2$, $\sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix}) = (e^{ix} - e^{-ix})/2i$ et $\tan = \sin / \cos$.

Propriété 7.1.17 (Angle somme). *Pour tout réels x et y , on a les égalités (quand les quantités sont définies)*

- $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x)$;
- $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$;
- $\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}$;
- $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$;
- $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2 \sin^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1$;
- $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$.

Propriété 7.1.18 (Linéarisation d'un produit). *Pour tout réels x et y , on a les égalités (quand les quantités sont définies)*

- $\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x + y) + \sin(x - y))$;
- $\sin(x) \sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y))$;
- $\cos(x) \cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x + y) + \cos(x - y))$.

Propriété 7.1.19 (Factorisation d'une somme). *Pour tout réels x et y , on a les égalités (quand les quantités sont définies)*

$$\begin{aligned} - \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right); \\ - \cos(x) - \cos(y) &= 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right); \\ - \cos(x) + \cos(y) &= -2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right); \\ - \tan(x) + \tan(y) &= \frac{\sin(x+y)}{\cos(x)\cos(y)}. \end{aligned}$$

Propriété 7.1.20 (Tangente de l'arc moitié). *Pour tout réel x , on a les égalités*

$$\begin{aligned} - \cos(x) &= \frac{1 - \tan^2(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)}; \\ - \sin(x) &= \frac{2 \tan(x/2)}{1 + \tan^2(x/2)}; \\ - \tan(x) &= \frac{2 \tan(x/2)}{1 - \tan^2(x/2)}. \end{aligned}$$

7.1.6 Les fonctions trigonométriques réciproques

On peut définir des réciproques pour les fonctions trigonométriques, pour peu que l'on se restreigne à un sous-intervalle de \mathbb{R} :

Définition 7.1.21. — *Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, la fonction \sin induit une bijection*

$$\sin : \left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow [-1, 1].$$

On note arcsin la réciproque à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

— *Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, la fonction \cos induit une bijection*

$$\cos : [k\pi, (k+1)\pi] \rightarrow [-1, 1].$$

On note arccos la réciproque à valeurs dans $[0, \pi]$:

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

— *Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, la fonction \tan induit une bijection*

$$\tan : \left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}.$$

On note arctan la réciproque à valeurs dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

Les graphes des trois fonctions arccos, arcsin et arctan sont tracés sur la figure 7.3.

Propriété 7.1.22. *Les fonctions arcsin, arccos et arctan sont de classe \mathcal{C}^∞ respectivement sur $] -1, 1[$, $] -1, 1[$ et \mathbb{R} , et on a :*

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$




FIGURE 7.3 – De gauche à droite, les graphes des fonctions \cos et \arccos , \sin et \arcsin , \tan et \arctan . Le graphe d'une fonction et de sa réciproque sont symétriques par rapport à l'axe $y = x$.

Démonstration. On dérive l'égalité $x = \sin(\arcsin(x))$ valide pour tout x de $] -1, 1[$, et on obtient $1 = \arcsin'(x) \cos(\arcsin(x))$. De plus, comme $\arcsin(x) \in] -\pi/2, \pi/2[$, on a $\cos(\arcsin(x)) > 0$ et l'égalité $\cos^2(y) + \sin^2(y) = 1$ donne

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(x))} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Finalement, on obtient $1 = \arcsin'(x) \sqrt{1 - x^2}$ d'où le résultat pour la fonction \arcsin . Le raisonnement est similaire pour les fonction \arccos et \arctan .

Les dérivées obtenues étant des fonctions de classe \mathcal{C}^∞ , les fonction \arcsin , \arccos et \arctan sont elles aussi de classe \mathcal{C}^∞ . \square

Propriété 7.1.23. Ces trois fonctions vérifient les formules suivantes, pour x tel que les quantités soient définies :

$$\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \arctan(x) = \text{signe}(x) \frac{\pi}{2}.$$

De plus, pour x et y réels, on a

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + k\pi,$$

où $k = 1$ si $xy > 1$ et $x > 0$; $k = -1$ si $xy > 1$ et $x < 0$; $k = 0$ si $xy < 1$.

Démonstration. Les dérivées de \arccos et \arcsin étant opposées, la fonction $\arccos + \arcsin$ est constante égale à $\arccos(0) + \arcsin(0) = \pi/2 + 0$.

Par le calcul, on voit que la fonction $\arctan(1/x) + \arctan(x)$ a une dérivée nulle. Cette fonction étant définie sur \mathbb{R}^* , elle est constante sur $]0, \infty[$ et sur $] -\infty, 0[$. Les valeurs prises sur ces deux ensembles

peuvent se déduire des égalités $\arctan(1/1) + \arctan(1) = 2 \times \pi/4$ et $\arctan(1/(-1)) + \arctan(-1) = 2 \times (-\pi/4)$. \square

7.2 Développements en série entière et développements limités

7.2.1 Développement en série entière

On a les développements suivants au voisinage de 0, donnés avec leur rayon de convergence.

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n, \quad R = \infty, \quad (\text{résolution de } y' = y)$$

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad R = \infty, \quad (\text{partie impaire de } e^{iz})$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad R = \infty, \quad (\text{partie paire de } e^{iz})$$

$$\tan(z) = z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{2}{15}z^5 + \frac{17}{315}z^7 + \frac{62}{2835}z^9 + \dots, \quad R = \frac{\pi}{2}, \quad (\text{quotient } \frac{\sin}{\cos}, \text{ pas de formule explicite simple})$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad R = 1, \quad (\text{série géométrique})$$

$$\ln(1-z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad R = 1, \quad (\text{primitivation du précédent})$$

$$(1+z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} z^n, \quad R = \infty \text{ si } \alpha \in \mathbb{N}, \quad R = 1 \text{ sinon (série de Taylor)}$$

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad R = 1, \quad (\text{substitution } z \rightarrow -z^2 \text{ dans } \frac{1}{1-z})$$

$$\arctan(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1}, \quad R = 1, \quad (\text{primitivation du précédent})$$

$$\arcsin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)}{(2n+1) \prod_{k=1}^n (2k)} z^{2n+1}, \quad R = 1, \quad (\text{primitivation de } (1-z^2)^{-1/2})$$

$$\arccos(z) = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{k=1}^n (2k-1)}{(2n+1) \prod_{k=1}^n (2k)} z^{2n+1}, \quad R = 1, \quad (\text{primitivation de } -(1-z^2)^{-1/2}).$$

7.3 Exercices

Exercice 7.1.

Exprimer les fonctions suivantes en fonction de $\sin(x)$ et $\cos(x)$:

$$\cos(2x) \sin(3x), \quad \cos(4x), \quad \sin(5x).$$

Exercice 7.2.

Exprimer les fonctions suivantes à partir de $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\sin(y)$ et $\cos(y)$.

$$\cos(2x - y) \sin(x + y), \quad \cos(3x + y) \sin^2(x - y).$$

Exercice 7.3.

Linéariser les expressions suivantes :

$$\cos^4(x), \quad \sin^3(x), \quad \cos(x)^3 \sin^2(x).$$

Exercice 7.4.

Donner une expression des fonctions suivantes en fonction de $\tan(x)$:

$$\frac{\sin(x) \cos(x)}{\sin^2(x) + 1}, \quad \frac{\cos^2(x)}{\cos^2(x) - \sin^4(x)}, \quad \cos^4(x) - \cos(x) \sin^3(x).$$

Exercice 7.5.

Donner une expression des fonctions suivantes en fonction de $\tan(x/2)$:

$$\frac{1}{\cos(x) + \tan(x)}, \quad \frac{1 + \cos^3(x)}{\cos^2(x)}, \quad \frac{\sin(x)}{\cos(x) - \sin(x)}.$$

Exercice 7.6.

Calculer les intégrales suivantes. On pourra effectuer un changement de variables trigonométrique : $u = \sin(x)$, $u = \cos(x)$, $u = \tan(x)$, ou $u = \tan(x/2)$.

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x} dx, \quad \int_0^\pi \frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx, \quad \int_0^a \frac{dx}{1 + \sin x \cos x}, \quad \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}.$$

Exercice 7.7.

Montrer l'égalité

$$2^n \prod_{k=0}^{n-1} \cos(2^k x) = \frac{\sin(2^n x)}{\sin(x)}.$$

Exercice 7.8.

Montrer que

$$\sum \cos(\pm a_1 \pm a_2 \dots \pm a_n) = 2^n \cos(a_1) \cos(a_2) \dots \cos(a_n),$$

où $\sum \cos(\pm a_1 \pm a_2 \dots \pm a_n)$ désigne la somme sur tout les choix de signes possibles.

Chapitre 8

Équations différentielles

Une équation différentielle est une équation dont la quantité inconnue à déterminer est une fonction, et faisant intervenir des dérivées de cette fonction.

Les équations différentielles permettent de modéliser divers phénomènes physiques. Une question importante du point de vue mathématique est le caractère bien posé de ces équations : l'équation admet-elle une solution ? Cette solution est-elle unique ?

8.1 Existence et unicité des solutions

On appelle *problème de Cauchy* une équation de la forme

$$\begin{cases} y'(t) &= f(y(t), t), \\ y(t_0) &= y_0. \end{cases} \quad (8.1)$$

Ici f est une fonction définie sur $\Omega \times I$ où Ω est un ouvert de \mathbb{R}^n et I est un intervalle ouvert de \mathbb{R} . On a aussi $t_0 \in I$ et $y_0 \in \Omega$. On est donc en présence d'une équation différentielle et d'une condition initiale.

Définition 8.1.1. *On appelle solution de l'équation (8.1) un couple (J, y) où J est un sous-intervalle de I contenant t_0 et y est une fonction dérivable de J dans \mathbb{R}^n , tel que l'on ait $y(t_0) = y_0$ et tel que pour tout t de J on ait l'égalité $y'(t) = f(y(t), t)$.*

Graphiquement parlant, rechercher une solution de l'équation $y'(t) = f(y(t), t)$ revient à trouver une courbe dans l'espace des coordonnées (t, x) qui soit en tout point tangente au champ de vecteur $(1, f(y, t))$. En effet, on cherche la courbe $(t, y(t))$, dont la dérivée par rapport à t est $(1, f(y(t), t))$. Par exemple, sur la figure 8.1, on a représenté le champ de vecteur $(1, y)$, ainsi que les deux solutions $y_1(t) = 0.1e^t$ et $y_2(t) = -2e^t$ de l'équation $y' = y$.

La fonction $f(x, \cdot)$ est définie sur un intervalle I , mais il est possible qu'une solution y de l'équation ne puisse être définie que sur un sous-intervalle J de I . Donnons quelques définitions pour préciser cela.

Définition 8.1.2. — *Étant données deux solutions (J_1, y_1) et (J_2, y_2) de (8.1), on dit que (J_1, y_1) prolonge (J_2, y_2) si on a $J_2 \subset J_1$ et si pour tout t de J_2 , on a $y_1(t) = y_2(t)$.*

— *On dit qu'une solution (J, y) est maximale si la seule solution qui prolonge (J, y) est (J, y) elle-même.*




FIGURE 8.1 – Le champ de vecteur associé à l'équation $y' = y$, avec deux solutions.

— On dit qu'une solution (J, y) est globale si $J = I$. On remarquera qu'une solution globale est nécessairement maximale.

Une remarque importante pour la suite est le fait qu'un couple (J, y) est solution de l'équation (8.1) si et seulement si il vérifie l'équation

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(y(s), s) ds, \quad (8.2)$$

pour tout t de J . L'équation (8.2) est appelée *formulation intégrale* de l'équation différentielle (8.1)

On va maintenant chercher un cadre d'hypothèses permettant d'assurer l'existence et l'unicité des solutions d'une équation différentielle donnée.

On aura besoin de la définition suivante :

Définition 8.1.3. On dit qu'une fonction f définie sur $\Omega \times I$ est localement Lipschitzienne en espace si pour tout ensemble de la forme $\bar{B}(y_0, r) \times [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ contenu dans $\Omega \times I$, il existe une constante $L > 0$ telle

$$\forall (y_1, t), (y_2, t) \in B(y_0, r) \times]t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon[, \|f(y_1, t) - f(y_2, t)\| \leq L \|y_1 - y_2\|.$$

La propriété suivante donne un critère simple pour montrer qu'une fonction est localement Lipschitzienne :

Propriété 8.1.4. Soit f une fonction de classe C^1 sur $\Omega \times I$. Alors f est localement Lipschitzienne en espace.

Démonstration. Soit (y, t) un point de $\Omega \times I$ et $\varepsilon > 0$ tel que $V_\varepsilon = \bar{B}(y, \varepsilon) \times [t - \varepsilon, t + \varepsilon]$ soit contenu dans $\Omega \times I$. L'ensemble V_ε étant fermé et borné, la différentielle de f par rapport à y est bornée sur V_ε , par une constante notée L . Alors, par le théorème des accroissements finis, f est L -Lipschitzienne sur V_ε . \square

Théorème 8.1.5 (Cauchy-Lipschitz). *On suppose que la fonction f est continue et localement Lipschitzienne en espace. Alors le problème de Cauchy (8.1) admet une solution. De plus, si (J_1, y_1) et (J_2, y_2) sont deux solutions, alors y_1 et y_2 coïncident sur $J_1 \cap J_2$.*

La conséquence à retenir de ce théorème est la suivante :

Corollaire 8.1.6. *On suppose que la fonction f est continue et localement Lipschitzienne en espace. Alors l'équation (8.1) admet une unique solution maximale.*

Démonstration. On considère l'ensemble $\mathcal{S} = \{(J, y) \text{ solution de (8.1)}\}$. On définit alors $\bar{J} = \bigcup_{(J, y) \in \mathcal{S}} J$, et on définit la fonction \bar{y} sur \bar{J} par :

$$\bar{y}(t) = y(t), \text{ où } (J, y) \in \mathcal{S} \text{ est tel que } t \in J.$$

Cette définition a bien un sens, car si (J_1, y_1) et (J_2, y_2) sont deux solutions telles que $t \in J_1 \cap J_2$, le théorème de Cauchy-Lipschitz entraîne que $y_1(t) = y_2(t)$. La valeur de $\bar{y}(t)$ ne dépend donc pas du choix du couple (J, y) .

Le couple (\bar{J}, \bar{y}) est bien une solution maximale de (8.1). En effet, pour tout $t \in \bar{J}$, \bar{y} est égale sur un voisinage de t à une solution de (8.1). Enfin, si (\tilde{J}, \tilde{y}) est un prolongement de (\bar{J}, \bar{y}) , on a $(\tilde{J}, \tilde{y}) \in \mathcal{S}$, de sorte que $\tilde{J} \subset \bar{J}$, et les deux solutions sont alors égales, ce qui montre que (\bar{J}, \bar{y}) n'admet pas de prolongement, et est donc maximale. \square

Nous allons maintenant passer à la preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz.

On aura besoin du lemme suivant :

Lemme 8.1.7. [*Lemme de Grönwall*] Soient α et β deux réels et soit f une fonction de $[0, T]$ dans \mathbb{R} vérifiant l'inégalité

$$f(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t f(s) ds \quad (8.3)$$

pour tout $t \in [0, T]$. Alors on a la majoration, pour $t \in [0, T]$

$$f(t) \leq \alpha e^{\beta t}.$$

Ce lemme peut se comprendre si l'on remarque que la relation (8.3) est une sorte de "formulation intégrale" de l'"inéquation différentielle" $y' \leq \beta y$ avec la condition $y(0) \leq \alpha$. La conclusion du lemme 8.1.7 est que l'on peut comparer la fonction f avec la solution de l'équation $y' = \beta y$, $y(0) = \alpha$, qui est donnée par $\alpha e^{\beta t}$.

Démonstration. On compare la fonction $\int_0^t f(s) ds$ avec la fonction $e^{\beta t}$: on calcule

$$\left(e^{-\beta t} \int_0^t f(s) ds \right)' = e^{-\beta t} \left(f(t) - \beta \int_0^t f(s) ds \right) \leq e^{-\beta t} \alpha.$$

En intégrant cette inégalité de 0 à t , on obtient

$$e^{-\beta t} \int_0^t f(s) ds \leq \alpha \frac{1 - e^{-\beta t}}{\beta}.$$

On conclut alors en écrivant

$$f(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t f(s) ds \leq \alpha + \beta e^{\beta t} \alpha \frac{1 - e^{-\beta t}}{\beta} = \alpha e^{\beta t}.$$

□

On peut maintenant finir la preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz.

Preuve du théorème 8.1.5. Pour simplifier, on va faire la preuve du théorème dans le cas où f est globalement Lipschitzienne en espace, de constante de Lipschitz L et est définie sur \mathbb{R}^n . De plus, par un changement de variables, on se ramène à une équation posée sur $[0, 1]$ avec une condition initiale $y(0) = y_0$.

- *Unicité :* Considérons deux solutions y et \tilde{y} de l'équation définies sur deux intervalles I et \tilde{I} contenant 0, et montrons qu'elles sont égales sur l'intervalle $I \cap \tilde{I}$. Comme y et \tilde{y} sont solutions, on a

$$|y(t) - \tilde{y}(t)| \leq \int_0^t |f(y(s), s) - f(\tilde{y}(s), s)| ds \leq L \int_0^t |y(s) - \tilde{y}(s)| ds.$$

On applique alors le lemme 8.1.7 avec $\alpha = 0$ pour obtenir $y(t) = \tilde{y}(t)$ pour tout t de $I \cap \tilde{I}$.

- *Existence :* Montrons maintenant l'existence de la solution. Pour ce faire, on va utiliser une solution approchée de l'équation (8.1). Tout d'abord on définit la suite $(\bar{y}^n)_{n=0, \dots, N}$ de la manière suivante :

$$\begin{cases} \bar{y}^0 &= y_0, \\ \bar{y}^{n+1} &= \bar{y}^n + \frac{1}{N} f(\bar{y}^n, \frac{n}{N}) \text{ pour } 0 \leq n \leq N-1. \end{cases}$$

On définit alors la fonction $\bar{y}^{(N)}$ affine par morceaux sur la subdivision $0 < \frac{1}{N} < \frac{2}{N} < \dots < 1$ qui vaut \bar{y}^k en $\frac{k}{N}$.

On va maintenant quantifier à quelle point la fonction $\bar{y}^{(N)}$ est une bonne approximation de la solution de (8.1). Pour cela on estime la quantité $e(N, t)$, appelée *erreur de discrétisation* définie par

$$e(N, t) = \left| \bar{y}^{(N)}(t) - y_0 - \int_0^t f(\bar{y}^{(N)}(s), s) ds \right|.$$

La quantité $e(N, t)$ est nulle pour tout t et seulement si $y^{(N)}$ est solution de l'équation (8.1). On va montrer que $(e(N, t))_{N \in \mathbb{N}}$ tend vers 0, ce qui permettra de montrer que $(y^{(N)})_{N \in \mathbb{N}}$ tend vers une solution. En découpant l'intervalle $[0, t]$ en intervalle de longueur $1/N$, on obtient

$$\begin{aligned} e(N, t) \leq & \sum_{k=0}^{E(Nt)-1} \left| \bar{y}^{(N)}\left(\frac{k+1}{N}\right) - \bar{y}^{(N)}\left(\frac{k}{N}\right) - \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} f(\bar{y}^{(N)}(s), s) ds \right| \\ & + \left| \bar{y}^{(N)}(t) - \bar{y}^{(N)}\left(\frac{E(Nt)}{N}\right) - \int_{\frac{E(Nt)}{N}}^t f(\bar{y}^{(N)}(s), s) ds \right|. \end{aligned}$$

En utilisant la définition de la suite $(\bar{y}^n)_{0 \leq n \leq N}$, on a

$$\begin{aligned} e(N, t) &= \sum_{k=0}^{E(Nt)-1} \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} \left| f\left(\bar{y}^{(N)}\left(\frac{k}{N}\right), \frac{k}{N}\right) - f(\bar{y}^{(N)}(s), s) \right| ds \\ &\quad + \int_{\frac{E(Nt)}{N}}^t \left| f\left(\bar{y}^{(N)}\left(\frac{E(Nt)}{N}\right), \frac{k}{N}\right) - f(\bar{y}^{(N)}(s), s) \right| ds \\ &\leq \sum_{k=0}^{N-1} \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} \left| f\left(\bar{y}^{(N)}\left(\frac{k}{N}\right), \frac{k}{N}\right) - f(\bar{y}^{(N)}(s), s) \right| ds. \end{aligned}$$

Fixons un $\eta > 0$, par uniforme continuité, il existe un entier n_0 tel que pour $N \geq n_0$, si $|t-s| \leq \frac{1}{N}$ et $|z-\bar{z}| \leq \frac{1}{N}$, on a $|f(z, t) - f(\bar{z}, s)| \leq \eta$. Par conséquent, pour $N \geq n_0$, on a

$$\sup_{t \in [0,1]} e(N, t) \leq \sum_{k=0}^{N-1} \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} \left| f\left(\bar{y}^{(N)}\left(\frac{k}{N}\right), \frac{k}{N}\right) - f(\bar{y}^{(N)}(s), s) \right| ds \leq \sum_{k=0}^{N-1} \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} \eta ds = \eta.$$

Par conséquent $\sup_{t \in [0,1]} e(N, t)$ tend vers 0 quand N tend vers ∞ .

On va montrer que la suite de fonction $y^N(t)$ converge uniformément vers une limite que nous noterons y . Pour cela, on va montrer que pour tout t la suite $(y^N(t))_{N \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

On a

$$\begin{aligned} |y^N(t) - y^M(t)| &\leq |e(N, t) - e(M, t)| + \left| \int_0^t f(y^N(s), s) ds - \int_0^t f(y^M(s), s) ds \right| \\ &\leq |e(N, t)| + |e(M, t)| + \int_0^t |f(y^N(s), s) - f(y^M(s), s)| ds \\ &\leq |e(N, t)| + |e(M, t)| + L \int_0^t |y^N(s) - y^M(s)| ds. \end{aligned}$$

On peut alors appliquer le lemme 8.1.7 pour obtenir

$$|y^N(t) - y^M(t)| \leq (|e(N, t)| + |e(M, t)|) e^{Lt}. \quad (8.4)$$

Cette inégalité signifie que la suite $(y^N(t))_{N \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, et converge donc vers une limite $y(t)$. De plus, en passant à la limite $M \rightarrow \infty$ dans (8.4), on voit que la convergence est uniforme en t . Par conséquent, la fonction y est continue.

Si on passe à la limite dans

$$\left| y^N(t) - y_0 - \int_0^t f(y^N(s), s) ds \right| \leq e(N, t),$$

on obtient

$$\left| y(t) - y_0 - \int_0^t f(y(s), s) ds \right| = 0.$$

La fonction y est donc bien une solution de l'équation (8.1). □

8.2 Quelques exemples

8.2.1 L'équation $y' = y^2$

La fonction $y \mapsto y^2$ est de classe \mathcal{C}^1 , par conséquent, le théorème de Cauchy-Lipschitz s'applique, et cette équation définit une unique solution maximale, pour toute condition initiale. Cherchons cette solution sous la condition $y(0) = \lambda$. Comme la fonction f ne dépend ici pas du temps, on pourra se ramener à partir de là à n'importe quelle condition initiale.

Traisons tout d'abord le cas $\lambda = 0$. On remarque que la fonction nulle $y(t) = 0$ est bien solution de l'équation. Il s'agit donc de l'unique solution de l'équation. De plus, elle est définie sur \mathbb{R} , c'est-à-dire qu'elle est globale.

Supposons maintenant $\lambda \neq 0$. Par continuité de la solution y , on sait que y est non nulle au moins sur un voisinage de $t = 0$. ^(note 1) On peut alors diviser par y sur ce voisinage de 0, où l'on obtient la relation $\frac{y'}{y^2} = 1$. Or $\frac{y'}{y^2} = -\left(\frac{1}{y}\right)'$. En intégrant on a la relation

$$-\frac{1}{y(t)} = -\frac{1}{\lambda} + t.$$

On a donc

$$y(t) = \frac{\lambda}{1 - \lambda t}.$$

Cette solution est définie sur $]\frac{1}{\lambda}, \infty[$ si $\lambda < 0$ et sur $] -\infty, \frac{1}{\lambda}[$ si $\lambda > 0$. Dans les deux cas, la solution maximale n'est pas globale.

Sur la figure 8.2, on a représenté le champ de vecteur $(1, y^2)$ correspondant à l'équation $y' = y^2$, ainsi que les deux solutions correspondant à $\lambda_1 = -2$ et $\lambda_2 = 1$.

8.2.2 L'équation $y' = \sqrt{|y|}$

La fonction $y \mapsto \sqrt{|y|}$ est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^* , mais pas sur \mathbb{R} . Par conséquent, on aura existence et unicité de la solution de l'équation pour une condition initiale $y(0) = \lambda$ avec $\lambda \neq 0$, jusqu'à un éventuel instant t où $y(t)$ vaudra 0.

En effet, considérons, comme précédemment, la solution de l'équation vérifiant $y(0) = \lambda$ et dont on sait qu'elle ne s'annule pas sur un voisinage de $t = 0$. On a la relation

$$\frac{y'}{\sqrt{|y|}} = 1,$$


mais $\frac{y'}{\sqrt{|y|}}$ vaut $2\text{signe}(y) \left(\sqrt{|y|}\right)'$, de sorte que, en intégrant, on ait

$$2\sqrt{|y(t)|} = 2\sqrt{|\lambda|} + \text{signe}(y)t.$$

On en déduit l'expression

$$y(t) = \begin{cases} \left(\frac{t}{2} + \sqrt{\lambda}\right)^2, & \text{défini sur }] - 2\sqrt{\lambda}, \infty[& \text{dans le cas } \lambda > 0, \\ -\left(-\frac{t}{2} + \sqrt{-\lambda}\right)^2, & \text{défini sur }] - \infty, 2\sqrt{-\lambda}[& \text{dans le cas } \lambda < 0. \end{cases}$$

(note 1). En fait, on sait même que la solution ne s'annulera jamais : en effet, par unicité, la seule solution qui puisse s'annuler est la solution nulle, mais cette solution ne peut pas vérifier la condition $y(0) = \lambda$.

FIGURE 8.2 – Le champ de vecteur associé à l'équation $y' = y^2$, avec deux solutions.

On remarque que dans ces deux cas, la fonction peut être prolongée au-delà de son ensemble de définition par la fonction nulle.

En récapitulatif, l'ensemble des solutions de $y' = \sqrt{|y|}$ peut exactement être décrit de la manière suivante : on fixe deux éléments a et b de $[-\infty, \infty]$ avec $a \leq b$, et on pose

$$y_a^b(t) = \begin{cases} -\frac{(t-a)^2}{4} & \text{si } t \leq a ; \\ 0 & \text{si } a \leq t \leq b ; \\ \frac{(t-b)^2}{4} & \text{si } b \leq t. \end{cases}$$

Alors les solutions de $y' = \sqrt{|y|}$ sont exactement les fonctions de la forme y_a^b , où a et b sont deux éléments de $[-\infty, \infty]$ vérifiant $a \leq b$

Sur la figure 8.3, on a représenté le champ de vecteur $(1, \sqrt{|y|})$ ainsi que les solutions y_a^b correspondant aux couples $(a, b) = (-1, -0.5)$ et $(a, b) = (0.5, \infty)$.

8.3 Le cas des équations d'ordre supérieur

On appelle équation différentielle d'ordre n une équation de la forme

$$y^{(n)} = f(y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, t), \quad (8.5)$$

où f est une fonction de $\Omega \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d \times I$ dans \mathbb{R}^d , où Ω est un ouvert de \mathbb{R}^d . La variable y vit ici dans \mathbb{R}^d . Il est en fait simple de ramener ce type d'équation à une équation d'ordre 1 en augmentant




FIGURE 8.3 – Le champ de vecteur associé à l'équation $y' = \sqrt{|y|}$, avec deux solutions.

la dimension du problème. En effet, on pose $z = (y, y', \dots, y^{(n-1)})$. La nouvelle variable z vit alors dans $(\mathbb{R}^d)^n = \mathbb{R}^{nd}$.

On remarque alors que la fonction y est solution de l'équation différentielle (8.5) si et seulement si z est solution de

$$z' = f(z, t).$$

On peut alors appliquer les résultats de la partie précédente pour les équations d'ordre 1. On remarque notamment que la condition initiale $z(t_0) = z_0$ se traduira sur y par une condition de la forme

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_0^{(1)}, \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = y_0^{(n-1)}$$

où le n -uplet $(y_0, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)})$.

Par conséquent, un problème de Cauchy sur une équation d'ordre n doit, pour être bien posé, porter sur les valeurs de la fonction et de ses $n - 1$ premières dérivées en un point donné :

Théorème 8.3.1. *Soit Ω un ouvert de \mathbb{R}^d et soit f une fonction de $\Omega \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d \times I$ dans \mathbb{R}^d , continue et localement Lipschitzienne en les variables d'espace (celles qui vivent dans $\Omega \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d$). Soient $y_0 \in \Omega$, $y_1 \in \mathbb{R}^d, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{R}^d$ et $t_0 \in I$.*

Alors l'équation

$$y'(t) = f(y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t), t)$$

avec la condition initiale

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}$$

admet une unique solution maximale.

8.4 Le cas linéaire

Un cas simple et courant en pratique est le cas des équations différentielles *linéaires*, c'est-à-dire pour lequel la fonction f qui apparaît dans l'équation (8.1) est affine par rapport à y . Autrement dit, il s'agit des problèmes de Cauchy de la forme

$$\begin{cases} y'(t) &= A(t)y(t) + b(t), \\ y(t_0) &= y_0, \end{cases} \quad (8.6)$$

où y_0 est un élément de \mathbb{R}^n , b est une fonction de I dans \mathbb{R}^n et A est une fonction de I dans $\mathbb{R}^{n \times n}$, l'espace des matrices carrées de taille n .

Propriété 8.4.1. *Si les fonctions A et b sont continues sur I , alors le système (8.6) admet une unique solution maximale. De plus, cette solution est définie sur I tout entier.*

Démonstration. L'équation (8.6) peut se mettre sous la forme (8.1) si on pose $f(y, t) = A(t)y + b(t)$. Il suffit donc de montrer que l'on peut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz dans notre cadre.

Si les fonctions A et b sont continues sur I , alors elles sont bornées sur tout segment de I . Par conséquent, si y et z sont deux points de \mathbb{R}^d on a

$$\|(Az + b) - (Ay + b)\| = \|A(z - y)\| \leq C\|z - y\|$$

pour une certaine constante C , de sorte que la fonction de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R}^n donnée par $y \mapsto Ay + b$ est globalement Lipschitzienne. Le théorème de Cauchy-Lipschitz montre alors qu'il existe une unique solution. \square

La résolution de l'équation (8.6) passe par la résolution de l'équation suivante, appelée équation *homogène* associée à (8.6) :

$$\begin{cases} y'(t) &= A(t)y(t), \\ y(t_0) &= y_0, \end{cases} \quad (8.7)$$

En effet, on a le résultat suivant :

Propriété 8.4.2. *L'ensemble $\mathcal{S}_{A,0}$ des solutions de l'équation homogène $y'(t) = A(t)y(t)$ est un espace vectoriel, et l'application $y_0 \mapsto y$ qui à une condition initiale y_0 associe la solution y de (8.7) est linéaire.*
L'ensemble $\mathcal{S}_{A,b}$ des solutions de l'équation $y'(t) = A(t)y(t) + b(t)$ est un espace affine dirigé par $\mathcal{S}_{A,0}$. Plus précisément, si $\tilde{y} \in \mathcal{S}_{A,b}$, alors on a

$$\mathcal{S}_{A,b} = \{\tilde{y} + z, z \in \mathcal{S}_{A,0}\}.$$

Autrement dit, pour trouver toutes les solutions de l'équation $y'(t) = A(t)y(t) + b(t)$, il suffit d'exhiber une solution de cette équation. Les autres solutions s'en déduisent en ajoutant les solutions de $y'(t) = A(t)y(t)$.

Démonstration. Si y et z sont dans $\mathcal{S}_{A,0}$, alors on a bien $(y+z)'(t) = A(t)(y(t)+z(t))$. De même, si $\lambda \in \mathbb{R}$, on a bien $(\lambda y)'(t) = A(t)(\lambda y)(t)$. Les fonction $y+z$ et λy sont bien dans $\mathcal{S}_{A,0}$, qui est donc un espace vectoriel. Ensuite, on voit que la solution dépend linéairement de la condition initiale sur la relation $(y+z)(t_0) = y_0 + z_0$ et $(\lambda y)(t_0) = \lambda y_0$.

Si y et z sont dans $\mathcal{S}_{A,b}$, alors on a

$$(y-z)'(t) = (A(t)y(t) + b(t)) - (A(t)z(t) + b(t)) = A(t)(y(t)-z(t)).$$

La fonction $y-z$ est donc dans $\mathcal{S}_{A,0}$. Autrement dit $\mathcal{S}_{A,b}$ est un espace affine dirigé par $\mathcal{S}_{A,0}$. \square

Définition 8.4.3. Pour s un élément de I , on note R_s la solution de l'équation différentielle à valeurs dans $\mathbb{R}^{n \times n}$

$$\begin{cases} R'_s(t) &= A(t)R_s(t), \\ R_s(s) &= I_n, \end{cases} \quad (8.8)$$

où I_n est la matrice identité de taille n . La famille de matrice $(R_s(t))_{(s,t) \in I^2}$ est appelée résolvante de l'équation (8.6).

Comme son nom l'indique, la résolvante permet de résoudre l'équation (8.6) :

Propriété 8.4.4. La solution de l'équation (8.6) est donnée par

$$\forall t \in I, y(t) = R_{t_0}(t)y_0.$$

De plus, la matrice $R_{t_0}(t)$ est inversible, quel que soit $t \in I$.

Démonstration. Par unicité, il suffit de vérifier que la fonction donnée est bien solution. On a bien $y(t_0) = R_{t_0}(t_0)y_0 = Iy_0 = y_0$. De plus $y'(t) = R'_{t_0}(t)y_0 = A(t)R_{t_0}(t)y_0 = A(t)y(t)$. La fonction y est bien la solution cherchée.

Soit $t \in I$. Pour montrer que la matrice $R_{t_0}(t)$ est inversible, il suffit de montrer que si $R_{t_0}(t)y_0 = 0$, alors $y_0 = 0$. Si on suppose $R_{t_0}(t)y_0 = 0$, cela signifie que la solution y s'annule en t . Comme la fonction nulle est solution de $y' = Ay$, par unicité, on en déduit que $R_{t_0}(s)y_0 = 0$ quel que soit s . Par conséquent, $y_0 = R_{t_0}(t_0)y_0 = 0$, et on a bien $y_0 = 0$. La matrice $R_{t_0}(t)$ est inversible. \square

La propriété 8.4.4 signifie que la matrice $R_s(t)$ envoie la position de y à l'instant s sur la position de y à l'instant t . À partir de cette observation, il est naturel que la résolvante vérifie la relation de composition suivante :

Propriété 8.4.5. Soit t, s et u trois éléments de I . On a la relation

$$R_u(t) = R_s(t)R_u(s).$$

Notamment, on a $R_t(s)^{-1} = R_s(t)$.

Démonstration. Comme $(R_s(t))_{t \in I}$ est l'unique solution de (8.8), il suffit pour conclure de montrer que $(R_u(t)R_u(s)^{-1})_{t \in I}$ est également solution.

Or, on a $R_u(s)R_u(s)^{-1} = I_n$, et $(R_u(t)R_u(s)^{-1})' = A(t)R_u(t)R_u(s)^{-1}$, d'où la conclusion. \square

Maintenant que l'on sait exprimer les solutions de $y' = Ay$, on va chercher à en déduire les solutions de $y' = Ay + b$. Une méthode est la méthode dite de la "variation de la constante", qui consiste à remplacer le vecteur constant y_0 dans l'expression $R_{t_0}(t)y_0$ par un vecteur non-constant. On cherche donc les solutions de $y' = Ay + b$ sous la forme $R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t)$. La question est : quelles conditions doit satisfaire $\tilde{y}_0(t)$ pour que $R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t)$ soit solution de $y' = Ay + b$? En remplaçant dans l'équation on obtient

$$(R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t))' = A(t)R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t) + b(t),$$

ce qui se réécrit

$$A(t)R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t) + R_{t_0}(t)\tilde{y}_0'(t) = A(t)R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t) + b(t),$$

et après simplification, on obtient

$$\tilde{y}_0'(t) = R_{t_0}(t)^{-1}b(t) = R_t(t_0)b(t).$$

Enfin, pour satisfaire la condition initiale $y(t_0) = y_0$, comme $y(t_0) = R_{t_0}(t_0)\tilde{y}_0(t_0) = \tilde{y}_0(t_0)$, on doit avoir $\tilde{y}_0(t_0) = y_0$. Au final, on trouve que \tilde{y}_0 est donné par

$$\tilde{y}_0(t) = y_0 + \int_{t_0}^t R_s(t_0)b(s)ds.$$

On a finalement

$$R_{t_0}(t)\tilde{y}_0(t) = R_{t_0}(t)y_0 + \int_{t_0}^t R_{t_0}(t)R_s(t_0)b(s)ds = R_{t_0}(t)y_0 + \int_{t_0}^t R_s(t)b(s)ds.$$

Ces calculs nous ont permis de démontrer la propriété suivante :

Théorème 8.4.6 (Formule de Duhamel, ou "variation de la constante"). *La solution de l'équation (8.6) est donnée par*

$$y(t) = R_{t_0}(t)y_0 + \int_{t_0}^t R_s(t)b(s)ds.$$

Dans le cas où la famille $(A(t))_{t \in I}$ commute on a une formule explicite pour la solution $R_s(t)$ de l'équation (8.8) :

Propriété 8.4.7. *Si pour tous éléments t et s de I on a $A(s)A(t) = A(t)A(s)$, alors la solution de l'équation (8.8) est donnée par*

$$R_s(t) = e^{\int_s^t A(u)du}.$$

La définition de l'exponentielle d'une matrice est la suivante :

Propriété 8.4.8. *Soit A une matrice carrée. Pour tout $1 \leq i, j \leq n$, la série $\sum \frac{1}{n!}(A^n)_{ij}$ est convergente. La matrice e^A définie par*

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}A^n \quad (8.9)$$

est appelée exponentielle de la matrice A .

Démonstration. Notons $\|A\| = \max_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |A_{ij}|$. On a

$$\begin{aligned} \|AB\| &= \max_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj} \right| \leq \max_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |A_{ik}| |B_{kj}| = \max_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |A_{ik}| \left(\sum_{j=1}^n |B_{kj}| \right) \\ &\leq \left(\max_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |A_{ik}| \right) \left(\max_{k=1}^n \sum_{j=1}^n |B_{kj}| \right) \\ &= \|A\| \times \|B\|. \end{aligned}$$

Notamment, pour tout n , on a $\|A^n\| \leq \|A\|^n$. De plus, on remarque que pour tout i, j , on a $|A_{ij}| \leq \|A\|$. On peut donc faire la majoration

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{1}{n!} (A^n)_{ij} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \|A^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \|A\|^n = e^{\|A\|} < \infty.$$

Par conséquent, la série définissant le (i, j) -ème coefficient de la matrice e^A est absolument convergente, de sorte que la définition de e^A a bien un sens. \square

Pour prouver la proposition 8.4.7, on va avoir besoin des deux lemmes suivants :

Lemme 8.4.9. *Si A et B sont deux matrices qui commutent (c'est-à-dire si $AB = BA$), alors on a*

$$e^{A+B} = e^A e^B.$$

Démonstration. Comme les matrices A et B commutent, on a

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} A^k B^{n-k}.$$

On peut donc écrire

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{2N} \frac{1}{n!} (A + B)^n - \left(\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} A^n \right) \left(\sum_{n=0}^N \frac{1}{n!} B^n \right) &= \sum_{n=0}^{2N} \sum_{k=0}^n \frac{A^k B^{n-k}}{k!(n-k)!} - \sum_{0 \leq n, k \leq N} \frac{A^k B^n}{k!n!} \\ &= \sum_{k=0}^{2N} \sum_{n=0}^{2N-k} \frac{A^k B^n}{k!n!} - \sum_{0 \leq n, k \leq N} \frac{A^k B^n}{k!n!} \\ &= \sum_{\substack{N < n, k \leq 2N \\ n+k \leq 2N}} \frac{A^k B^n}{k!n!}. \end{aligned} \quad (8.10)$$

Par conséquent, d'une part le membre de gauche de (8.10) converge vers $e^{A+B} - e^A e^B$, d'autre part ses coefficients sont majorés par

$$\sum_{\substack{N < n, k \leq 2N \\ n+k \leq 2N}} \frac{\|A\|^k \|B\|^n}{k!n!} \leq \sum_{k=N}^{\infty} \sum_{n=N}^{\infty} \frac{\|A\|^k \|B\|^n}{k!n!} \rightarrow_N 0.$$

On a donc bien $e^{A+B} = e^A e^B$. \square

Lemme 8.4.10. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de matrice convergeant vers 0, alors la suite de terme général

$$\frac{e^{A_n} - I - A_n}{\|A_n\|}$$

converge vers 0.

Démonstration. Par définition de l'exponentielle, on a

$$\left\| \frac{e^{A_n} - I - A_n}{\|A_n\|} \right\| = \left\| \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{A_n^k}{\|A_n\|} \right\| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} \|A_n\|^{k-1} = \frac{e^{\|A_n\|} - 1 - \|A_n\|}{\|A_n\|} \rightarrow_n 0,$$

ce qui achève la démonstration. \square

Nous sommes maintenant en mesure de prouver la proposition 8.4.7.

Preuve de la proposition 8.4.7. Comme la famille $(A(t))_{t \in I}$ commute, c'est également le cas des matrices $\int_s^t A(u) du$ et $\int_t^{t+h} A(u) du$. On a donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} (e^{\int_s^{t+h} A(u) du} - e^{\int_s^t A(u) du}) &= \frac{1}{h} (e^{\int_t^{t+h} A(u) du} - I) e^{\int_s^t A(u) du} \\ &= \frac{1}{h} \left(e^{\int_t^{t+h} A(u) du} - I - \int_t^{t+h} A(u) du \right) e^{\int_s^t A(u) du} \\ &\quad + \frac{1}{h} \int_t^{t+h} A(u) du e^{\int_s^t A(u) du} \\ &\rightarrow 0 + A(t) e^{\int_s^t A(u) du}. \end{aligned}$$

On a donc bien $\left(e^{\int_s^t A(u) du} \right)' = A(t) e^{\int_s^t A(u) du}$. La matrice $e^{\int_s^t A(u) du}$ vérifie donc la même équation que la résolvante, et par unicité de la solution, il s'agit effectivement de la résolvante. \square

La famille des $(A(t))_{t \in I}$ commute dans au moins deux cas courants :

— Si $(A(t))_{t \in I}$ est une matrice constante $A(t) = A_0$ pour tout t , alors on a bien $A(t)A(s) = A_0^2 = A(s)A(t)$ et on a

$$R_s(t) = e^{(t-s)A_0}.$$

— Si le problème est posé en dimension $n = 1$, une matrice $A(t)$ est en fait réduite à un nombre réel, et on a bien $A(t)A(s) = A(s)A(t)$.